



SITUATION EN FRANCE

Surveillance de la grippe :
renseignements communiqués pour la période du 20 au 26 octobre 1986 par les laboratoires de :

AGENTS	FRANCE NORD				FRANCE SUD			
	Isolation	Conversions	Titres élevés	Nombre de malades	Isolation	Conversions	Titres élevés	Nombre de malades
Grippe A	-	-	1	510	-	1	3	587
Grippe B	-	-	-	510	-	-	-	-
Grippe C	-	-	-	200	-	-	-	-
Parainfluenza 1	-	-	-	492	-	1	2	644 (total)
Parainfluenza 2	1	-	2	456	-	-	-	-
Parainfluenza 3	9	3	14	490	-	-	11	-
Virus respiratoire syncytial	-	-	-	508	-	-	2	-
Adénovirus	3	-	6	566	-	-	13	-
Ornithose Psittacose	-	-	3	741	-	-	10	-
Mycoplasma pneumoniae	-	-	6	710	-	2	11	-
Fièvre Q	-	-	5	507	-	-	1	-

En France Nord, les diagnostics d'affections respiratoires comportent beaucoup de V.R.S. et de parainfluenza 3.

En France Sud, 7,6 % de syndromes respiratoires sont signalés parmi la clientèle des médecins généralistes.

En Grande-Bretagne, une épidémie de grippe due au virus A/Singapore/6/86 a été notée dans un pensionnat de jeunes garçons.

LE POINT SUR...

À PROPOS DU CHOLÉRA — ÉTÉ 1986

Entre le 2 août et le 9 octobre 1986, 38 cas de choléra ont été déclarés et 37 confirmés par le Centre national de référence pour le typage des vibrions (Institut Pasteur, professeur Dodin). Depuis cette dernière date aucun nouveau cas n'a été enregistré.

1. Les caractéristiques épidémiologiques de l'infection sont les suivantes :

a. *Les personnes atteintes* sont en majorité des Algériens de retour de vacances en Algérie (33 cas). Parmi eux, 6 présentaient des signes avant le départ d'Algérie, 16 dans les 48 heures après le retour, 1 dans les cinq jours et 1 dans les quinze jours; 9 étaient des cas secondaires familiaux dont certains asymptomatiques.

Les quatre autres cas étaient constitués :
— d'un Marocain n'ayant pas quitté la France mais vivant en relation étroite avec des Algériens de retour de leur pays d'origine,
— d'une Française de retour d'Égypte,
— de deux cas autochtones;

b. *La répartition dans le temps* (cf. tableau) montre une incidence maximale pendant la deuxième quinzaine d'août avec un pic à la fin du mois, correspondant à un retour de vacances;

c. *La répartition géographique* révèle que les cas enregistrés proviennent principalement des grandes métropoles : région pari-

Nombre de cas

