



Situation du SIDA en France
au 30 septembre 1986 : p. 177
Vaccination antitypho-
paratyphoïdique en Martinique :
p. 179

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des Affaires sociales et de l'Emploi

Direction générale de la Santé

N° 45/1986

17 novembre 1986

LE POINT SUR...

SITUATION DU SIDA EN FRANCE au 30 septembre 1986

En date du 30 septembre 1986, le nombre de cas signalés à la Direction Générale de la Santé dans le cadre du programme de surveillance mis en place depuis mars 1982 atteint 1 050 cas.

Ces cas répondent à la définition proposée par le Center for Disease Control d'Atlanta (États-Unis) adoptée par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Ces cas sont déclarés de façon anonyme; depuis le décret n° 86-770 du 10 juin 1986, le SIDA fait partie des maladies à déclaration obligatoire.

Pour la période du 1^{er} juillet au 30 septembre 1986, 191 cas ont été rapportés, soit 14,6 nouveaux cas par semaine. Pour la période correspondante de 1985, le nombre de nouveaux cas déclarés par semaine était de 5,7 cas. Compte tenu du délai moyen entre la date de diagnostic et la déclaration, le nombre total de cas rapportés sous-estime le nombre réel de cas diagnostiqués.

L'analyse des tendances sur les cas notifiés pendant la période du 1^{er} juillet 1986 au 30 septembre, fait ressortir 2 points essentiels :

- **Le développement de l'épidémie en dehors de la région parisienne**

Sur le total des cas cumulés, les patients domiciliés en région parisienne représentent 54 % (567 sur 1 050) des cas. La région Provence - Alpes - Côte d'Azur vient en second avec 10 % (101 sur 1 050) des cas. Pour la période du 1^{er} juillet 1986 au 30 septembre, les cas domiciliés en région Île-de-France ne représentent que 49 % de la totalité des nouveaux cas (93 sur 191).

- **L'augmentation brutale des cas survenus chez les toxicomanes utilisant les produits injectables**

Les 80 cas rapportés chez les toxicomanes (incluant 20 cas survenus chez les homosexuels masculins toxicomanes) ne représentent que 8 % du total des cas. Cependant, 47,5 % (38 sur 80) des cas ont été rapportés dans les 3 derniers mois, ce qui représente 20 % (38 sur 191) des cas déclarés pour cette période (tabl. 4).

Leur répartition géographique est différente de la répartition globale : 43 % (34 sur 80) de ces cas sont survenus chez des patients domiciliés dans la région Provence - Alpes - Côte d'Azur, et 25 % (20 sur 80) dans la région Île-de-France.

La fréquence élevée de l'infection par le virus H.I.V. dans ce groupe, liée aux pratiques d'échange de seringue, explique cette augmentation, qui ne peut que s'aggraver

dans les mois qui viennent. Le fait que les cas surviennent surtout dans le Sud de la France rejoint les observations issues de la surveillance européenne du SIDA, qui montrent la gravité de la situation dans les pays du Sud, en particulier en Italie et en Espagne où près de 50 % des cas sont rapportés dans ce groupe.

Les caractéristiques épidémiologiques de la situation du SIDA en France sont données dans les tableaux suivants :




Figure 1. - Distribution semestrielle des cas de SIDA rapportés au 30 septembre 1986 et mortalité associée

Tableau 1. — Répartition des cas de SIDA par catégorie diagnostique et mortalité associée en France (situation au 30 septembre 1986)

Catégorie diagnostique	Cas	Pourcentage	Décès	Taux de létalité (%)
Infection opportuniste.....	631	60	302	47,8
Sarcome de Kaposi.....	246	23,4	71	28,8
Infection opportuniste + sarcome de Kaposi.....	141	13,4	82	58,1
Autres.....	32	3,2	11	34,3
Total.....	1 050	100	466	44,3

Tableau 2. — Répartition des cas de SIDA par classe d'âge et sexe en France (situation au 30 septembre 1986)

Classe d'âge	Sexe masculin	Sexe féminin	Inconnu	Total	
				Nombre	Pourcentage
De 0 à 11 mois.....	6	3	1	10	0,95
De 1 à 4 ans.....	8	4		12	1,14
De 5 à 9 ans.....	1			1	0,09
De 10 à 14 ans.....	4	1		5	0,47
De 15 à 19 ans.....	2	1		3	0,28
De 20 à 29 ans.....	180	51		231	22
De 30 à 39 ans.....	403	33		436	41,50
De 40 à 49 ans.....	218	8		226	21,50
De 50 à 59 ans.....	84	11		95	9
60 ans et plus.....	15	4		19	1,80
Inconnu.....	9	3		12	1,12
Total.....	930	119	1	1 050	100

Tableau 3. — Répartition des cas de SIDA par groupe à risque et origine géographique - Adultes* en France (situation au 30 septembre 1986)

Groupe à risque	Origine géographique					Total	
	Europe		Caraïbes	Afrique	Autres	Nombre	Pourcentage
	France	Autres					
1. Homosexuels ou bisexuels masculins.....	615	36	4	8	33	696	68
2. Toxicomanes (I.V.).....	56	2	1	1		60	5,8
3. Hémophiles.....	5					5	0,4
4. Transfusés (sans autres facteurs de risque).....	32	2	2	1		37	3,6
5. (1) et (2) associés.....	16	1		1	2	20	1,9
6. Pas de facteur de risque connu :							
- sexe masculin.....	50	1	30	39	1	121	11,8
- sexe féminin.....	17	1	24	26	1	69	6,7
7. Inconnu.....	12		1	1		14	1,3
Total.....	803	43	62	77	37	1 022	100

* Adultes : âgés de plus de 15 ans.

Tableau 4. — Répartition des nouveaux cas de SIDA par groupe à risque et origine géographique - Adultes* en France (période du 1^{er} juillet au 30 septembre 1986)

Groupe à risque	Origine géographique					Total	
	Europe		Caraïbes	Afrique	Autres	Nombre	Pourcentage
	France	Autres					
1. Homosexuels ou bisexuels masculins.....	98	5		2	4	109	57
2. Toxicomanes (I.V.).....	28	2		1		31	16,5
3. Hémophiles.....	1					1	0,5
4. Transfusés (sans autres facteurs de risque).....	8		1			9	4,7
5. (1) et (2) associés.....	5	1		1		7	3,7
6. Pas de facteur de risque connu :							
- sexe masculin.....	9		2	9		20	10,6
- sexe féminin.....			3	3		6	3,1
7. Inconnu.....	4		1	1		6	3,1
Total.....	153	8	7	17	4	189	100

* Adultes : âgés de plus de 15 ans.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES CAS DE SIDA

Alsace (1 566 048 habitants) :

67 Rhin (Bas-).....	8
68 Rhin (Haut-).....	1
Total.....	9

Aquitaine (2 656 518 habitants) :

24 Dordogne.....	2
33 Gironde.....	8
40 Landes.....	1
47 Lot-et-Garonne.....	0
64 Pyrénées-Atlantiques.....	5
Total.....	16

Auvergne (1 332 600 habitants) :

03 Allier.....	1
15 Cantal.....	0
43 Loire (Haute-).....	0
63 Puy-de-Dôme.....	3
Total.....	4

Bourgogne (1 600 000 habitants) :

21 Côte-d'Or.....	1
58 Nièvre.....	1
71 Saône-et-Loire.....	1
89 Yonne.....	3
Total.....	6

Bretagne (2 700 000 habitants) :

22 Côtes-du-Nord.....	2
29 Finistère.....	5
35 Ile-et-Vilaine.....	3
56 Morbihan.....	2
Total.....	15

Centre (2 300 000 habitants) :

18 Cher.....	0
28 Eure-et-Loir.....	6
36 Indre.....	0
37 Indre-et-Loire.....	1
41 Loir-et-Cher.....	3
45 Loiret.....	1
Total.....	11

Champagne - Ardenne (1 400 000 habitants) :

08 Ardennes.....	0
10 Aube.....	3
51 Marne.....	1
52 Marne (Haute-).....	4
Total.....	8

Corse (230 000 habitants) :

2B Corse (Haute-).....	0
2A Corse-du-Sud.....	0

Franche-Comté (1 100 000 habitants) :

25 Doubs.....	0
39 Jura.....	1
70 Saône (Haute-).....	1
90 Territoire de Belfort.....	3
Total.....	5

Île-de-France (10 100 000 habitants) :

75 Paris.....	411
77 Seine-et-Marne.....	16
78 Yvelines.....	21
91 Essonne.....	50
92 Hauts-de-Seine.....	29
93 Seine-Saint-Denis.....	22
94 Val-de-Marne.....	16
95 Val-d'Oise.....	2
Total.....	567

Tableau 5. — Cas pédiatriques* : répartition par groupe à risque et par origine géographique en France (situation au 30 septembre 1986)

Groupe à risque	Origine géographique				Total
	Europe	Afrique	Caraïbes	Autres	
Hémophiles	4				4
Transfusés	7	1			8
Mère atteinte de SIDA ou à risque élevé du SIDA :					
— toxicomanes IV					
— contact hétérosexuel	2	5	9		16
— autre inconnu					
Autre					
Pas de risque connu					
Inconnu					
Total	13	6	9		28

* Cas pédiatriques : âgés de moins de 15 ans.

Languedoc - Roussillon (2 000 000 habitants) :

11 Aude 3
 30 Gard 4
 34 Hérault 4
 48 Lozère 0
 66 Pyrénées-Orientales 0
Total **11**

Limousin (750 000 habitants) :

19 Corrèze 0
 23 Creuse 0
 87 Vienne (Haute-) 0

Lorraine (2 300 000 habitants) :

54 Meurthe-et-Moselle 1
 55 Meuse 0
 57 Moselle 0
 88 Vosges 0
Total **1**

Midi - Pyrénées (2 400 000 habitants) :

09 Ariège 2
 12 Aveyron 1
 31 Garonne (Haute-) 16
 32 Gers 2
 46 Lot 0
 65 Pyrénées (Hautes-) 1
 81 Tarn 0
 82 Tarn-et-Garonne 3
Total **23**

Nord - Pas-de-Calais (4 000 000 habitants) :

59 Nord 3
 62 Pas-de-Calais 1
Total **4**

Normandie (Basse-) (1 400 000 habitants) :

14 Calvados 2
 50 Manche 2
 61 Orne 1
Total **5**

Normandie (Haute-) (1 700 000 habitants) :

27 Eure 1
 76 Seine-Maritime 5
Total **6**

Pays de Loire (3 000 000 habitants) :

44 Loire-Atlantique 5
 49 Maine-et-Loire 6
 53 Mayenne 0
 72 Sarthe 1
 85 Vendée 1
Total **13**

Picardie (1 700 000 habitants) :

02 Aisne 0
 60 Oise 6
 80 Somme 0
Total **6**

Poitou - Charentes (1 600 000 habitants) :

16 Charente 0
 17 Charente-Maritime 5
 79 Sèvres (Deux-) 1
 86 Vienne 2
Total **8**

Provence - Alpes - Côte d'Azur
 (4 000 000 habitants) :

04 Alpes-de-Haute-Provence 7
 05 Alpes (Hautes-) 0
 06 Alpes-Maritimes 48

13 Bouches-du-Rhône 34
 83 Var 5
 84 Vaucluse 7
Total **101**

Rhône - Alpes (5 000 000 habitants) :

01 Ain 1
 07 Ardèche 0
 26 Drôme 1
 38 Isère 8
 42 Loire 2
 69 Rhône 9
 73 Savoie 0
 74 Savoie (Haute-) 4
Total **25**

France outre-mer (1 245 000 habitants) :

Guadeloupe 20
 Guyane 23
 Martinique 4
 Réunion 0
Total **47**

Domiciliés à l'étranger 93
 Inconnus 78

INFORMATION ADMINISTRATIVE

Arrêté du 5 novembre 1986 concernant la vaccination antityphoparatyphoïdique dans le département de la Martinique

Les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1960 rendant obligatoire la vaccination antityphoparatyphoïdique pour tous les sujets de 10 à 30 ans résidant en Martinique sont abrogées.