


Surveillance des épidémies hivernales

Phases épidémiques : ■ Pas d'épidémie ■ Pré-épidémie ■ * Post-épidémie ■ Épidémie

BRONCHIOLITE (MOINS DE 2 ANS)




Évolution régionale

Activité modérée dans les SAU et les associations SOS Médecins de la région.

[Page 2](#)

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL



Évolution régionale

Faible activité dans les SAU et dans les associations SOS Médecins.

[Page 3](#)

Autres surveillances régionales

Gastro-entérite aiguë – Page 4

L'activité liée à la gastro-entérite aiguë fluctue dans les SAU et dans les associations SOS Médecins.

Mortalité toutes causes (données Insee) - Page 5

D'après les données disponibles au 19 novembre 2019, les nombres de décès enregistrés au cours des dernières semaines dans la région Grand Est, tous âges confondus, se situent dans les valeurs habituellement observées à cette période de l'année.

Faits marquants

Kinésithérapie respiratoire de désencombrement bronchique dans la bronchiolite : contre-indication de certaines techniques et non recommandations pour d'autres

La HAS a actualisé ses recommandations concernant la maladie hivernale virale la plus fréquente chez le nourrisson ; en particulier concernant les thérapeutiques non médicamenteuses pour lesquelles un accord d'expert préexistait. Ces recommandations concernent l'enfant de moins de 12 mois. Celles-ci sont disponibles sur le [site internet de la HAS](#).

Semaine mondiale du bon usage des antibiotiques du 18 au 24 novembre 2019

A l'occasion de la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques et de la journée européenne d'information sur les antibiotiques, Santé publique France et ses partenaires publient les données 2018 de la consommation et de la résistance aux antibiotiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de [Santé publique France](#).

Nancy
23 janvier
2020

1^{ères} Rencontres de santé publique
Grand Est



L'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est et Santé publique France organisent une **première journée de Rencontres régionales de santé publique le jeudi 23 janvier 2020 à Nancy**. Ces rencontres sont ouvertes à tous les professionnels de santé du Grand Est. La participation est gratuite. Le pré-programme et le module de pré-inscription seront prochainement disponibles en ligne.

BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans)

Synthèse des données disponibles

Sources :

- **Oscour®** : La part d'activité liée à la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans dans les services d'urgence augmente légèrement par rapport à la semaine précédente, tout en restant dans les fluctuations habituelles pour cette période de l'année. En semaine 46, 78 passages aux urgences pour bronchiolite ont été enregistrés, soit 5,5 % de l'ensemble des passages pour cette classe d'âge. Concernant les hospitalisations chez les moins de 2 ans après passage aux urgences, 14,6 % étaient liées à des bronchiolites.
- **SOS Médecins** : La part d'activité des associations SOS Médecins liée à la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans est de 4,3 % en semaine 46 et reste dans les valeurs habituellement observées à cette période de l'année.
- **Données de virologie (figure 10, page 6)** : D'après les données des dernières semaines des laboratoires de virologie des CHU de Nancy, Reims et Strasbourg, on observe une augmentation de la circulation du VRS (virus respiratoire syncytial) dans la région.

Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, Mortalité) : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la bronchiolite : [cliquez ici](#)




Figure 1- Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages, 2017-2019. Région Grand Est (Source : réseau Oscour®)




Figure 2- Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages, 2017-2019. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)

Semaine	Nombre d'hospitalisations pour bronchiolite, moins de 2 ans	Variation par rapport à la semaine précédente	Nombre total d'hospitalisations codées, moins de 2 ans	Taux de bronchiolite parmi toutes les hospitalisations codées, moins de 2 ans (%)
2019-S45	23		245	9,4
2019-S46	35	+52.2%	239	14,6

Tableau 1- Données d'hospitalisations après passage SAU

Prévention de la bronchiolite

La bronchiolite est une maladie respiratoire très fréquente chez les nourrissons et les enfants de moins de deux ans. Elle est due le plus souvent au VRS, virus qui touche les petites bronches. Le virus se transmet facilement d'une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements. Le virus peut rester sur les mains et les objets (comme sur les jouets, les tétines, les "doudous").

Pour éviter la transmission du virus à l'origine de la bronchiolite à un nourrisson, l'entourage proche peut adopter des gestes simples et quelques précautions :

- se laver systématiquement les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes avant de s'occuper d'un bébé
- en cas de rhume ou de toux, porter un masque chirurgical (en vente en pharmacie) pour s'occuper de lui, et demander le port de ce masque aussi à toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant
- en cas de rhume ou de toux, ne pas embrasser l'enfant sur le visage ou sur les mains
- aérer la chambre de l'enfant tous les jours au moins dix minutes
- ne pas échanger (dans la famille et l'entourage) les biberons, les sucettes, les couverts et verres non nettoyés
- éviter de rendre visite avec l'enfant à des personnes enrhumées ou grippées. Inversement, demander à une personne enrhumée ou grippée de reporter sa visite

La brochure « [La bronchiolite](#) » explique comment limiter la transmission du virus et que faire quand son enfant est malade.

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL

Synthèse des données disponibles

Sources :

- **Oscour®** : La part des consultations pour syndrome grippal dans les services d'urgence est minimale en semaine 46 (0,09 %) et se situe dans les mêmes valeurs que les années précédentes à la même période. Au total, 23 passages pour syndrome grippal ont été enregistrés au cours de cette semaine.
- **SOS Médecins** : Le nombre de consultations pour syndrome grippal reste faible en semaine 46 et dans les valeurs observées les années précédentes à la même période, mais tend à augmenter légèrement. Au cours de cette semaine, 86 consultations pour syndrome grippal ont été enregistrées.
- **Données de virologie (figure 10, page 6)** : D'après les données des laboratoires de virologie des CHU de Nancy, Reims et Strasbourg, les virus grippaux commencent faiblement à circuler dans la région.

Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, Mortalité) : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la grippe : [cliquez ici](#)




Figure 3- Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages, 2017-2019. Région Grand Est (Source : réseau Oscour®)





Figure 4- Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages, 2017-2019. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)

Prévention de la grippe et des syndromes grippaux

Les mesures barrière sont les gestes et comportements individuels et/ou collectifs à appliquer dès qu'on présente un signe clinique d'infection (respiratoire ou autre) pour protéger son entourage et, toute l'année, pour prévenir une infection. Elles sont complémentaires de la vaccination et sont à renforcer au cours des épidémies de grippe.

- Lavage des mains, friction hydro-alcoolique
- En cas de toux ou d'éternuements : se couvrir la bouche avec le coude/la manche ou un mouchoir
- Se moucher avec un mouchoir à usage unique, jeter le mouchoir à la poubelle, se laver les mains ensuite
- Aération des logements et locaux professionnels chaque jour pendant au moins 10 minutes
- Ne pas partager les objets utilisés par un malade (couverts, linge de toilette, etc.)
- Limiter les contacts d'une personne grippée pour diminuer les occasions de transmission du virus à une autre personne.

CETTE ANNÉE ENCORE
LA GRIPPE
VA FAIRE
TRÈS MAL...



Assurance Maladie

POUR PROTÉGER VOS PATIENTS DE LA GRIPPE, LE PREMIER RÉFLEXE : LA VACCINATION.

Il existe un vaccin annuel contre la grippe pour tous les adultes et les enfants de plus de 6 ans. Chez les 65 ans et plus, les femmes enceintes et les personnes atteintes d'une maladie chronique, le risque de complications est particulièrement élevé. Une vaccination est donc recommandée. Pour connaître les lieux de vaccination, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

CONTRE LA GRIPPE, PROTÉGEONS-NOUS, VACCINONS-NOUS.

Assurance Maladie, Santé Publique France, ameli.fr

Contre la grippe, la meilleure des protections, c'est la vaccination !

Plus d'information sur les sites de [Santé publique France](#) et de [l'Assurance maladie](#).

GASTRO-ENTÉRITE AIGUE

Synthèse des données disponibles

Sources :

- **Oscour®** : Au cours des dernières semaines, le nombre de passages et la part d'activité liés aux gastro-entérites aiguës (GEA) dans les services d'urgence sont fluctuants. En semaine 46, les passages pour GEA représentaient 1,1 % de l'activité totale.
- **SOS Médecins** : Le nombre de consultations et la part d'activité liés aux GEA dans les associations SOS Médecins de la région sont stables sur les trois dernières semaines. En semaine 46, les consultations avec diagnostic de GEA représentaient 8,5 % de l'activité totale.
- **Données de virologie** : D'après les données issues des laboratoires de virologie des CHU de Nancy, Reims et Strasbourg, les virus entériques circulent peu dans la région actuellement.

Consulter les données nationales : Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, Mortalité) : [cliquez ici](#)




Figure 5- Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérite aiguë parmi le total des passages, 2016-2019. Région Grand Est (Source : Oscour®)



Figure 6- Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérite aiguë parmi le total des passages, 2016-2019. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)




Figure 7- Niveau d'activité des SAU pour gastro-entérite aiguë, par région (Source : réseau Oscour®)




Figure 8- Niveau d'activité des associations SOS Médecins pour gastro-entérite aiguë, par région (Source : SOS Médecins)

Prévention de la gastro-entérite

Les GEA hivernales sont surtout d'origine virale. La principale complication est la déshydratation aiguë, qui survient le plus souvent aux âges extrêmes de la vie.

La prévention des GEA repose sur les mesures d'hygiène :

- **Hygiène des mains et des surfaces** : le mode de transmission oro-fécal principal des virus conditionne en grande partie les mesures de prévention et de contrôle des gastro-entérites virales basées sur l'application de mesures d'hygiène. Les mains constituent le vecteur le plus important de la transmission et nécessitent de ce fait un nettoyage au savon soigneux et fréquent. De même, certains virus (rotavirus et norovirus) étant très résistants dans l'environnement et présents sur les surfaces, celles-ci doivent être nettoyées soigneusement et régulièrement dans les lieux à risque élevé de transmission (services de pédiatrie, institutions accueillant des personnes âgées...). (Guide HCSP 2010)

- **Lors de la préparation des repas** : l'application de mesures d'hygiène strictes (lavage soigneux des mains) avant la préparation des aliments et à la sortie des toilettes, en particulier dans les collectivités (institutions accueillant des personnes âgées, services hospitaliers, crèches...), ainsi que l'éviction des personnels malades (cuisines, soignants...) permettent d'éviter ou de limiter les épidémies d'origine alimentaire.

MORTALITÉ TOUTES CAUSES

Synthèse des données disponibles

Sources : Données Insee suivant modèle Euromomo

D'après les données disponibles au 19 novembre 2019, les nombres de décès enregistrés au cours des dernières semaines dans la région Grand Est, tous âges confondus, se situent dans les valeurs habituellement observées à cette période de l'année.

Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, Mortalité) : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la mortalité : [cliquez ici](#)




Figure 9 - Nombre hebdomadaire de décès toutes causes et tous âges confondus depuis la semaine 14-2013. Région Grand Est, dernière semaine incomplète (Source : Santé publique France - Insee)

QUALITÉ DES DONNÉES – POINT SEMAINE 46-2019

	SOS Médecins	Réseau Oscour
Établissements inclus dans l'analyse des tendances = Participation au dispositif depuis la semaine S40-2014	5 / 5 associations	57 / 57 services d'urgences
Taux de codage du diagnostic dans ces établissements en semaine 46-2019	96 %	85 %




Figure 10- Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs pour les virus respiratoires, selon le type de virus, depuis la semaine 36-2018 (Sources : Laboratoires de virologie des CHU de Nancy, Reims et Strasbourg)

Le point épidémiologique

Remerciements à nos partenaires :

Services d'urgences du réseau Oscour®,
Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes,
Réseau Sentinelles,

Systèmes de surveillance spécifique :

- Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg.

Autres partenaires régionaux spécifiques :

- Observatoire des urgences Est-Rescue,
- Agence Régionale de Santé Grand Est,
- Opérateurs de démontstration du Bas-Rhin (SLM 67) et du Haut-Rhin (Brigades vertes).

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention



Directeur de la publication

Geneviève Chêne
Directrice générale
Santé publique France

Comité de rédaction

Michel Vernay
Oriane Broustal
Caroline Fiet
Nadège Marguerite
Caroline Masurel
Christine Meffre
Sophie Raguét
Astrid Rebert-Placide
Morgane Trouillet
Jenifer Yai

Diffusion

Santé publique France Grand Est
Tél. 03 83 39 29 43
GrandEst@santepubliquefrance.fr