

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 18 - Cher

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 656	3 562	4 094	2 172	2 424	1 390	1 670
	55-59 ans	6 649	3 010	3 639	537	491	2 473	3 148
	60-64 ans	7 485	3 372	4 113	461	427	2 911	3 686
	65-69 ans	8 128	3 670	4 458	347	339	3 323	4 119
	70-74 ans	5 614	2 570	3 044	168	165	2 402	2 879
	50-74 ans	35 532	16 184	19 348	3 685	3 846	12 499	15 502
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	511	245	266	165	161	80	105
	55-59 ans	422	197	225	42	49	155	176
	60-64 ans	483	241	242	44	33	197	209
	65-69 ans	482	205	277	25	29	180	248
	70-74 ans	412	206	206	17	22	189	184
	50-74 ans	2 310	1 094	1 216	293	294	801	922
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	364	172	192	117	111	55	81
	55-59 ans	296	136	160	25	23	111	137
	60-64 ans	351	172	179	30	19	142	160
	65-69 ans	374	159	215	16	20	143	195
	70-74 ans	290	146	144	6	15	140	129
	50-74 ans	1 675	785	890	194	188	591	702
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	147	73	74	48	50	25	24
	55-59 ans	126	61	65	17	26	44	39
	60-64 ans	132	69	63	14	14	55	49
	65-69 ans	108	46	62	9	9	37	53
	70-74 ans	122	60	62	11	7	49	55
	50-74 ans	635	309	326	99	106	210	220
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 509	3 489	4 020	2 124	2 374	1 365	1 646
	55-59 ans	6 523	2 949	3 574	520	465	2 429	3 109
	60-64 ans	7 353	3 303	4 050	447	413	2 856	3 637
	65-69 ans	8 020	3 624	4 396	338	330	3 286	4 066
	70-74 ans	5 492	2 510	2 982	157	158	2 353	2 824
	50-74 ans	34 897	15 875	19 022	3 586	3 740	12 289	15 282
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	293	159	134	95	80	64	54
	55-59 ans	255	151	104	35	18	116	86
	60-64 ans	332	209	123	41	14	168	109
	65-69 ans	424	247	177	32	16	215	161

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 18 - Cher

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	326	199	127	22	11	177	116
	50-74 ans	1 630	965	665	225	139	740	526
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	293	159	134	95	80	64	54
	55-59 ans	252	149	103	35	18	114	85
	60-64 ans	331	208	123	40	14	168	109
	65-69 ans	424	247	177	32	16	215	161
	70-74 ans	324	198	126	21	11	177	115
	50-74 ans	1 624	961	663	223	139	738	524
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	263	147	116	88	68	59	48
	55-59 ans	232	137	95	29	15	108	80
	60-64 ans	304	187	117	35	14	152	103
	65-69 ans	389	225	164	27	15	198	149
	70-74 ans	303	184	119	19	10	165	109
	50-74 ans	1 491	880	611	198	122	682	489
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	259	144	115	87	68	57	47
	55-59 ans	228	134	94	29	15	105	79
	60-64 ans	293	182	111	35	14	147	97
	65-69 ans	379	219	160	26	14	193	146
	70-74 ans	297	181	116	19	10	162	106
	50-74 ans	1 456	860	596	196	121	664	475
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 18 - Cher

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	260	145	115	87	67	58	48
	55-59 ans	232	137	95	29	15	108	80
	60-64 ans	302	186	116	35	14	151	102
	65-69 ans	382	220	162	26	14	194	148
	70-74 ans	301	182	119	19	10	163	109
	50-74 ans	1 477	870	607	196	120	674	487
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	7	5	2	1	1	4	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	14	10	4	2	2	8	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	260	146	114	87	67	59	47
	55-59 ans	228	135	93	29	14	106	79
	60-64 ans	297	183	114	34	14	149	100
	65-69 ans	384	223	161	27	14	196	147
	70-74 ans	297	181	116	19	10	162	106
	50-74 ans	1 466	868	598	196	119	672	479
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	263	147	116	88	68	59	48
	55-59 ans	234	138	96	29	15	109	81
	60-64 ans	304	187	117	35	14	152	103
	65-69 ans	390	226	164	27	15	199	149
	70-74 ans	306	185	121	20	10	165	111
	50-74 ans	1 497	883	614	199	122	684	492
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	92	42	50	20	31	22	19
	55-59 ans	72	30	42	6	4	24	38

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92	43	49	8	4	35	45
	65-69 ans	107	39	68	2	2	37	66
	70-74 ans	94	45	49	2	4	43	45
	50-74 ans	457	199	258	38	45	161	213
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	2	4	1	1	1	3
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	6	8	2	1	4	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	48	27	21	17	8	10	13
	55-59 ans	56	36	20	9	5	27	15
	60-64 ans	87	60	27	8	4	52	23
	65-69 ans	106	74	32	8	1	66	31
	70-74 ans	84	55	29	7	4	48	25
	50-74 ans	381	252	129	49	22	203	107
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	73	49	24	30	16	19	8
	55-59 ans	65	45	20	10	2	35	18
	60-64 ans	77	51	26	14	2	37	24
	65-69 ans	107	71	36	8	7	63	29
	70-74 ans	79	54	25	8	0	46	25
	50-74 ans	401	270	131	70	27	200	104
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	18	12	6	7	3	5	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 18 - Cher

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	13	10	3	2	0	8	3
	60-64 ans	21	14	7	2	2	12	5
	65-69 ans	33	25	8	7	2	18	6
	70-74 ans	20	15	5	3	1	12	4
	50-74 ans	105	76	29	21	8	55	21
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	2	5	2	4	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	16	7	9	3	4	4	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	25	12	13	2	3	10	10
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	121	76	45	47	24	29	21
	55-59 ans	121	81	40	19	7	62	33
	60-64 ans	164	111	53	22	6	89	47
	65-69 ans	213	145	68	16	8	129	60
	70-74 ans	163	109	54	15	4	94	50
	50-74 ans	782	522	260	119	49	403	211

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 18 - Cher

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	73	49	24	30	16	19	8
	55-59 ans	65	45	20	10	2	35	18
	60-64 ans	77	51	26	14	2	37	24
	65-69 ans	107	71	36	8	7	63	29
	70-74 ans	79	54	25	8	0	46	25
	50-74 ans	401	270	131	70	27	200	104
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	49	34	15	22	9	12	6
	55-59 ans	45	34	11	8	1	26	10
	60-64 ans	46	31	15	8	1	23	14
	65-69 ans	68	47	21	8	3	39	18
	70-74 ans	50	32	18	7	0	25	18
	50-74 ans	258	178	80	53	14	125	66
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	64	45	19	30	12	15	7
	55-59 ans	61	45	16	11	2	34	14
	60-64 ans	72	55	17	12	1	43	16
	65-69 ans	112	83	29	12	5	71	24
	70-74 ans	87	60	27	8	1	52	26
	50-74 ans	396	288	108	73	21	215	87
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	18	12	6	7	3	5	3
	55-59 ans	13	10	3	2	0	8	3
	60-64 ans	21	14	7	2	2	12	5
	65-69 ans	33	25	8	7	2	18	6
	70-74 ans	20	15	5	3	1	12	4
	50-74 ans	105	76	29	21	8	55	21
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	16	11	5	7	2	4	3
	55-59 ans	13	10	3	2	0	8	3
	60-64 ans	21	14	7	2	2	12	5
	65-69 ans	30	22	8	6	2	16	6
	70-74 ans	19	14	5	2	1	12	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 18 - Cher

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99	71	28	19	7	52	21
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	10	6	4	2	1	4	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	23	15	8	5	2	10	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	13	8	5	4	2	4	3
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	16	11	5	1	1	10	4
	65-69 ans	18	14	4	3	1	11	3
	70-74 ans	14	11	3	2	1	9	2
	50-74 ans	71	52	19	12	5	40	14
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	5	2	3	0	2	2
	55-59 ans	8	7	1	2	0	5	1
	60-64 ans	15	10	5	1	1	9	4
	65-69 ans	12	11	1	2	0	9	1
	70-74 ans	11	10	1	2	0	8	1
	50-74 ans	53	43	10	10	1	33	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	3	3	1	2	2	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	18	9	9	2	4	7	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	11	7	4	1	1	6	3
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	8	7	1	1	0	6	1
	50-74 ans	30	23	7	3	1	20	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 18 - Cher

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	10	1	3	0	7	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	9	5	5	2	4	3
	55-59 ans	13	10	3	2	0	8	3
	60-64 ans	19	13	6	2	2	11	4
	65-69 ans	28	20	8	5	2	15	6
	70-74 ans	17	13	4	1	1	12	3
	50-74 ans	91	65	26	15	7	50	19
A40- Perdus de vue	50-54 ans	23	10	13	6	8	4	5
	55-59 ans	17	12	5	6	2	6	3
	60-64 ans	23	18	5	3	0	15	5
	65-69 ans	24	15	9	5	1	10	8
	70-74 ans	13	9	4	0	1	9	3
	50-74 ans	100	64	36	20	12	44	24

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,7	6,9	6,5	7,6	6,6	5,8	6,3
	55-59 ans	6,3	6,5	6,2	7,8	10,0	6,3	5,6
	60-64 ans	6,5	7,1	5,9	9,5	7,7	6,8	5,7
	65-69 ans	5,9	5,6	6,2	7,2	8,6	5,4	6,0
	70-74 ans	7,3	8,0	6,8	10,1	13,3	7,9	6,4
	50-74 ans	6,5	6,8	6,3	8,0	7,6	6,4	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,0	1,8	2,2	2,1	1,8	1,4
	55-59 ans	1,9	2,0	1,8	3,2	5,3	1,8	1,2
	60-64 ans	1,8	2,0	1,5	3,0	3,3	1,9	1,3
	65-69 ans	1,3	1,3	1,4	2,6	2,7	1,1	1,3
	70-74 ans	2,2	2,3	2,0	6,5	4,2	2,0	1,9
	50-74 ans	1,8	1,9	1,7	2,7	2,8	1,7	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,2	70,2	72,2	70,9	68,9	68,8	77,1
	55-59 ans	70,1	69,0	71,1	59,5	46,9	71,6	77,8
	60-64 ans	72,7	71,4	74,0	68,2	57,6	72,1	76,6
	65-69 ans	77,6	77,6	77,6	64,0	69,0	79,4	78,6
	70-74 ans	70,4	70,9	69,9	35,3	68,2	74,1	70,1
	50-74 ans	72,5	71,8	73,2	66,2	63,9	73,8	76,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,9	4,6	3,3	4,5	3,4	4,7	3,3
	55-59 ans	3,9	5,1	2,9	6,7	3,9	4,8	2,8
	60-64 ans	4,5	6,3	3,0	9,2	3,4	5,9	3,0
	65-69 ans	5,3	6,8	4,0	9,5	4,8	6,5	4,0
	70-74 ans	5,9	7,9	4,3	14,0	7,0	7,5	4,1
	50-74 ans	4,7	6,1	3,5	6,3	3,7	6,0	3,4
50-74 ans **	4,6	5,9	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,8	98,7	99,0	100,0	100,0	98,3	98,8
	60-64 ans	99,7	99,5	100,0	97,6	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,4	99,5	99,2	95,5	100,0	100,0	99,1
	50-74 ans	99,6	99,6	99,7	99,1	100,0	99,7	99,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,8	92,5	86,6	92,6	85,0	92,2	88,9
	55-59 ans	92,1	91,9	92,2	82,9	83,3	94,7	94,1
	60-64 ans	91,8	89,9	95,1	87,5	100,0	90,5	94,5
	65-69 ans	91,7	91,1	92,7	84,4	93,8	92,1	92,5
	70-74 ans	93,5	92,9	94,4	90,5	90,9	93,2	94,8
	50-74 ans	91,8	91,6	92,2	88,8	87,8	92,4	93,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,5	98,0	99,1	98,9	100,0	96,6	97,9
	55-59 ans	98,3	97,8	98,9	100,0	100,0	97,2	98,8
	60-64 ans	96,4	97,3	94,9	100,0	100,0	96,7	94,2
	65-69 ans	97,4	97,3	97,6	96,3	93,3	97,5	98,0
	70-74 ans	98,0	98,4	97,5	100,0	100,0	98,2	97,2
	50-74 ans	97,7	97,7	97,5	99,0	99,2	97,4	97,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	130	124	137	133	132	110	144
	55-59 ans	112	115	108	110	113	117	107
	60-64 ans	112	112	111	142	161	105	104
	65-69 ans	108	105	111	112	103	104	112
	70-74 ans	100	92	112	82	124	93	111
	50-74 ans	111	109	116	124	129	104	112
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89 (60-129)	88 (60-129)	91,5 (60,5-128,5)	86 (58,5-145)	93 (61,5-128,5)	88 (61-118)	88,5 (60-129)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	83 (62-113,5)	81 (58-120)	86 (69-107)	89 (63-149)	85 (68-105)	76,5 (57,5-113,5)	87 (69-108)
	60-64 ans	82 (56-116,5)	84 (56-115)	77 (57-120)	89 (68-132)	103 (63-268)	82,5 (55,5-112)	76 (55-115)
	65-69 ans	82 (57-116)	75 (54-116)	85 (61-116,5)	83 (62-117)	70 (46-85)	74 (54-116)	87 (62-126)
	70-74 ans	76 (56-105)	76 (56-103)	76 (56-110)	74 (56-102)	83 (67-175)	76 (56-103)	76 (56-108)
	50-74 ans	82 (58-116)	80 (57-115)	84 (60-117)	85 (62-136)	86 (63-128)	78,5 (56-111)	83 (60-115)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,8	6,3	9,7	6,3	10,0	6,3	9,3
	55-59 ans	6,7	7,9	4,8	17,1	11,1	5,2	3,5
	60-64 ans	6,9	8,6	4,1	7,3	0,0	8,9	4,6
	65-69 ans	5,7	6,1	5,1	15,6	6,3	4,7	5,0
	70-74 ans	4,0	4,5	3,1	0,0	9,1	5,1	2,6
	50-74 ans	6,1	6,6	5,4	8,9	8,6	5,9	4,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	99,3	98,3	98,9	98,5	100,0	97,9
	55-59 ans	98,3	98,5	97,9	100,0	93,3	98,1	98,8
	60-64 ans	97,7	97,9	97,4	97,1	100,0	98,0	97,1
	65-69 ans	98,7	99,1	98,2	100,0	93,3	99,0	98,7
	70-74 ans	98,0	98,4	97,5	100,0	100,0	98,2	97,2
	50-74 ans	98,3	98,6	97,9	99,0	97,5	98,5	98,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,0	28,6	43,1	22,7	45,6	37,3	39,6
	55-59 ans	30,8	21,7	43,8	20,7	26,7	22,0	46,9
	60-64 ans	30,3	23,0	41,9	22,9	28,6	23,0	43,7
	65-69 ans	27,4	17,3	41,5	7,4	13,3	18,6	44,3
	70-74 ans	30,7	24,3	40,5	10,0	40,0	26,1	40,5
	50-74 ans	30,5	22,5	42,0	19,1	36,9	23,5	43,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,8	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	4,2
	55-59 ans	0,9	0,7	1,0	3,4	0,0	0,0	1,2
	60-64 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	65-69 ans	1,5	0,9	2,4	3,7	6,7	0,5	2,0
	70-74 ans	1,0	1,1	0,8	0,0	0,0	1,2	0,9
	50-74 ans	0,9	0,7	1,3	1,0	0,8	0,6	1,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,0	0,9	0,0	7,1	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,3	0,0	0,8	0,0	10,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	1,6	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,3	18,4	18,1	19,3	11,8	16,9	27,1
	55-59 ans	23,9	26,1	20,8	31,0	33,3	24,8	18,5
	60-64 ans	28,6	32,1	23,1	22,9	28,6	34,2	22,3
	65-69 ans	27,2	32,7	19,5	29,6	6,7	33,2	20,8
	70-74 ans	27,5	29,7	24,0	35,0	40,0	29,1	22,5
	50-74 ans	25,5	28,5	21,0	24,6	18,0	29,7	21,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,8	33,3	20,7	34,1	23,5	32,2	16,7
	55-59 ans	27,8	32,6	20,8	34,5	13,3	32,1	22,2
	60-64 ans	25,3	27,3	22,2	40,0	14,3	24,3	23,3
	65-69 ans	27,4	31,4	22,0	29,6	46,7	31,7	19,5
	70-74 ans	25,8	29,2	20,7	40,0	0,0	27,9	22,5
	50-74 ans	26,8	30,6	21,3	35,2	22,1	29,2	21,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,8	8,2	5,2	8,0	4,4	8,5	6,3
	55-59 ans	5,6	7,2	3,1	6,9	0,0	7,3	3,7
	60-64 ans	6,9	7,5	6,0	5,7	14,3	7,9	4,9
	65-69 ans	8,5	11,1	4,9	25,9	13,3	9,0	4,0
	70-74 ans	6,5	8,1	4,1	15,0	10,0	7,3	3,6
	50-74 ans	7,0	8,6	4,7	10,6	6,6	8,0	4,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,7	1,4	4,3	2,3	5,9	0,0	2,1
	55-59 ans	1,3	1,4	1,0	3,4	0,0	0,9	1,2
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,3
	70-74 ans	1,3	1,6	0,8	0,0	0,0	1,8	0,9
	50-74 ans	1,1	0,8	1,5	1,5	3,3	0,6	1,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,7	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,3	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0
	65-69 ans	0,8	0,9	0,6	0,0	0,0	1,0	0,7
	70-74 ans	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	50-74 ans	0,5	0,6	0,3	0,5	0,0	0,6	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	0,7	1,7	1,1	1,5	0,0	2,1
	55-59 ans	1,7	1,4	2,1	0,0	6,7	1,8	1,2
	60-64 ans	2,0	2,1	1,7	2,9	0,0	2,0	1,9
	65-69 ans	1,8	1,3	2,4	0,0	6,7	1,5	2,0
	70-74 ans	1,6	1,1	2,5	0,0	0,0	1,2	2,7
	50-74 ans	1,7	1,4	2,1	1,0	2,5	1,5	2,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	16,1	21,8	11,2	22,1	10,1	21,2	12,8
	55-59 ans	18,5	27,5	11,2	36,5	15,1	25,5	10,6
	60-64 ans	22,3	33,6	13,1	49,2	14,5	31,2	12,9
	65-69 ans	26,6	40,0	15,5	47,3	24,2	39,3	14,8
	70-74 ans	29,7	43,4	18,1	95,5	25,3	39,9	17,7
	50-74 ans	22,4	32,9	13,7	33,2	13,1	32,8	13,8
	50-74 ans **	21,9	31,4	13,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,7	14,0	6,0	14,1	6,7	13,9	4,9
	55-59 ans	10,0	15,3	5,6	19,2	4,3	14,4	5,8
	60-64 ans	10,5	15,4	6,4	31,3	4,8	13,0	6,6
	65-69 ans	13,3	19,6	8,2	23,7	21,2	19,2	7,1
	70-74 ans	14,4	21,5	8,4	51,0	0,0	19,5	8,9
	50-74 ans	11,5	17,0	6,9	19,5	7,2	16,3	6,8
	50-74 ans **	11,4	16,5	6,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	9,7	3,7	10,4	3,8	8,8	3,6
	55-59 ans	6,9	11,5	3,1	15,4	2,2	10,7	3,2
	60-64 ans	6,3	9,4	3,7	17,9	2,4	8,1	3,8
	65-69 ans	8,5	13,0	4,8	23,7	9,1	11,9	4,4
	70-74 ans	9,1	12,7	6,0	44,6	0,0	10,6	6,4
	50-74 ans	7,4	11,2	4,2	14,8	3,7	10,2	4,3
	50-74 ans **	7,4	11,0	4,1	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 18 - Cher

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	12,9	4,7	14,1	5,1	11,0	4,3
	55-59 ans	9,4	15,3	4,5	21,2	4,3	14,0	4,5
	60-64 ans	9,8	16,7	4,2	26,8	2,4	15,1	4,4
	65-69 ans	14,0	22,9	6,6	35,5	15,2	21,6	5,9
	70-74 ans	15,8	23,9	9,1	51,0	6,3	22,1	9,2
	50-74 ans	11,3	18,1	5,7	20,4	5,6	17,5	5,7
	50-74 ans **	11,1	17,3	5,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,4	1,5	3,3	1,3	3,7	1,8
	55-59 ans	2,0	3,4	0,8	3,8	0,0	3,3	1,0
	60-64 ans	2,9	4,2	1,7	4,5	4,8	4,2	1,4
	65-69 ans	4,1	6,9	1,8	20,7	6,1	5,5	1,5
	70-74 ans	3,6	6,0	1,7	19,1	6,3	5,1	1,4
	50-74 ans	3,0	4,8	1,5	5,9	2,1	4,5	1,4
	50-74 ans **	2,9	4,5	1,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	12,5	18,2	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	23,1	20,0	33,3	0,0	0,0	25,0	33,3
	60-64 ans	19,0	14,3	28,6	50,0	50,0	8,3	20,0
	65-69 ans	33,3	27,3	50,0	33,3	50,0	25,0	50,0
	70-74 ans	21,1	21,4	20,0	0,0	0,0	25,0	25,0
	50-74 ans	23,2	21,1	28,6	26,3	28,6	19,2	28,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)