

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 30 - Gard

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 526	5 517	6 009	4 066	4 298	1 451	1 711
	55-59 ans	10 816	4 977	5 839	1 613	1 646	3 364	4 193
	60-64 ans	11 803	5 341	6 462	1 556	1 589	3 785	4 873
	65-69 ans	13 122	6 000	7 122	1 449	1 337	4 551	5 785
	70-74 ans	9 557	4 347	5 210	781	806	3 566	4 404
	50-74 ans	56 824	26 182	30 642	9 465	9 676	16 717	20 966
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	779	367	412	297	334	70	78
	55-59 ans	707	327	380	115	124	212	256
	60-64 ans	767	346	421	109	110	237	311
	65-69 ans	817	376	441	86	91	290	350
	70-74 ans	701	303	398	53	74	250	324
	50-74 ans	3 771	1 719	2 052	660	733	1 059	1 319
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	618	297	321	234	256	63	65
	55-59 ans	564	258	306	80	91	178	215
	60-64 ans	649	290	359	87	87	203	272
	65-69 ans	701	325	376	68	64	257	312
	70-74 ans	546	238	308	34	53	204	255
	50-74 ans	3 078	1 408	1 670	503	551	905	1 119
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	161	70	91	63	78	7	13
	55-59 ans	143	69	74	35	33	34	41
	60-64 ans	118	56	62	22	23	34	39
	65-69 ans	116	51	65	18	27	33	38
	70-74 ans	155	65	90	19	21	46	69
	50-74 ans	693	311	382	157	182	154	200
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11 365	5 447	5 918	4 003	4 220	1 444	1 698
	55-59 ans	10 673	4 908	5 765	1 578	1 613	3 330	4 152
	60-64 ans	11 685	5 285	6 400	1 534	1 566	3 751	4 834
	65-69 ans	13 006	5 949	7 057	1 431	1 310	4 518	5 747
	70-74 ans	9 402	4 282	5 120	762	785	3 520	4 335
	50-74 ans	56 131	25 871	30 260	9 308	9 494	16 563	20 766
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	436	248	188	183	128	65	60
	55-59 ans	433	251	182	94	57	157	125
	60-64 ans	546	320	226	94	64	226	162
	65-69 ans	741	431	310	142	53	289	257

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	582	330	252	70	49	260	203
	50-74 ans	2 738	1 580	1 158	583	351	997	807
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	435	248	187	183	127	65	60
	55-59 ans	433	251	182	94	57	157	125
	60-64 ans	545	319	226	93	64	226	162
	65-69 ans	740	430	310	141	53	289	257
	70-74 ans	578	328	250	70	48	258	202
	50-74 ans	2 731	1 576	1 155	581	349	995	806
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	316	184	132	128	88	56	44
	55-59 ans	338	195	143	69	42	126	101
	60-64 ans	439	257	182	67	52	190	130
	65-69 ans	583	342	241	106	43	236	198
	70-74 ans	473	263	210	46	35	217	175
	50-74 ans	2 149	1 241	908	416	260	825	648
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	311	179	132	124	88	55	44
	55-59 ans	325	191	134	68	40	123	94
	60-64 ans	427	249	178	63	51	186	127
	65-69 ans	576	341	235	106	42	235	193
	70-74 ans	461	254	207	44	33	210	174
	50-74 ans	2 100	1 214	886	405	254	809	632
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	315	183	132	127	88	56	44
	55-59 ans	337	195	142	69	42	126	100
	60-64 ans	436	255	181	66	51	189	130
	65-69 ans	580	342	238	106	43	236	195
	70-74 ans	468	260	208	46	34	214	174
	50-74 ans	2 136	1 235	901	414	258	821	643
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	13	6	7	2	2	4	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	7	4	3	2	2	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	314	182	132	127	88	55	44
	55-59 ans	335	195	140	69	41	126	99
	60-64 ans	433	254	179	66	51	188	128
	65-69 ans	582	342	240	106	43	236	197
	70-74 ans	466	259	207	46	33	213	174
	50-74 ans	2 130	1 232	898	414	256	818	642
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	317	184	133	128	89	56	44
	55-59 ans	339	195	144	69	42	126	102
	60-64 ans	441	259	182	68	52	191	130
	65-69 ans	583	342	241	106	43	236	198
	70-74 ans	476	265	211	47	36	218	175
	50-74 ans	2 156	1 245	911	418	262	827	649
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	113	56	57	43	38	13	19
	55-59 ans	124	55	69	13	20	42	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	120	48	72	14	18	34	54
	65-69 ans	175	74	101	28	21	46	80
	70-74 ans	144	70	74	11	14	59	60
	50-74 ans	676	303	373	109	111	194	262
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	54	33	21	22	17	11	4
	55-59 ans	57	39	18	19	4	20	14
	60-64 ans	98	68	30	21	5	47	25
	65-69 ans	130	89	41	24	7	65	34
	70-74 ans	93	59	34	10	6	49	28
	50-74 ans	432	288	144	96	39	192	105
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	88	57	31	36	19	21	12
	55-59 ans	86	62	24	20	7	42	17
	60-64 ans	130	91	39	16	14	75	25
	65-69 ans	181	118	63	38	10	80	53
	70-74 ans	144	81	63	11	8	70	55
	50-74 ans	629	409	220	121	58	288	162
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	9	3	7	3	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	21	12	9	8	4	4	5
	60-64 ans	33	19	14	4	5	15	9
	65-69 ans	40	27	13	8	2	19	11
	70-74 ans	41	25	16	7	1	18	15
	50-74 ans	147	92	55	34	15	58	40
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	8	4	4	1	3	3	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	50-74 ans	28	15	13	6	4	9	9
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	6	5	4	4	2	1
	55-59 ans	21	10	11	3	2	7	9
	60-64 ans	25	12	13	4	5	8	8
	65-69 ans	18	13	5	2	0	11	5
	70-74 ans	18	10	8	2	1	8	7
	50-74 ans	93	51	42	15	12	36	30
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	8	3	5	0	2	3	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	142	90	52	58	36	32	16
	55-59 ans	145	103	42	40	11	63	31
	60-64 ans	228	159	69	37	19	122	50
	65-69 ans	311	207	104	62	17	145	87
	70-74 ans	238	141	97	22	14	119	83
	50-74 ans	1 064	700	364	219	97	481	267

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	88	57	31	36	19	21	12
	55-59 ans	86	62	24	20	7	42	17
	60-64 ans	130	91	39	16	14	75	25
	65-69 ans	181	118	63	38	10	80	53
	70-74 ans	144	81	63	11	8	70	55
	50-74 ans	629	409	220	121	58	288	162
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	55	37	18	24	11	13	7
	55-59 ans	51	36	15	11	4	25	11
	60-64 ans	73	54	19	11	10	43	9
	65-69 ans	120	76	44	22	6	54	38
	70-74 ans	82	53	29	5	4	48	25
	50-74 ans	381	256	125	73	35	183	90
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	65	46	19	32	11	14	8
	55-59 ans	68	51	17	15	5	36	12
	60-64 ans	98	73	25	17	11	56	14
	65-69 ans	148	98	50	28	6	70	44
	70-74 ans	110	69	41	8	6	61	35
	50-74 ans	489	337	152	100	39	237	113
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	9	3	7	3	2	0
	55-59 ans	21	12	9	8	4	4	5
	60-64 ans	33	19	14	4	5	15	9
	65-69 ans	40	27	13	8	2	19	11
	70-74 ans	41	25	16	7	1	18	15
	50-74 ans	147	92	55	34	15	58	40
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	8	3	6	3	2	0
	55-59 ans	20	11	9	7	4	4	5
	60-64 ans	33	19	14	4	5	15	9
	65-69 ans	40	27	13	8	2	19	11
	70-74 ans	41	25	16	7	1	18	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	145	90	55	32	15	58	40
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	9	6	3	5	3	1	0
	55-59 ans	16	8	8	4	4	4	4
	60-64 ans	29	17	12	3	4	14	8
	65-69 ans	33	20	13	5	2	15	11
	70-74 ans	33	20	13	5	1	15	12
	50-74 ans	120	71	49	22	14	49	35
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	3	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	7	7	0	3	0	4	0
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	50-74 ans	25	19	6	10	1	9	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	9	6	3	3	1	3	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	3	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	17	13	4	7	0	6	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	8	6	2	3	1	3	1
	60-64 ans	12	6	6	3	2	3	4
	65-69 ans	17	13	4	5	0	8	4
	70-74 ans	14	11	3	6	0	5	3
	50-74 ans	54	39	15	19	3	20	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	87	50	37	43	25	7	12
	55-59 ans	68	39	29	18	12	21	17
	60-64 ans	87	49	38	19	10	30	28
	65-69 ans	108	68	40	31	7	37	33
	70-74 ans	69	44	25	16	9	28	16
	50-74 ans	419	250	169	127	63	123	106

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,8	6,7	6,9	7,3	7,8	4,8	4,6
	55-59 ans	6,5	6,6	6,5	7,1	7,5	6,3	6,1
	60-64 ans	6,5	6,5	6,5	7,0	6,9	6,3	6,4
	65-69 ans	6,2	6,3	6,2	5,9	6,8	6,4	6,1
	70-74 ans	7,3	7,0	7,6	6,8	9,2	7,0	7,4
	50-74 ans	6,6	6,6	6,7	7,0	7,6	6,3	6,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,3	1,5	1,5	1,8	0,5	0,8
	55-59 ans	1,3	1,4	1,3	2,2	2,0	1,0	1,0
	60-64 ans	1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	0,9	0,8
	65-69 ans	0,9	0,9	0,9	1,2	2,0	0,7	0,7
	70-74 ans	1,6	1,5	1,7	2,4	2,6	1,3	1,6
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	1,7	1,9	0,9	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	79,3	80,9	77,9	78,8	76,6	90,0	83,3
	55-59 ans	79,8	78,9	80,5	69,6	73,4	84,0	84,0
	60-64 ans	84,6	83,8	85,3	79,8	79,1	85,7	87,5
	65-69 ans	85,8	86,4	85,3	79,1	70,3	88,6	89,1
	70-74 ans	77,9	78,5	77,4	64,2	71,6	81,6	78,7
	50-74 ans	81,6	81,9	81,4	76,2	75,2	85,5	84,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,6	3,2	4,6	3,0	4,5	3,5
	55-59 ans	4,1	5,1	3,2	6,0	3,5	4,7	3,0
	60-64 ans	4,7	6,1	3,5	6,1	4,1	6,0	3,4
	65-69 ans	5,7	7,2	4,4	9,9	4,0	6,4	4,5
	70-74 ans	6,2	7,7	4,9	9,2	6,2	7,4	4,7
	50-74 ans	4,9	6,1	3,8	6,3	3,7	6,0	3,9
50-74 ans **	4,7	5,8	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	99,2	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,8	99,7	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,9	99,8	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,3	99,4	99,2	100,0	98,0	99,2	99,5
	50-74 ans	99,7	99,7	99,7	99,7	99,4	99,8	99,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	72,6	74,2	70,6	69,9	69,3	86,2	73,3
	55-59 ans	78,1	77,7	78,6	73,4	73,7	80,3	80,8
	60-64 ans	80,6	80,6	80,5	72,0	81,3	84,1	80,2
	65-69 ans	78,8	79,5	77,7	75,2	81,1	81,7	77,0
	70-74 ans	81,8	80,2	84,0	65,7	72,9	84,1	86,6
	50-74 ans	78,7	78,7	78,6	71,6	74,5	82,9	80,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,4	97,3	100,0	96,9	100,0	98,2	100,0
	55-59 ans	96,2	97,9	93,7	98,6	95,2	97,6	93,1
	60-64 ans	97,3	96,9	97,8	94,0	98,1	97,9	97,7
	65-69 ans	98,8	99,7	97,5	100,0	97,7	99,6	97,5
	70-74 ans	97,5	96,6	98,6	95,7	94,3	96,8	99,4
	50-74 ans	97,7	97,8	97,6	97,4	97,7	98,1	97,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	4	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	93	94	91	98	85	84	104
	55-59 ans	97	97	97	97	102	97	95
	60-64 ans	92	92	91	98	97	90	89
	65-69 ans	91	92	88	97	76	90	91
	70-74 ans	90	88	93	83	105	89	90
	50-74 ans	92	92	92	96	91	90	92
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74 (52,5-103)	76 (52-100,5)	68,5 (52,5-104)	77 (55-113,5)	65,5 (49-100,5)	74,5 (49-91,5)	73,5 (59,5-104,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	70 (50-111)	76 (51-116)	66 (48-102)	77 (51-120)	71 (54-95)	73 (51-116)	63 (46-102)
	60-64 ans	72 (52-103)	73 (52-99)	71,5 (53-105)	71 (50-102)	67,5 (49-114)	75 (52-98)	72,5 (53-99)
	65-69 ans	70 (49-109)	71 (49-108)	69 (50-112)	72 (48-112)	60 (47-81)	71 (50,5-103)	70 (50-113)
	70-74 ans	70 (50-105)	70 (52-105)	70 (49-109)	64,5 (48-109)	79 (50-125)	70 (52-105)	70 (49-108)
	50-74 ans	71 (50-106)	73 (51-106)	69 (50-106)	74,5 (49-112)	67 (49-104)	71 (51-104)	70 (50-109)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	20,0	20,2	19,7	23,5	19,5	10,8	20,0
	55-59 ans	15,7	15,5	15,9	19,1	21,1	13,4	13,6
	60-64 ans	15,9	15,3	16,8	20,2	15,6	13,3	17,3
	65-69 ans	14,6	15,8	12,9	21,8	13,2	12,8	12,8
	70-74 ans	11,9	13,3	9,9	22,9	18,4	10,8	7,9
	50-74 ans	15,3	15,8	14,6	21,8	17,9	12,3	13,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	98,9	100,0	99,2	100,0	98,2	100,0
	55-59 ans	99,1	100,0	97,9	100,0	97,6	100,0	98,0
	60-64 ans	98,6	98,8	98,4	98,5	98,1	98,9	98,5
	65-69 ans	99,8	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	99,5
	70-74 ans	98,5	98,5	98,6	100,0	94,3	98,2	99,4
	50-74 ans	99,1	99,3	98,9	99,5	98,5	99,2	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,6	30,4	42,9	33,6	42,7	23,2	43,2
	55-59 ans	36,6	28,2	47,9	18,8	47,6	33,3	48,0
	60-64 ans	27,2	18,5	39,6	20,6	34,6	17,8	41,5
	65-69 ans	30,0	21,6	41,9	26,4	48,8	19,5	40,4
	70-74 ans	30,3	26,4	35,1	23,4	38,9	27,1	34,3
	50-74 ans	31,4	24,3	40,9	26,1	42,4	23,5	40,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	2,3	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4	0,1	0,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	1,0	0,0	1,4	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,3	0,8	0,0	0,0	0,4	1,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,0	17,9	15,8	17,2	19,1	19,6	9,1
	55-59 ans	16,8	20,0	12,5	27,5	9,5	15,9	13,7
	60-64 ans	22,2	26,3	16,5	30,9	9,6	24,6	19,2
	65-69 ans	22,3	26,0	17,0	22,6	16,3	27,5	17,2
	70-74 ans	19,5	22,3	16,1	21,3	16,7	22,5	16,0
	50-74 ans	20,0	23,1	15,8	23,0	14,9	23,2	16,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,8	31,0	23,3	28,1	21,3	37,5	27,3
	55-59 ans	25,4	31,8	16,7	29,0	16,7	33,3	16,7
	60-64 ans	29,5	35,1	21,4	23,5	26,9	39,3	19,2
	65-69 ans	31,0	34,5	26,1	35,8	23,3	33,9	26,8
	70-74 ans	30,3	30,6	29,9	23,4	22,2	32,1	31,4
	50-74 ans	29,2	32,9	24,1	28,9	22,1	34,8	25,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	4,9	2,3	5,5	3,4	3,6	0,0
	55-59 ans	6,2	6,2	6,3	11,6	9,5	3,2	4,9
	60-64 ans	7,5	7,3	7,7	5,9	9,6	7,9	6,9
	65-69 ans	6,9	7,9	5,4	7,5	4,7	8,1	5,6
	70-74 ans	8,6	9,4	7,6	14,9	2,8	8,3	8,6
	50-74 ans	6,8	7,4	6,0	8,1	5,7	7,0	6,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,9	2,2	1,5	2,3	1,1	1,8	2,3
	55-59 ans	0,6	0,5	0,7	1,4	0,0	0,0	1,0
	60-64 ans	1,8	1,5	2,2	1,5	5,8	1,6	0,8
	65-69 ans	0,7	0,6	0,8	0,0	0,0	0,8	1,0
	70-74 ans	1,7	1,5	1,9	2,1	0,0	1,4	2,3
	50-74 ans	1,3	1,2	1,4	1,4	1,5	1,1	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,5	3,3	3,8	3,1	4,5	3,6	2,3
	55-59 ans	6,2	5,1	7,6	4,3	4,8	5,6	8,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5,7	4,6	7,1	5,9	9,6	4,2	6,2
	65-69 ans	3,1	3,8	2,1	1,9	0,0	4,7	2,5
	70-74 ans	3,8	3,8	3,8	4,3	2,8	3,7	4,0
	50-74 ans	4,3	4,1	4,6	3,6	4,6	4,4	4,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
	55-59 ans	0,6	0,0	1,4	0,0	2,4	0,0	1,0
	60-64 ans	0,7	0,4	1,1	0,0	0,0	0,5	1,5
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,4	0,5	0,0	2,8	0,5	0,0
	50-74 ans	0,4	0,2	0,5	0,0	0,8	0,4	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,5	16,5	8,8	14,5	8,5	22,2	9,4
	55-59 ans	13,6	21,0	7,3	25,3	6,8	18,9	7,5
	60-64 ans	19,5	30,1	10,8	24,1	12,1	32,5	10,3
	65-69 ans	23,9	34,8	14,7	43,3	13,0	32,1	15,1
	70-74 ans	25,3	32,9	18,9	28,9	17,8	33,8	19,1
	50-74 ans	19,0	27,1	12,0	23,5	10,2	29,0	12,9
	50-74 ans **	18,1	25,5	11,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	10,5	5,2	9,0	4,5	14,5	7,1
	55-59 ans	8,1	12,6	4,2	12,7	4,3	12,6	4,1
	60-64 ans	11,1	17,2	6,1	10,4	8,9	20,0	5,2
	65-69 ans	13,9	19,8	8,9	26,6	7,6	17,7	9,2
	70-74 ans	15,3	18,9	12,3	14,4	10,2	19,9	12,7
	50-74 ans	11,2	15,8	7,3	13,0	6,1	17,4	7,8
	50-74 ans **	10,7	15,0	6,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,8	6,8	3,0	6,0	2,6	9,0	4,1
	55-59 ans	4,8	7,3	2,6	7,0	2,5	7,5	2,6
	60-64 ans	6,2	10,2	3,0	7,2	6,4	11,5	1,9
	65-69 ans	9,2	12,8	6,2	15,4	4,6	12,0	6,6
	70-74 ans	8,7	12,4	5,7	6,6	5,1	13,6	5,8
	50-74 ans	6,8	9,9	4,1	7,8	3,7	11,0	4,3
	50-74 ans **	6,4	9,3	3,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	8,4	3,2	8,0	2,6	9,7	4,7
	55-59 ans	6,4	10,4	2,9	9,5	3,1	10,8	2,9
	60-64 ans	8,4	13,8	3,9	11,1	7,0	14,9	2,9
	65-69 ans	11,4	16,5	7,1	19,6	4,6	15,5	7,7
	70-74 ans	11,7	16,1	8,0	10,5	7,6	17,3	8,1
	50-74 ans	8,7	13,0	5,0	10,7	4,1	14,3	5,4
	50-74 ans **	8,3	12,3	4,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,7	0,5	1,7	0,7	1,4	0,0
	55-59 ans	2,0	2,4	1,6	5,1	2,5	1,2	1,2
	60-64 ans	2,8	3,6	2,2	2,6	3,2	4,0	1,9
	65-69 ans	3,1	4,5	1,8	5,6	1,5	4,2	1,9
	70-74 ans	4,4	5,8	3,1	9,2	1,3	5,1	3,5
	50-74 ans	2,6	3,6	1,8	3,7	1,6	3,5	1,9
	50-74 ans **	2,5	3,3	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	81,8	75,0	100,0	83,3	100,0	50,0	0,0
	55-59 ans	80,0	72,7	88,9	57,1	100,0	100,0	80,0
	60-64 ans	87,9	89,5	85,7	75,0	80,0	93,3	88,9
	65-69 ans	82,5	74,1	100,0	62,5	100,0	78,9	100,0
	70-74 ans	80,5	80,0	81,3	71,4	100,0	83,3	80,0
	50-74 ans	82,8	78,9	89,1	68,8	93,3	84,5	87,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)