

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/14

Département : 32 - Gers

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 4 384 | 2 035 | 2 349 | 1 499 | 1 615 | 536 | 734 |
| | 55-59 ans | 3 876 | 1 773 | 2 103 | 468 | 508 | 1 305 | 1 595 |
| | 60-64 ans | 4 224 | 1 923 | 2 301 | 490 | 494 | 1 433 | 1 807 |
| | 65-69 ans | 4 508 | 2 084 | 2 424 | 396 | 436 | 1 688 | 1 988 |
| | 70-74 ans | 3 151 | 1 423 | 1 728 | 238 | 224 | 1 185 | 1 504 |
| | 50-74 ans | 20 143 | 9 238 | 10 905 | 3 091 | 3 277 | 6 147 | 7 628 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 288 | 140 | 148 | 111 | 101 | 29 | 47 |
| | 55-59 ans | 249 | 117 | 132 | 43 | 38 | 74 | 94 |
| | 60-64 ans | 232 | 100 | 132 | 31 | 33 | 69 | 99 |
| | 65-69 ans | 302 | 133 | 169 | 27 | 41 | 106 | 128 |
| | 70-74 ans | 270 | 120 | 150 | 23 | 34 | 97 | 116 |
| | 50-74 ans | 1 341 | 610 | 731 | 235 | 247 | 375 | 484 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 215 | 110 | 105 | 86 | 73 | 24 | 32 |
| | 55-59 ans | 195 | 93 | 102 | 28 | 24 | 65 | 78 |
| | 60-64 ans | 199 | 85 | 114 | 25 | 27 | 60 | 87 |
| | 65-69 ans | 237 | 103 | 134 | 17 | 28 | 86 | 106 |
| | 70-74 ans | 180 | 78 | 102 | 13 | 18 | 65 | 84 |
| | 50-74 ans | 1 026 | 469 | 557 | 169 | 170 | 300 | 387 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 73 | 30 | 43 | 25 | 28 | 5 | 15 |
| | 55-59 ans | 54 | 24 | 30 | 15 | 14 | 9 | 16 |
| | 60-64 ans | 33 | 15 | 18 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| | 65-69 ans | 65 | 30 | 35 | 10 | 13 | 20 | 22 |
| | 70-74 ans | 90 | 42 | 48 | 10 | 16 | 32 | 32 |
| | 50-74 ans | 315 | 141 | 174 | 66 | 77 | 75 | 97 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 4 311 | 2 005 | 2 306 | 1 474 | 1 587 | 531 | 719 |
| | 55-59 ans | 3 822 | 1 749 | 2 073 | 453 | 494 | 1 296 | 1 579 |
| | 60-64 ans | 4 191 | 1 908 | 2 283 | 484 | 488 | 1 424 | 1 795 |
| | 65-69 ans | 4 443 | 2 054 | 2 389 | 386 | 423 | 1 668 | 1 966 |
| | 70-74 ans | 3 061 | 1 381 | 1 680 | 228 | 208 | 1 153 | 1 472 |
| | 50-74 ans | 19 828 | 9 097 | 10 731 | 3 025 | 3 200 | 6 072 | 7 531 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 161 | 91 | 70 | 68 | 47 | 23 | 23 |
| | 55-59 ans | 138 | 84 | 54 | 29 | 7 | 55 | 47 |
| | 60-64 ans | 195 | 117 | 78 | 42 | 21 | 75 | 57 |
| | 65-69 ans | 226 | 131 | 95 | 27 | 10 | 104 | 85 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 32 - Gers

2/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^S | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 163 | 104 | 59 | 16 | 11 | 88 | 48 |
| | 50-74 ans | 883 | 527 | 356 | 182 | 96 | 345 | 260 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 158 | 90 | 68 | 67 | 45 | 23 | 23 |
| | 55-59 ans | 132 | 80 | 52 | 28 | 6 | 52 | 46 |
| | 60-64 ans | 188 | 114 | 74 | 41 | 20 | 73 | 54 |
| | 65-69 ans | 215 | 124 | 91 | 27 | 9 | 97 | 82 |
| | 70-74 ans | 148 | 92 | 56 | 15 | 10 | 77 | 46 |
| | 50-74 ans | 841 | 500 | 341 | 178 | 90 | 322 | 251 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 152 | 85 | 67 | 62 | 44 | 23 | 23 |
| | 55-59 ans | 125 | 76 | 49 | 25 | 6 | 51 | 43 |
| | 60-64 ans | 180 | 109 | 71 | 38 | 18 | 71 | 53 |
| | 65-69 ans | 210 | 120 | 90 | 25 | 9 | 95 | 81 |
| | 70-74 ans | 144 | 89 | 55 | 14 | 10 | 75 | 45 |
| | 50-74 ans | 811 | 479 | 332 | 164 | 87 | 315 | 245 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 145 | 84 | 61 | 61 | 40 | 23 | 21 |
| | 55-59 ans | 113 | 68 | 45 | 23 | 5 | 45 | 40 |
| | 60-64 ans | 167 | 103 | 64 | 37 | 15 | 66 | 49 |
| | 65-69 ans | 189 | 111 | 78 | 23 | 9 | 88 | 69 |
| | 70-74 ans | 136 | 83 | 53 | 14 | 10 | 69 | 43 |
| | 50-74 ans | 750 | 449 | 301 | 158 | 79 | 291 | 222 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 32 - Gers

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 151 | 84 | 67 | 61 | 44 | 23 | 23 |
| | 55-59 ans | 121 | 73 | 48 | 25 | 6 | 48 | 42 |
| | 60-64 ans | 175 | 107 | 68 | 36 | 16 | 71 | 52 |
| | 65-69 ans | 205 | 119 | 86 | 25 | 9 | 94 | 77 |
| | 70-74 ans | 140 | 85 | 55 | 13 | 10 | 72 | 45 |
| | 50-74 ans | 792 | 468 | 324 | 160 | 85 | 308 | 239 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | 70-74 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 19 | 11 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 152 | 85 | 67 | 62 | 44 | 23 | 23 |
| | 55-59 ans | 123 | 75 | 48 | 25 | 6 | 50 | 42 |
| | 60-64 ans | 180 | 109 | 71 | 38 | 18 | 71 | 53 |
| | 65-69 ans | 209 | 120 | 89 | 25 | 9 | 95 | 80 |
| | 70-74 ans | 144 | 89 | 55 | 14 | 10 | 75 | 45 |
| | 50-74 ans | 808 | 478 | 330 | 164 | 87 | 314 | 243 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 152 | 85 | 67 | 62 | 44 | 23 | 23 |
| | 55-59 ans | 125 | 76 | 49 | 25 | 6 | 51 | 43 |
| | 60-64 ans | 181 | 110 | 71 | 38 | 18 | 72 | 53 |
| | 65-69 ans | 210 | 120 | 90 | 25 | 9 | 95 | 81 |
| | 70-74 ans | 144 | 89 | 55 | 14 | 10 | 75 | 45 |
| | 50-74 ans | 812 | 480 | 332 | 164 | 87 | 316 | 245 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 56 | 23 | 33 | 17 | 20 | 6 | 13 |
| | 55-59 ans | 40 | 15 | 25 | 5 | 3 | 10 | 22 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 32 - Gers

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 62 | 30 | 32 | 11 | 7 | 19 | 25 |
| | 65-69 ans | 59 | 33 | 26 | 5 | 3 | 28 | 23 |
| | 70-74 ans | 43 | 24 | 19 | 3 | 1 | 21 | 18 |
| | 50-74 ans | 260 | 125 | 135 | 41 | 34 | 84 | 101 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 26 | 19 | 7 | 15 | 4 | 4 | 3 |
| | 55-59 ans | 26 | 19 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 |
| | 60-64 ans | 33 | 23 | 10 | 9 | 2 | 14 | 8 |
| | 65-69 ans | 46 | 28 | 18 | 5 | 2 | 23 | 16 |
| | 70-74 ans | 36 | 25 | 11 | 4 | 3 | 21 | 8 |
| | 50-74 ans | 167 | 114 | 53 | 39 | 13 | 75 | 40 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 56 | 37 | 19 | 27 | 14 | 10 | 5 |
| | 55-59 ans | 40 | 29 | 11 | 11 | 0 | 18 | 11 |
| | 60-64 ans | 53 | 36 | 17 | 13 | 6 | 23 | 11 |
| | 65-69 ans | 66 | 38 | 28 | 9 | 2 | 29 | 26 |
| | 70-74 ans | 53 | 31 | 22 | 6 | 5 | 25 | 17 |
| | 50-74 ans | 268 | 171 | 97 | 66 | 27 | 105 | 70 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 32 - Gers

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| | 60-64 ans | 24 | 15 | 9 | 4 | 3 | 11 | 6 |
| | 65-69 ans | 26 | 14 | 12 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| | 70-74 ans | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| | 50-74 ans | 80 | 48 | 32 | 12 | 10 | 36 | 22 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 82 | 56 | 26 | 42 | 18 | 14 | 8 |
| | 55-59 ans | 66 | 48 | 18 | 17 | 2 | 31 | 16 |
| | 60-64 ans | 86 | 59 | 27 | 22 | 8 | 37 | 19 |
| | 65-69 ans | 112 | 66 | 46 | 14 | 4 | 52 | 42 |
| | 70-74 ans | 89 | 56 | 33 | 10 | 8 | 46 | 25 |
| | 50-74 ans | 435 | 285 | 150 | 105 | 40 | 180 | 110 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 32 - Gers

6/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 56 | 37 | 19 | 27 | 14 | 10 | 5 |
| | 55-59 ans | 40 | 29 | 11 | 11 | 0 | 18 | 11 |
| | 60-64 ans | 53 | 36 | 17 | 13 | 6 | 23 | 11 |
| | 65-69 ans | 66 | 38 | 28 | 9 | 2 | 29 | 26 |
| | 70-74 ans | 53 | 31 | 22 | 6 | 5 | 25 | 17 |
| | 50-74 ans | 268 | 171 | 97 | 66 | 27 | 105 | 70 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 48 | 33 | 15 | 23 | 12 | 10 | 3 |
| | 55-59 ans | 40 | 29 | 11 | 11 | 0 | 18 | 11 |
| | 60-64 ans | 46 | 33 | 13 | 12 | 4 | 21 | 9 |
| | 65-69 ans | 58 | 35 | 23 | 9 | 2 | 26 | 21 |
| | 70-74 ans | 47 | 27 | 20 | 5 | 4 | 22 | 16 |
| | 50-74 ans | 239 | 157 | 82 | 60 | 22 | 97 | 60 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 56 | 39 | 17 | 28 | 13 | 11 | 4 |
| | 55-59 ans | 43 | 31 | 12 | 11 | 1 | 20 | 11 |
| | 60-64 ans | 51 | 38 | 13 | 15 | 4 | 23 | 9 |
| | 65-69 ans | 74 | 48 | 26 | 11 | 2 | 37 | 24 |
| | 70-74 ans | 54 | 33 | 21 | 6 | 4 | 27 | 17 |
| | 50-74 ans | 278 | 189 | 89 | 71 | 24 | 118 | 65 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| | 60-64 ans | 24 | 15 | 9 | 4 | 3 | 11 | 6 |
| | 65-69 ans | 26 | 14 | 12 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| | 70-74 ans | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| | 50-74 ans | 80 | 48 | 32 | 12 | 10 | 36 | 22 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| | 60-64 ans | 21 | 14 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 |
| | 65-69 ans | 23 | 12 | 11 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| | 70-74 ans | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 32 - Gers

7/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 70 | 42 | 28 | 9 | 9 | 33 | 19 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 18 | 13 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 |
| | 65-69 ans | 19 | 10 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 52 | 30 | 22 | 7 | 6 | 23 | 16 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| | 65-69 ans | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 42 | 22 | 20 | 5 | 5 | 17 | 15 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 21 | 12 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 32 - Gers

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 20 | 14 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| | 65-69 ans | 20 | 11 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| | 70-74 ans | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| | 50-74 ans | 60 | 36 | 24 | 8 | 7 | 28 | 17 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 |

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 32 - Gers

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 6,6 | 6,9 | 6,3 | 7,4 | 6,3 | 5,4 | 6,4 |
| | 55-59 ans | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 9,2 | 7,5 | 5,7 | 5,9 |
| | 60-64 ans | 5,5 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 6,7 | 4,8 | 5,5 |
| | 65-69 ans | 6,7 | 6,4 | 7,0 | 6,8 | 9,4 | 6,3 | 6,4 |
| | 70-74 ans | 8,6 | 8,4 | 8,7 | 9,7 | 15,2 | 8,2 | 7,7 |
| | 50-74 ans | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 7,6 | 7,5 | 6,1 | 6,3 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 2,0 |
| | 55-59 ans | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3,2 | 2,8 | 0,7 | 1,0 |
| | 60-64 ans | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 4,2 | 7,1 | 2,7 | 2,1 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 1,2 | 1,3 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 74,7 | 78,6 | 70,9 | 77,5 | 72,3 | 82,8 | 68,1 |
| | 55-59 ans | 78,3 | 79,5 | 77,3 | 65,1 | 63,2 | 87,8 | 83,0 |
| | 60-64 ans | 85,8 | 85,0 | 86,4 | 80,6 | 81,8 | 87,0 | 87,9 |
| | 65-69 ans | 78,5 | 77,4 | 79,3 | 63,0 | 68,3 | 81,1 | 82,8 |
| | 70-74 ans | 66,7 | 65,0 | 68,0 | 56,5 | 52,9 | 67,0 | 72,4 |
| | 50-74 ans | 76,5 | 76,9 | 76,2 | 71,9 | 68,8 | 80,0 | 80,0 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 3,7 | 4,5 | 3,0 | 4,6 | 3,0 | 4,3 | 3,2 |
| | 55-59 ans | 3,6 | 4,8 | 2,6 | 6,4 | 1,4 | 4,2 | 3,0 |
| | 60-64 ans | 4,7 | 6,1 | 3,4 | 8,7 | 4,3 | 5,3 | 3,2 |
| | 65-69 ans | 5,1 | 6,4 | 4,0 | 7,0 | 2,4 | 6,2 | 4,3 |
| | 70-74 ans | 5,3 | 7,5 | 3,5 | 7,0 | 5,3 | 7,6 | 3,3 |
| | 50-74 ans | 4,5 | 5,8 | 3,3 | 6,0 | 3,0 | 5,7 | 3,5 |
| 50-74 ans ** | 4,4 | 5,6 | 3,2 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 98,1 | 98,9 | 97,1 | 98,5 | 95,7 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 95,7 | 95,2 | 96,3 | 96,6 | 85,7 | 94,5 | 97,9 |
| | 60-64 ans | 96,4 | 97,4 | 94,9 | 97,6 | 95,2 | 97,3 | 94,7 |
| | 65-69 ans | 95,1 | 94,7 | 95,8 | 100,0 | 90,0 | 93,3 | 96,5 |
| | 70-74 ans | 90,8 | 88,5 | 94,9 | 93,8 | 90,9 | 87,5 | 95,8 |
| | 50-74 ans | 95,2 | 94,9 | 95,8 | 97,8 | 93,8 | 93,3 | 96,5 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 32 - Gers

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 96,2 | 94,4 | 98,5 | 92,5 | 97,8 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 94,7 | 95,0 | 94,2 | 89,3 | 100,0 | 98,1 | 93,5 |
| | 60-64 ans | 95,7 | 95,6 | 95,9 | 92,7 | 90,0 | 97,3 | 98,1 |
| | 65-69 ans | 97,7 | 96,8 | 98,9 | 92,6 | 100,0 | 97,9 | 98,8 |
| | 70-74 ans | 97,3 | 96,7 | 98,2 | 93,3 | 100,0 | 97,4 | 97,8 |
| | 50-74 ans | 96,4 | 95,8 | 97,4 | 92,1 | 96,7 | 97,8 | 97,6 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 95,4 | 98,8 | 91,0 | 98,4 | 90,9 | 100,0 | 91,3 |
| | 55-59 ans | 90,4 | 89,5 | 91,8 | 92,0 | 83,3 | 88,2 | 93,0 |
| | 60-64 ans | 92,8 | 94,5 | 90,1 | 97,4 | 83,3 | 93,0 | 92,5 |
| | 65-69 ans | 90,0 | 92,5 | 86,7 | 92,0 | 100,0 | 92,6 | 85,2 |
| | 70-74 ans | 94,4 | 93,3 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 92,0 | 95,6 |
| | 50-74 ans | 92,5 | 93,7 | 90,7 | 96,3 | 90,8 | 92,4 | 90,6 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 55-59 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 60-64 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 65-69 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 70-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 50-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 92 | 94 | 89 | 88 | 81 | 111 | 105 |
| | 55-59 ans | 92 | 103 | 74 | 100 | 66 | 105 | 75 |
| | 60-64 ans | 87 | 90 | 82 | 113 | 85 | 77 | 80 |
| | 65-69 ans | 89 | 92 | 84 | 87 | 65 | 94 | 87 |
| | 70-74 ans | 86 | 92 | 75 | 96 | 74 | 92 | 75 |
| | 50-74 ans | 89 | 94 | 82 | 96 | 79 | 93 | 83 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 68 (48,5-102,5) | 70 (53-103) | 62 (45-102) | 64 (52-99) | 65 (45,5-97,5) | 86 (60-131) | 62 (43-122) |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 32 - Gers

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 74 (50-100) | 76 (50,5-106) | 71 (49-89) | 74 (48-104) | 63,5 (48-85) | 78 (56-107) | 71 (49-90) |
| | 60-64 ans | 64 (46-90,5) | 63 (46-91) | 66 (44-87) | 69 (44-123) | 67,5 (54-84) | 60 (46-84) | 65 (43-92) |
| | 65-69 ans | 68 (48-99) | 75,5 (50-106) | 65 (43-93) | 75 (54-109) | 53 (49-73) | 77 (49-104) | 66 (43-93) |
| | 70-74 ans | 69 (53-92) | 70 (53-104) | 69 (54-90) | 84 (56-101) | 60,5 (55-102) | 69 (53-106) | 69 (54-89) |
| | 50-74 ans | 69 (48-97) | 70 (49-103) | 67 (47-91,5) | 70 (49-105) | 62 (49-92) | 70 (49-100) | 68 (46-91) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 3,5 |
| | 65-69 ans | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 2,9 | 3,4 | 0,0 | 9,1 | 3,4 | 2,1 |
| | 50-74 ans | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 0,5 | 2,1 | 1,7 | 1,2 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 98,4 | 98,7 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 97,7 |
| | 60-64 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 65-69 ans | 99,5 | 100,0 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,8 |
| | 70-74 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 50-74 ans | 99,6 | 99,8 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 99,2 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 36,8 | 27,1 | 49,3 | 27,4 | 45,5 | 26,1 | 56,5 |
| | 55-59 ans | 32,0 | 19,7 | 51,0 | 20,0 | 50,0 | 19,6 | 51,2 |
| | 60-64 ans | 34,3 | 27,3 | 45,1 | 28,9 | 38,9 | 26,4 | 47,2 |
| | 65-69 ans | 28,1 | 27,5 | 28,9 | 20,0 | 33,3 | 29,5 | 28,4 |
| | 70-74 ans | 29,9 | 27,0 | 34,5 | 21,4 | 10,0 | 28,0 | 40,0 |
| | 50-74 ans | 32,0 | 26,0 | 40,7 | 25,0 | 39,1 | 26,6 | 41,2 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 32 - Gers

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 0,0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 17,1 | 22,4 | 10,4 | 24,2 | 9,1 | 17,4 | 13,0 |
| | 55-59 ans | 20,8 | 25,0 | 14,3 | 24,0 | 33,3 | 25,5 | 11,6 |
| | 60-64 ans | 18,2 | 20,9 | 14,1 | 23,7 | 11,1 | 19,4 | 15,1 |
| | 65-69 ans | 21,9 | 23,3 | 20,0 | 20,0 | 22,2 | 24,2 | 19,8 |
| | 70-74 ans | 25,0 | 28,1 | 20,0 | 28,6 | 30,0 | 28,0 | 17,8 |
| | 50-74 ans | 20,6 | 23,8 | 16,0 | 23,8 | 14,9 | 23,7 | 16,3 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 36,8 | 43,5 | 28,4 | 43,5 | 31,8 | 43,5 | 21,7 |
| | 55-59 ans | 32,0 | 38,2 | 22,4 | 44,0 | 0,0 | 35,3 | 25,6 |
| | 60-64 ans | 29,3 | 32,7 | 23,9 | 34,2 | 33,3 | 31,9 | 20,8 |
| | 65-69 ans | 31,4 | 31,7 | 31,1 | 36,0 | 22,2 | 30,5 | 32,1 |
| | 70-74 ans | 36,8 | 34,8 | 40,0 | 42,9 | 50,0 | 33,3 | 37,8 |
| | 50-74 ans | 33,0 | 35,6 | 29,2 | 40,2 | 31,0 | 33,2 | 28,6 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 5,3 | 3,5 | 7,5 | 1,6 | 6,8 | 8,7 | 8,7 |
| | 55-59 ans | 9,6 | 11,8 | 6,1 | 8,0 | 16,7 | 13,7 | 4,7 |
| | 60-64 ans | 13,3 | 13,6 | 12,7 | 10,5 | 16,7 | 15,3 | 11,3 |
| | 65-69 ans | 12,4 | 11,7 | 13,3 | 16,0 | 22,2 | 10,5 | 12,3 |
| | 70-74 ans | 6,9 | 7,9 | 5,5 | 7,1 | 10,0 | 8,0 | 4,4 |
| | 50-74 ans | 9,9 | 10,0 | 9,6 | 7,3 | 11,5 | 11,4 | 9,0 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 32 - Gers

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 1,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,2 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,8 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 0,4 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 19,0 | 27,9 | 11,3 | 28,5 | 11,3 | 26,4 | 11,1 |
| | 55-59 ans | 17,3 | 27,4 | 8,7 | 37,5 | 4,0 | 23,9 | 10,1 |
| | 60-64 ans | 20,5 | 30,9 | 11,8 | 45,5 | 16,4 | 26,0 | 10,6 |
| | 65-69 ans | 25,2 | 32,1 | 19,3 | 36,3 | 9,5 | 31,2 | 21,4 |
| | 70-74 ans | 29,1 | 40,6 | 19,6 | 43,9 | 38,5 | 39,9 | 17,0 |
| | 50-74 ans | 21,9 | 31,3 | 14,0 | 34,7 | 12,5 | 29,6 | 14,6 |
| | 50-74 ans ** | 21,6 | 30,8 | 13,3 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 13,0 | 18,5 | 8,2 | 18,3 | 8,8 | 18,8 | 7,0 |
| | 55-59 ans | 10,5 | 16,6 | 5,3 | 24,3 | 0,0 | 13,9 | 7,0 |
| | 60-64 ans | 12,6 | 18,9 | 7,4 | 26,9 | 12,3 | 16,2 | 6,1 |
| | 65-69 ans | 14,9 | 18,5 | 11,7 | 23,3 | 4,7 | 17,4 | 13,2 |
| | 70-74 ans | 17,3 | 22,4 | 13,1 | 26,3 | 24,0 | 21,7 | 11,5 |
| | 50-74 ans | 13,5 | 18,8 | 9,0 | 21,8 | 8,4 | 17,3 | 9,3 |
| | 50-74 ans ** | 13,4 | 18,6 | 8,6 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 11,1 | 16,5 | 6,5 | 15,6 | 7,6 | 18,8 | 4,2 |
| | 55-59 ans | 10,5 | 16,6 | 5,3 | 24,3 | 0,0 | 13,9 | 7,0 |
| | 60-64 ans | 11,0 | 17,3 | 5,7 | 24,8 | 8,2 | 14,7 | 5,0 |
| | 65-69 ans | 13,1 | 17,0 | 9,6 | 23,3 | 4,7 | 15,6 | 10,7 |
| | 70-74 ans | 15,4 | 19,6 | 11,9 | 21,9 | 19,2 | 19,1 | 10,9 |
| | 50-74 ans | 12,1 | 17,3 | 7,6 | 19,8 | 6,9 | 16,0 | 8,0 |
| | 50-74 ans ** | 12,1 | 17,2 | 7,3 | - | - | - | - |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 32 - Gers

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 13,0 | 19,5 | 7,4 | 19,0 | 8,2 | 20,7 | 5,6 |
| | 55-59 ans | 11,3 | 17,7 | 5,8 | 24,3 | 2,0 | 15,4 | 7,0 |
| | 60-64 ans | 12,2 | 19,9 | 5,7 | 31,0 | 8,2 | 16,2 | 5,0 |
| | 65-69 ans | 16,7 | 23,4 | 10,9 | 28,5 | 4,7 | 22,2 | 12,2 |
| | 70-74 ans | 17,6 | 23,9 | 12,5 | 26,3 | 19,2 | 23,4 | 11,5 |
| | 50-74 ans | 14,0 | 20,8 | 8,3 | 23,5 | 7,5 | 19,4 | 8,6 |
| | 50-74 ans ** | 13,9 | 20,3 | 8,0 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,9 | 1,5 | 2,2 | 0,7 | 1,9 | 3,8 | 2,8 |
| | 55-59 ans | 3,1 | 5,1 | 1,4 | 4,4 | 2,0 | 5,4 | 1,3 |
| | 60-64 ans | 5,7 | 7,9 | 3,9 | 8,3 | 6,1 | 7,7 | 3,3 |
| | 65-69 ans | 5,9 | 6,8 | 5,0 | 10,4 | 4,7 | 6,0 | 5,1 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 5,1 | 1,8 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 4,0 | 5,3 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | 5,9 | 2,9 |
| | 50-74 ans ** | 3,8 | 5,0 | 2,7 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 33,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 36,4 | 37,5 | 33,3 | 50,0 | 0,0 | 33,3 | 50,0 |
| | 60-64 ans | 9,5 | 7,1 | 14,3 | 0,0 | 50,0 | 9,1 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 17,4 | 16,7 | 18,2 | 25,0 | 50,0 | 12,5 | 11,1 |
| | 70-74 ans | 11,1 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 18,6 | 21,4 | 14,3 | 22,2 | 22,2 | 21,2 | 10,5 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)