

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 33 - Gironde

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	30 650	14 639	16 011	10 346	11 062	4 293	4 949
	55-59 ans	25 967	12 097	13 870	3 189	3 431	8 908	10 439
	60-64 ans	26 584	11 849	14 735	2 790	3 013	9 059	11 722
	65-69 ans	29 023	13 056	15 967	2 272	2 544	10 784	13 423
	70-74 ans	19 599	8 973	10 626	1 106	1 182	7 867	9 444
	50-74 ans	131 823	60 614	71 209	19 703	21 232	40 911	49 977
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 096	1 027	1 069	793	806	234	263
	55-59 ans	1 858	912	946	315	267	597	679
	60-64 ans	1 719	761	958	196	199	565	759
	65-69 ans	1 741	748	993	169	184	579	809
	70-74 ans	1 432	609	823	83	108	526	715
	50-74 ans	8 846	4 057	4 789	1 556	1 564	2 501	3 225
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 620	800	820	603	603	197	217
	55-59 ans	1 486	722	764	217	189	505	575
	60-64 ans	1 425	646	779	144	132	502	647
	65-69 ans	1 460	640	820	125	129	515	691
	70-74 ans	1 094	453	641	44	68	409	573
	50-74 ans	7 085	3 261	3 824	1 133	1 121	2 128	2 703
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	476	227	249	190	203	37	46
	55-59 ans	372	190	182	98	78	92	104
	60-64 ans	294	115	179	52	67	63	112
	65-69 ans	281	108	173	44	55	64	118
	70-74 ans	338	156	182	39	40	117	142
	50-74 ans	1 761	796	965	423	443	373	522
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	30 174	14 412	15 762	10 156	10 859	4 256	4 903
	55-59 ans	25 595	11 907	13 688	3 091	3 353	8 816	10 335
	60-64 ans	26 290	11 734	14 556	2 738	2 946	8 996	11 610
	65-69 ans	28 742	12 948	15 794	2 228	2 489	10 720	13 305
	70-74 ans	19 261	8 817	10 444	1 067	1 142	7 750	9 302
	50-74 ans	130 062	59 818	70 244	19 280	20 789	40 538	49 455
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 104	625	479	460	329	165	150
	55-59 ans	1 092	644	448	207	123	437	325
	60-64 ans	1 257	748	509	224	123	524	386
	65-69 ans	1 505	866	639	190	116	676	523

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 33 - Gironde

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1 170	702	468	95	69	607	399
	50-74 ans	6 128	3 585	2 543	1 176	760	2 409	1 783
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 088	618	470	457	326	161	144
	55-59 ans	1 075	634	441	205	119	429	322
	60-64 ans	1 226	729	497	214	120	515	377
	65-69 ans	1 463	844	619	187	111	657	508
	70-74 ans	1 142	686	456	92	65	594	391
	50-74 ans	5 994	3 511	2 483	1 155	741	2 356	1 742
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	995	563	432	410	294	153	138
	55-59 ans	998	583	415	183	112	400	303
	60-64 ans	1 156	688	468	200	113	488	355
	65-69 ans	1 370	789	581	171	98	618	483
	70-74 ans	1 064	650	414	83	56	567	358
	50-74 ans	5 583	3 273	2 310	1 047	673	2 226	1 637
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	903	517	386	376	265	141	121
	55-59 ans	912	536	376	164	99	372	277
	60-64 ans	1 049	622	427	176	101	446	326
	65-69 ans	1 236	716	520	153	85	563	435
	70-74 ans	938	572	366	71	54	501	312
	50-74 ans	5 038	2 963	2 075	940	604	2 023	1 471
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	8	6	2	4	2	2	0
	65-69 ans	7	4	3	2	2	2	1
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	26	19	7	9	5	10	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 33 - Gironde

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	985	560	425	408	290	152	135
	55-59 ans	992	580	412	182	111	398	301
	60-64 ans	1 147	685	462	200	111	485	351
	65-69 ans	1 351	784	567	171	97	613	470
	70-74 ans	1 037	633	404	83	56	550	348
	50-74 ans	5 512	3 242	2 270	1 044	665	2 198	1 605
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	10	3	7	2	4	1	3
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	9	3	6	0	2	3	4
	65-69 ans	19	5	14	0	1	5	13
	70-74 ans	27	17	10	0	0	17	10
	50-74 ans	71	31	40	3	8	28	32
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	983	559	424	408	290	151	134
	55-59 ans	993	582	411	182	111	400	300
	60-64 ans	1 147	684	463	200	111	484	352
	65-69 ans	1 354	783	571	170	97	613	474
	70-74 ans	1 045	640	405	83	56	557	349
	50-74 ans	5 522	3 248	2 274	1 043	665	2 205	1 609
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	995	563	432	410	294	153	138
	55-59 ans	998	583	415	183	112	400	303
	60-64 ans	1 160	690	470	201	113	489	357
	65-69 ans	1 373	792	581	171	98	621	483
	70-74 ans	1 068	653	415	84	56	569	359
	50-74 ans	5 594	3 281	2 313	1 049	673	2 232	1 640
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	476	235	241	168	161	67	80
	55-59 ans	435	225	210	69	52	156	158

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	465	238	227	64	56	174	171
	65-69 ans	474	213	261	46	39	167	222
	70-74 ans	351	176	175	22	29	154	146
	50-74 ans	2 201	1 087	1 114	369	337	718	777
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	5	3	2	2	0	1	2
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	19	12	7	5	1	7	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	96	58	38	42	25	16	13
	55-59 ans	102	65	37	16	9	49	28
	60-64 ans	124	77	47	23	9	54	38
	65-69 ans	180	118	62	19	8	99	54
	70-74 ans	141	99	42	15	3	84	39
	50-74 ans	643	417	226	115	54	302	172
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	342	225	117	162	82	63	35
	55-59 ans	390	254	136	85	35	169	101
	60-64 ans	475	316	159	95	35	221	124
	65-69 ans	555	355	200	81	40	274	160
	70-74 ans	419	278	141	31	19	247	122
	50-74 ans	2 181	1 428	753	454	211	974	542
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	63	35	28	30	24	5	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	53	27	26	7	13	20	13
	60-64 ans	78	49	29	17	9	32	20
	65-69 ans	141	95	46	21	9	74	37
	70-74 ans	130	85	45	14	4	71	41
	50-74 ans	465	291	174	89	59	202	115
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	9	6	3	4	2	2	1
	60-64 ans	10	5	5	0	2	5	3
	65-69 ans	14	8	6	3	1	5	5
	70-74 ans	17	8	9	0	1	8	8
	50-74 ans	57	31	26	11	8	20	18
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	3	3	2	0	1	3
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	6	3	3	1	2	2	1
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	27	15	12	6	3	9	9
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	438	283	155	204	107	79	48
	55-59 ans	492	319	173	101	44	218	129
	60-64 ans	600	394	206	119	44	275	162
	65-69 ans	735	473	262	100	48	373	214
	70-74 ans	560	377	183	46	22	331	161
	50-74 ans	2 825	1 846	979	570	265	1 276	714

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 33 - Gironde

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	342	225	117	162	82	63	35
	55-59 ans	390	254	136	85	35	169	101
	60-64 ans	475	316	159	95	35	221	124
	65-69 ans	555	355	200	81	40	274	160
	70-74 ans	419	278	141	31	19	247	122
	50-74 ans	2 181	1 428	753	454	211	974	542
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	265	172	93	119	67	53	26
	55-59 ans	314	209	105	71	30	138	75
	60-64 ans	364	238	126	70	24	168	102
	65-69 ans	425	272	153	54	31	218	122
	70-74 ans	320	212	108	22	15	190	93
	50-74 ans	1 688	1 103	585	336	167	767	418
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	292	196	96	138	67	58	29
	55-59 ans	351	232	119	82	32	150	87
	60-64 ans	424	280	144	83	28	197	116
	65-69 ans	481	312	169	64	33	248	136
	70-74 ans	373	252	121	28	15	224	106
	50-74 ans	1 921	1 272	649	395	175	877	474
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	63	35	28	30	24	5	4
	55-59 ans	53	27	26	7	13	20	13
	60-64 ans	78	49	29	17	9	32	20
	65-69 ans	141	95	46	21	9	74	37
	70-74 ans	131	86	45	14	4	72	41
	50-74 ans	466	292	174	89	59	203	115
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	57	31	26	27	23	4	3
	55-59 ans	48	24	24	6	11	18	13
	60-64 ans	75	47	28	17	8	30	20
	65-69 ans	129	86	43	21	8	65	35
	70-74 ans	124	82	42	14	4	68	38

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 33 - Gironde

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	433	270	163	85	54	185	109
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	16	10	6	4	3	6	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	54	30	24	26	21	4	3
	55-59 ans	45	21	24	5	11	16	13
	60-64 ans	69	43	26	16	7	27	19
	65-69 ans	127	85	42	21	8	64	34
	70-74 ans	122	81	41	13	4	68	37
	50-74 ans	417	260	157	81	51	179	106
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	32	17	15	14	12	3	3
	55-59 ans	27	11	16	1	8	10	8
	60-64 ans	50	32	18	14	6	18	12
	65-69 ans	93	60	33	13	6	47	27
	70-74 ans	87	52	35	10	4	42	31
	50-74 ans	289	172	117	52	36	120	81
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	23	14	9	13	9	1	0
	55-59 ans	18	10	8	4	3	6	5
	60-64 ans	19	11	8	2	1	9	7
	65-69 ans	34	25	9	8	2	17	7
	70-74 ans	35	29	6	3	0	26	6
	50-74 ans	129	89	40	30	15	59	25
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	14	9	5	7	3	2	2
	55-59 ans	13	4	9	0	5	4	4
	60-64 ans	31	21	10	10	2	11	8
	65-69 ans	41	29	12	4	3	25	9
	70-74 ans	45	29	16	6	1	23	15
	50-74 ans	144	92	52	27	14	65	38
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	10	5	5	4	4	1	1
	55-59 ans	3	1	2	0	2	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	11	7	4	2	3	5	1
	65-69 ans	21	11	10	5	2	6	8
	70-74 ans	21	16	5	3	0	13	5
	50-74 ans	66	40	26	14	11	26	15
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	10	6	4	1	1	5	3
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	22	14	8	3	0	11	8
	70-74 ans	17	4	13	0	3	4	10
	50-74 ans	60	27	33	6	10	21	23
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	9	6	3	1	1	5	2
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	19	13	6	5	1	8	5
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	55	30	25	26	22	4	3
	55-59 ans	45	21	24	5	11	16	13
	60-64 ans	72	46	26	16	7	30	19
	65-69 ans	127	85	42	21	8	64	34
	70-74 ans	123	81	42	13	4	68	38
	50-74 ans	422	263	159	81	52	182	107
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	13	4	13	3	0	1
	55-59 ans	20	14	6	7	3	7	3
	60-64 ans	13	6	7	4	3	2	4
	65-69 ans	17	10	7	4	1	6	6
	70-74 ans	14	6	8	2	4	4	4
	50-74 ans	81	49	32	30	14	19	18

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,8	7,0	6,7	7,7	7,3	5,5	5,3
	55-59 ans	7,2	7,5	6,8	9,9	7,8	6,7	6,5
	60-64 ans	6,5	6,4	6,5	7,0	6,6	6,2	6,5
	65-69 ans	6,0	5,7	6,2	7,4	7,2	5,4	6,0
	70-74 ans	7,3	6,8	7,7	7,5	9,1	6,7	7,6
	50-74 ans	6,7	6,7	6,7	7,9	7,4	6,1	6,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	0,9	0,9
	55-59 ans	1,4	1,6	1,3	3,1	2,3	1,0	1,0
	60-64 ans	1,1	1,0	1,2	1,9	2,2	0,7	1,0
	65-69 ans	1,0	0,8	1,1	1,9	2,2	0,6	0,9
	70-74 ans	1,7	1,7	1,7	3,5	3,4	1,5	1,5
	50-74 ans	1,3	1,3	1,4	2,1	2,1	0,9	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,3	77,9	76,7	76,0	74,8	84,2	82,5
	55-59 ans	80,0	79,2	80,8	68,9	70,8	84,6	84,7
	60-64 ans	82,9	84,9	81,3	73,5	66,3	88,8	85,2
	65-69 ans	83,9	85,6	82,6	74,0	70,1	88,9	85,4
	70-74 ans	76,4	74,4	77,9	53,0	63,0	77,8	80,1
	50-74 ans	80,1	80,4	79,8	72,8	71,7	85,1	83,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,3	3,0	4,5	3,0	3,9	3,1
	55-59 ans	4,3	5,4	3,3	6,7	3,7	5,0	3,1
	60-64 ans	4,8	6,4	3,5	8,2	4,2	5,8	3,3
	65-69 ans	5,2	6,7	4,0	8,5	4,7	6,3	3,9
	70-74 ans	6,1	8,0	4,5	8,9	6,0	7,8	4,3
	50-74 ans	4,7	6,0	3,6	6,1	3,7	5,9	3,6
50-74 ans **	4,7	5,9	3,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98,9	98,1	99,3	99,1	97,6	96,0
	55-59 ans	98,4	98,4	98,4	99,0	96,7	98,2	99,1
	60-64 ans	97,5	97,5	97,6	95,5	97,6	98,3	97,7
	65-69 ans	97,2	97,5	96,9	98,4	95,7	97,2	97,1
	70-74 ans	97,6	97,7	97,4	96,8	94,2	97,9	98,0
	50-74 ans	97,8	97,9	97,6	98,2	97,5	97,8	97,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,5	91,1	91,9	89,7	90,2	95,0	95,8
	55-59 ans	92,8	92,0	94,1	89,3	94,1	93,2	94,1
	60-64 ans	94,3	94,4	94,2	93,5	94,2	94,8	94,2
	65-69 ans	93,6	93,5	93,9	91,4	88,3	94,1	95,1
	70-74 ans	93,2	94,8	90,8	90,2	86,2	95,5	91,6
	50-74 ans	93,1	93,2	93,0	90,6	90,8	94,5	94,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,8	91,8	89,4	91,7	90,1	92,2	87,7
	55-59 ans	91,4	91,9	90,6	89,6	88,4	93,0	91,4
	60-64 ans	90,7	90,4	91,2	88,0	89,4	91,4	91,8
	65-69 ans	90,2	90,7	89,5	89,5	86,7	91,1	90,1
	70-74 ans	88,2	88,0	88,4	85,5	96,4	88,4	87,2
	50-74 ans	90,2	90,5	89,8	89,8	89,7	90,9	89,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	91	93	95	92	82	96
	55-59 ans	93	96	89	104	100	93	85
	60-64 ans	88	88	88	105	105	81	83
	65-69 ans	87	90	83	94	85	89	83
	70-74 ans	85	85	85	83	71	85	87
	50-74 ans	89	90	87	97	93	86	85
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71 (49-103)	74 (49-105)	68 (48-97)	76 (51-110)	67 (48-97)	69 (47-99)	68 (51-104)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	70 (48-104)	72 (48-106)	68 (48-99)	76 (47-117)	80,5 (49,5-110,5)	71 (48-105)	65 (47-97)
	60-64 ans	68 (48-102)	68 (48-102)	68 (47-104,5)	72 (52-113)	67 (49-114)	65,5 (46-97)	68 (46-100)
	65-69 ans	67 (47-97)	68 (47-98,5)	65 (47-95)	68 (48-104)	62,5 (48-90)	69 (47-98)	66 (46-95)
	70-74 ans	68 (48-98)	68 (49-96)	68 (47-103)	77 (51-107)	64,5 (39-92,5)	66 (49-95)	69 (48-103)
	50-74 ans	69 (48-101)	69 (48-102)	67 (47-98)	74 (50-109)	68 (48-99)	68 (47-98)	67 (47-98)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,5	2,1	0,8	2,8	0,9	0,0	0,7
	55-59 ans	1,8	2,2	1,3	3,4	2,4	1,6	0,9
	60-64 ans	1,0	0,8	1,4	1,8	2,4	0,4	1,0
	65-69 ans	1,1	1,2	1,1	2,1	0,9	0,9	1,1
	70-74 ans	1,2	0,9	1,7	2,1	5,8	0,7	1,0
	50-74 ans	1,3	1,4	1,3	2,6	1,8	0,8	1,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	99,3	98,1	99,5	98,6	98,7	97,1
	55-59 ans	99,5	99,8	99,0	99,5	99,1	100,0	99,0
	60-64 ans	99,2	99,4	98,9	100,0	98,2	99,2	99,2
	65-69 ans	98,8	99,2	98,3	99,4	99,0	99,2	98,1
	70-74 ans	98,2	98,5	97,8	100,0	100,0	98,2	97,5
	50-74 ans	98,9	99,2	98,4	99,6	98,8	99,1	98,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,8	41,7	55,8	41,0	54,8	43,8	58,0
	55-59 ans	43,6	38,6	50,6	37,7	46,4	39,0	52,1
	60-64 ans	40,1	34,5	48,3	31,8	49,6	35,6	47,9
	65-69 ans	34,5	26,9	44,9	26,9	39,8	26,9	46,0
	70-74 ans	32,9	27,0	42,2	26,2	51,8	27,1	40,7
	50-74 ans	39,3	33,1	48,2	35,2	50,1	32,2	47,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,7	1,4
	55-59 ans	0,6	0,9	0,2	0,5	0,0	1,0	0,3
	60-64 ans	0,2	0,3	0,0	0,5	0,0	0,2	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	1,0	0,0	0,4
	70-74 ans	0,3	0,3	0,2	1,2	0,0	0,2	0,3
	50-74 ans	0,3	0,4	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,6	10,3	8,8	10,2	8,5	10,5	9,4
	55-59 ans	10,2	11,1	8,9	8,7	8,0	12,3	9,2
	60-64 ans	10,7	11,2	10,0	11,4	8,0	11,0	10,6
	65-69 ans	13,1	14,9	10,7	11,1	8,2	15,9	11,2
	70-74 ans	13,2	15,2	10,1	17,9	5,4	14,8	10,9
	50-74 ans	11,5	12,7	9,8	11,0	8,0	13,5	10,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	34,4	40,0	27,1	39,5	27,9	41,2	25,4
	55-59 ans	39,1	43,6	32,8	46,4	31,3	42,3	33,3
	60-64 ans	40,9	45,8	33,8	47,3	31,0	45,2	34,7
	65-69 ans	40,4	44,8	34,4	47,4	40,8	44,1	33,1
	70-74 ans	39,2	42,6	34,0	36,9	33,9	43,4	34,0
	50-74 ans	39,0	43,5	32,6	43,3	31,4	43,6	33,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,3	6,2	6,5	7,3	8,2	3,3	2,9
	55-59 ans	5,3	4,6	6,3	3,8	11,6	5,0	4,3
	60-64 ans	6,7	7,1	6,2	8,5	8,0	6,5	5,6
	65-69 ans	10,3	12,0	7,9	12,3	9,2	11,9	7,7
	70-74 ans	12,2	13,0	10,8	16,7	7,1	12,5	11,4
	50-74 ans	8,3	8,9	7,5	8,5	8,8	9,1	7,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,7	0,7	1,0	0,7	0,0	0,7
	55-59 ans	0,9	1,0	0,7	2,2	1,8	0,5	0,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,9	0,7	1,1	0,0	1,8	1,0	0,8
	65-69 ans	1,0	1,0	1,0	1,8	1,0	0,8	1,0
	70-74 ans	1,6	1,2	2,2	0,0	1,8	1,4	2,2
	50-74 ans	1,0	0,9	1,1	1,0	1,2	0,9	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,5	0,0	0,7	2,2
	55-59 ans	0,3	0,2	0,5	0,5	0,9	0,0	0,3
	60-64 ans	0,5	0,4	0,6	0,5	1,8	0,4	0,3
	65-69 ans	0,4	0,4	0,3	0,6	0,0	0,3	0,4
	70-74 ans	0,7	0,8	0,5	1,2	0,0	0,7	0,6
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,5	19,6	9,8	20,1	9,9	18,6	9,8
	55-59 ans	19,2	26,8	12,6	32,7	13,1	24,7	12,5
	60-64 ans	22,8	33,6	14,2	43,5	14,9	30,6	14,0
	65-69 ans	25,6	36,5	16,6	44,9	19,3	34,8	16,1
	70-74 ans	29,1	42,8	17,5	43,1	19,3	42,7	17,3
	50-74 ans	21,7	30,9	13,9	29,6	12,7	31,5	14,4
	50-74 ans **	21,5	30,0	13,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,3	15,6	7,4	16,0	7,6	14,8	7,1
	55-59 ans	15,2	21,3	9,9	27,5	10,4	19,2	9,8
	60-64 ans	18,1	26,9	10,9	34,7	11,9	24,6	10,7
	65-69 ans	19,3	27,4	12,7	36,4	16,1	25,6	12,0
	70-74 ans	21,8	31,5	13,5	29,1	16,6	31,9	13,1
	50-74 ans	16,8	23,9	10,7	23,5	10,1	24,0	11,0
	50-74 ans **	16,7	23,4	10,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	11,9	5,9	11,7	6,2	12,5	5,3
	55-59 ans	12,3	17,6	7,7	23,0	8,9	15,7	7,3
	60-64 ans	13,8	20,3	8,7	25,6	8,1	18,7	8,8
	65-69 ans	14,8	21,0	9,7	24,2	12,5	20,3	9,2
	70-74 ans	16,6	24,0	10,3	20,6	13,1	24,5	10,0
	50-74 ans	13,0	18,4	8,3	17,4	8,0	18,9	8,5
	50-74 ans **	12,9	18,1	8,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,7	13,6	6,1	13,6	6,2	13,6	5,9
	55-59 ans	13,7	19,5	8,7	26,5	9,5	17,0	8,4
	60-64 ans	16,1	23,9	9,9	30,3	9,5	21,9	10,0
	65-69 ans	16,7	24,1	10,7	28,7	13,3	23,1	10,2
	70-74 ans	19,4	28,6	11,6	26,2	13,1	28,9	11,4
	50-74 ans	14,8	21,3	9,2	20,5	8,4	21,6	9,6
	50-74 ans **	14,7	20,8	9,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,4	1,8	3,0	2,2	1,2	0,8
	55-59 ans	2,1	2,3	1,9	2,3	3,9	2,3	1,3
	60-64 ans	3,0	4,2	2,0	6,2	3,1	3,6	1,7
	65-69 ans	4,9	7,3	2,9	9,4	3,6	6,9	2,8
	70-74 ans	6,8	9,8	4,3	13,1	3,5	9,3	4,4
	50-74 ans	3,6	4,9	2,5	4,6	2,8	5,0	2,3
	50-74 ans **	3,4	4,5	2,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	5,3	3,2	7,7	3,7	8,7	0,0	0,0
	55-59 ans	6,3	12,5	0,0	16,7	0,0	11,1	0,0
	60-64 ans	8,0	8,5	7,1	5,9	12,5	10,0	5,0
	65-69 ans	1,6	1,2	2,3	0,0	0,0	1,5	2,9
	70-74 ans	1,6	1,2	2,4	7,1	0,0	0,0	2,6
	50-74 ans	3,7	3,7	3,7	4,7	5,6	3,2	2,8

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)