

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 38 - Isère

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	31 172	15 035	16 137	10 145	10 517	4 890	5 620
	55-59 ans	26 155	12 332	13 823	2 046	2 118	10 286	11 705
	60-64 ans	25 078	11 500	13 578	1 396	1 333	10 104	12 245
	65-69 ans	24 249	11 036	13 213	1 013	859	10 023	12 354
	70-74 ans	17 629	8 075	9 554	612	484	7 463	9 070
	50-74 ans	124 283	57 978	66 305	15 212	15 311	42 766	50 994
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 220	1 027	1 193	743	857	284	336
	55-59 ans	1 997	913	1 084	216	199	697	885
	60-64 ans	1 890	839	1 051	126	124	713	927
	65-69 ans	1 827	747	1 080	76	80	671	1 000
	70-74 ans	1 510	656	854	73	50	583	804
	50-74 ans	9 444	4 182	5 262	1 234	1 310	2 948	3 952
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 864	871	993	610	686	261	307
	55-59 ans	1 697	783	914	163	143	620	771
	60-64 ans	1 664	743	921	101	97	642	824
	65-69 ans	1 614	656	958	60	56	596	902
	70-74 ans	1 218	503	715	49	39	454	676
	50-74 ans	8 057	3 556	4 501	983	1 021	2 573	3 480
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	356	156	200	133	171	23	29
	55-59 ans	300	130	170	53	56	77	114
	60-64 ans	226	96	130	25	27	71	103
	65-69 ans	213	91	122	16	24	75	98
	70-74 ans	292	153	139	24	11	129	128
	50-74 ans	1 387	626	761	251	289	375	472
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	30 816	14 879	15 937	10 012	10 346	4 867	5 591
	55-59 ans	25 855	12 202	13 653	1 993	2 062	10 209	11 591
	60-64 ans	24 852	11 404	13 448	1 371	1 306	10 033	12 142
	65-69 ans	24 036	10 945	13 091	997	835	9 948	12 256
	70-74 ans	17 337	7 922	9 415	588	473	7 334	8 942
	50-74 ans	122 896	57 352	65 544	14 961	15 022	42 391	50 522
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 001	557	444	403	308	154	136
	55-59 ans	937	531	406	100	70	431	336
	60-64 ans	1 009	602	407	96	45	506	362
	65-69 ans	1 165	682	483	81	39	601	444

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 38 - Isère

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	981	568	413	57	24	511	389
	50-74 ans	5 093	2 940	2 153	737	486	2 203	1 667
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	985	549	436	396	302	153	134
	55-59 ans	927	525	402	97	70	428	332
	60-64 ans	994	592	402	95	44	497	358
	65-69 ans	1 142	667	475	80	38	587	437
	70-74 ans	937	547	390	53	23	494	367
	50-74 ans	4 985	2 880	2 105	721	477	2 159	1 628
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	923	510	413	364	279	146	134
	55-59 ans	868	502	366	87	60	415	306
	60-64 ans	930	560	370	92	36	468	334
	65-69 ans	1 085	630	455	73	35	557	420
	70-74 ans	881	516	365	46	19	470	346
	50-74 ans	4 687	2 718	1 969	662	429	2 056	1 540
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	889	491	398	346	270	145	128
	55-59 ans	837	485	352	87	55	398	297
	60-64 ans	893	535	358	88	32	447	326
	65-69 ans	1 036	603	433	70	31	533	402
	70-74 ans	827	489	338	40	18	449	320
	50-74 ans	4 482	2 603	1 879	631	406	1 972	1 473
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	5	3	2	3	0	0	2
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
	70-74 ans	11	10	1	0	0	10	1
	50-74 ans	30	23	7	5	0	18	7
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	12	11	1	3	0	8	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 38 - Isère

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	914	508	406	362	276	146	130
	55-59 ans	864	501	363	87	60	414	303
	60-64 ans	925	558	367	92	36	466	331
	65-69 ans	1 073	625	448	73	34	552	414
	70-74 ans	869	513	356	45	19	468	337
	50-74 ans	4 645	2 705	1 940	659	425	2 046	1 515
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	9	2	7	2	3	0	4
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	12	5	7	0	1	5	6
	70-74 ans	12	3	9	1	0	2	9
	50-74 ans	42	13	29	3	4	10	25
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	5	3	2	2	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	12	6	6	0	1	6	5
	50-74 ans	30	16	14	6	3	10	11
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	911	504	407	358	275	146	132
	55-59 ans	860	496	364	87	60	409	304
	60-64 ans	923	555	368	91	36	464	332
	65-69 ans	1 071	622	449	73	34	549	415
	70-74 ans	870	512	358	45	19	467	339
	50-74 ans	4 635	2 689	1 946	654	424	2 035	1 522
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	928	513	415	367	280	146	135
	55-59 ans	873	505	368	89	60	416	308
	60-64 ans	932	561	371	92	36	469	335
	65-69 ans	1 091	633	458	74	36	559	422
	70-74 ans	893	522	371	46	20	476	351
	50-74 ans	4 717	2 734	1 983	668	432	2 066	1 551
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	374	167	207	106	142	61	65
	55-59 ans	312	160	152	24	25	136	127

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 38 - Isère

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	247	117	130	18	9	99	121
	65-69 ans	298	133	165	13	11	120	154
	70-74 ans	228	109	119	7	5	102	114
	50-74 ans	1 459	686	773	168	192	518	581
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	75	43	32	32	24	11	8
	55-59 ans	45	29	16	4	2	25	14
	60-64 ans	41	21	20	1	2	20	18
	65-69 ans	41	26	15	5	1	21	14
	70-74 ans	33	17	16	3	0	14	16
	50-74 ans	235	136	99	45	29	91	70
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	9	7	2	3	1	4	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	127	78	49	63	31	15	18
	55-59 ans	155	89	66	17	11	72	55
	60-64 ans	178	109	69	10	4	99	65
	65-69 ans	198	115	83	15	6	100	77
	70-74 ans	158	105	53	15	2	90	51
	50-74 ans	816	496	320	120	54	376	266
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	269	178	91	134	60	44	31
	55-59 ans	275	175	100	36	14	139	86
	60-64 ans	357	245	112	46	15	199	97
	65-69 ans	390	253	137	24	13	229	124
	70-74 ans	336	208	128	12	8	196	120
	50-74 ans	1 627	1 059	568	252	110	807	458
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	64	37	27	22	16	15	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 38 - Isère

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	69	43	26	7	7	36	19
	60-64 ans	96	59	37	16	5	43	32
	65-69 ans	138	91	47	15	4	76	43
	70-74 ans	117	73	44	7	5	66	39
	50-74 ans	484	303	181	67	37	236	144
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	10	7	3	2	0	5	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	24	17	7	5	2	12	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	13	6	7	6	5	0	2
	55-59 ans	13	6	7	0	1	6	6
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	15	7	8	0	1	7	7
	70-74 ans	14	5	9	1	0	4	9
	50-74 ans	60	28	32	8	7	20	25
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	396	256	140	197	91	59	49
	55-59 ans	432	264	168	53	25	211	143
	60-64 ans	535	354	181	56	19	298	162
	65-69 ans	589	369	220	40	19	329	201
	70-74 ans	494	313	181	27	10	286	171
	50-74 ans	2 446	1 556	890	373	164	1 183	726

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 38 - Isère

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	269	178	91	134	60	44	31
	55-59 ans	275	175	100	36	14	139	86
	60-64 ans	357	245	112	46	15	199	97
	65-69 ans	390	253	137	24	13	229	124
	70-74 ans	336	208	128	12	8	196	120
	50-74 ans	1 627	1 059	568	252	110	807	458
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	219	146	73	108	48	38	25
	55-59 ans	209	131	78	26	12	105	66
	60-64 ans	264	183	81	39	11	144	70
	65-69 ans	303	189	114	21	13	168	101
	70-74 ans	250	156	94	7	8	149	86
	50-74 ans	1 245	805	440	201	92	604	348
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	249	164	85	124	57	40	28
	55-59 ans	250	163	87	34	13	129	74
	60-64 ans	325	226	99	45	13	181	86
	65-69 ans	376	243	133	27	14	216	119
	70-74 ans	327	208	119	14	9	194	110
	50-74 ans	1 527	1 004	523	244	106	760	417
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	64	37	27	22	16	15	11
	55-59 ans	69	43	26	7	7	36	19
	60-64 ans	96	59	37	16	5	43	32
	65-69 ans	138	91	47	15	4	76	43
	70-74 ans	117	73	44	7	5	66	39
	50-74 ans	484	303	181	67	37	236	144
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	56	33	23	18	14	15	9
	55-59 ans	64	41	23	6	5	35	18
	60-64 ans	85	52	33	12	4	40	29
	65-69 ans	132	87	45	15	3	72	42
	70-74 ans	112	69	43	7	5	62	38

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 38 - Isère

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	449	282	167	58	31	224	136
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
	50-74 ans	15	6	9	1	3	5	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	54	32	22	18	13	14	9
	55-59 ans	60	40	20	6	5	34	15
	60-64 ans	82	51	31	12	3	39	28
	65-69 ans	129	85	44	15	3	70	41
	70-74 ans	104	65	39	6	4	59	35
	50-74 ans	429	273	156	57	28	216	128
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	27	20	7	11	5	9	2
	55-59 ans	39	27	12	4	3	23	9
	60-64 ans	54	33	21	7	3	26	18
	65-69 ans	77	49	28	9	2	40	26
	70-74 ans	68	37	31	4	3	33	28
	50-74 ans	265	166	99	35	16	131	83
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	27	12	15	7	8	5	7
	55-59 ans	21	13	8	2	2	11	6
	60-64 ans	28	18	10	5	0	13	10
	65-69 ans	52	36	16	6	1	30	15
	70-74 ans	36	28	8	2	1	26	7
	50-74 ans	164	107	57	22	12	85	45
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	14	12	2	7	1	5	1
	55-59 ans	24	17	7	3	2	14	5
	60-64 ans	26	16	10	5	1	11	9
	65-69 ans	34	18	16	4	1	14	15
	70-74 ans	27	16	11	0	2	16	9
	50-74 ans	125	79	46	19	7	60	39
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 38 - Isère

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14	9	5	1	2	8	3
	65-69 ans	16	13	3	1	1	12	2
	70-74 ans	16	7	9	0	0	7	9
	50-74 ans	58	36	22	4	5	32	17
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	7	5	2	3	2	2	0
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	11	6	5	0	0	6	5
	65-69 ans	19	13	6	3	0	10	6
	70-74 ans	18	9	9	2	1	7	8
	50-74 ans	61	37	24	8	3	29	21
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	50-74 ans	21	14	7	4	1	10	6
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	53	32	21	18	12	14	9
	55-59 ans	58	38	20	6	5	32	15
	60-64 ans	81	50	31	12	3	38	28
	65-69 ans	128	84	44	15	3	69	41
	70-74 ans	104	65	39	6	4	59	35
	50-74 ans	424	269	155	57	27	212	128
A40- Perdus de vue	50-54 ans	15	11	4	9	4	2	0
	55-59 ans	15	6	9	3	2	3	7
	60-64 ans	22	12	10	2	4	10	6
	65-69 ans	18	13	5	5	0	8	5
	70-74 ans	13	6	7	1	1	5	6
	50-74 ans	83	48	35	20	11	28	24

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 38 - Isère

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	6,8	7,4	7,3	8,1	5,8	6,0
	55-59 ans	7,6	7,4	7,8	10,6	9,4	6,8	7,6
	60-64 ans	7,5	7,3	7,7	9,0	9,3	7,1	7,6
	65-69 ans	7,5	6,8	8,2	7,5	9,3	6,7	8,1
	70-74 ans	8,6	8,1	8,9	11,9	10,3	7,8	8,9
	50-74 ans	7,6	7,2	7,9	8,1	8,6	6,9	7,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,0	1,2	1,3	1,6	0,5	0,5
	55-59 ans	1,1	1,1	1,2	2,6	2,6	0,7	1,0
	60-64 ans	0,9	0,8	1,0	1,8	2,0	0,7	0,8
	65-69 ans	0,9	0,8	0,9	1,6	2,8	0,7	0,8
	70-74 ans	1,7	1,9	1,5	3,9	2,3	1,7	1,4
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	1,7	1,9	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	84,0	84,8	83,2	82,1	80,0	91,9	91,4
	55-59 ans	85,0	85,8	84,3	75,5	71,9	89,0	87,1
	60-64 ans	88,0	88,6	87,6	80,2	78,2	90,0	88,9
	65-69 ans	88,3	87,8	88,7	78,9	70,0	88,8	90,2
	70-74 ans	80,7	76,7	83,7	67,1	78,0	77,9	84,1
	50-74 ans	85,3	85,0	85,5	79,7	77,9	87,3	88,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,7	2,8	4,0	3,0	3,2	2,4
	55-59 ans	3,6	4,4	3,0	5,0	3,4	4,2	2,9
	60-64 ans	4,1	5,3	3,0	7,0	3,4	5,0	3,0
	65-69 ans	4,8	6,2	3,7	8,1	4,7	6,0	3,6
	70-74 ans	5,7	7,2	4,4	9,7	5,1	7,0	4,4
	50-74 ans	4,1	5,1	3,3	4,9	3,2	5,2	3,3
50-74 ans **	4,1	5,1	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,4	98,6	98,2	98,3	98,1	99,4	98,5
	55-59 ans	98,9	98,9	99,0	97,0	100,0	99,3	98,8
	60-64 ans	98,5	98,3	98,8	99,0	97,8	98,2	98,9
	65-69 ans	98,0	97,8	98,3	98,8	97,4	97,7	98,4
	70-74 ans	95,5	96,3	94,4	93,0	95,8	96,7	94,3
	50-74 ans	97,9	98,0	97,8	97,8	98,1	98,0	97,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 38 - Isère

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,7	92,9	94,7	91,9	92,4	95,4	100,0
	55-59 ans	93,6	95,6	91,0	89,7	85,7	97,0	92,2
	60-64 ans	93,6	94,6	92,0	96,8	81,8	94,2	93,3
	65-69 ans	95,0	94,5	95,8	91,3	92,1	94,9	96,1
	70-74 ans	94,0	94,3	93,6	86,8	82,6	95,1	94,3
	50-74 ans	94,0	94,4	93,5	91,8	89,9	95,2	94,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,3	96,3	96,4	95,1	96,8	99,3	95,5
	55-59 ans	96,4	96,6	96,2	100,0	91,7	95,9	97,1
	60-64 ans	96,0	95,5	96,8	95,7	88,9	95,5	97,6
	65-69 ans	95,5	95,7	95,2	95,9	88,6	95,7	95,7
	70-74 ans	93,9	94,8	92,6	87,0	94,7	95,5	92,5
	50-74 ans	95,6	95,8	95,4	95,3	94,6	95,9	95,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	4	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	109	105	115	110	120	93	104
	55-59 ans	105	113	94	124	110	111	91
	60-64 ans	97	98	96	100	89	97	96
	65-69 ans	100	101	99	115	89	99	100
	70-74 ans	104	104	104	127	105	101	104
	50-74 ans	103	104	102	112	113	101	99
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76 (53-117)	75 (53-111)	77 (52-125)	77 (54-115)	84 (57-133)	70,5 (53-103)	67 (44-105)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 38 - Isère

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	74 (51-104,5)	75 (53-111)	71 (49-98)	76 (52-123)	74,5 (49-94,5)	75 (53-110)	70,5 (49-98)
	60-64 ans	72 (49-105)	74 (51-105)	68 (46-105)	77 (49-101)	74,5 (50,5-117,5)	74 (52-106)	68 (46-105)
	65-69 ans	74 (49-109)	73,5 (48-107)	75 (50-110)	80 (55-131)	72 (55-111)	71 (48-104)	75 (50-110)
	70-74 ans	74 (50-112)	75 (52-112)	70 (48-114)	78 (59-136)	81 (56-99)	75 (51-111)	69 (47-115)
	50-74 ans	74 (50-109)	75 (52-109)	73 (49-109)	77 (53-117)	78 (55-123)	74 (51-107)	70 (48-106)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,5	2,0	0,9	2,2	1,3	1,3	0,0
	55-59 ans	1,6	1,1	2,2	3,0	2,9	0,7	2,1
	60-64 ans	2,2	2,0	2,5	2,1	8,9	2,0	1,7
	65-69 ans	1,5	1,9	1,0	6,2	0,0	1,3	1,1
	70-74 ans	1,3	1,1	1,7	1,8	4,2	1,0	1,5
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	2,7	2,3	1,3	1,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,8	98,5	98,4	98,6	100,0	98,5
	55-59 ans	99,1	98,8	99,5	100,0	100,0	98,6	99,3
	60-64 ans	99,2	99,1	99,5	98,9	100,0	99,1	99,4
	65-69 ans	98,7	98,7	98,7	100,0	97,1	98,6	98,8
	70-74 ans	98,8	99,2	98,1	97,8	100,0	99,4	98,0
	50-74 ans	98,9	98,9	98,8	98,8	98,8	99,0	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,3	32,6	49,9	28,9	50,7	41,8	48,1
	55-59 ans	35,7	31,7	41,3	27,0	41,7	32,7	41,2
	60-64 ans	26,5	20,9	35,0	19,6	25,0	21,1	36,1
	65-69 ans	27,3	21,0	36,0	17,6	30,6	21,5	36,5
	70-74 ans	25,5	20,9	32,1	15,2	25,0	21,4	32,5
	50-74 ans	30,9	25,1	39,0	25,1	44,4	25,1	37,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,1	8,4	7,7	8,7	8,6	7,5	5,9
	55-59 ans	5,2	5,7	4,3	4,5	3,3	6,0	4,5
	60-64 ans	4,4	3,7	5,4	1,1	5,6	4,3	5,4
	65-69 ans	3,8	4,1	3,3	6,8	2,8	3,8	3,3
	70-74 ans	3,7	3,3	4,3	6,5	0,0	2,9	4,6
	50-74 ans	5,0	5,0	5,0	6,7	6,7	4,4	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,0	0,0
	55-59 ans	0,2	0,2	0,3	1,1	0,0	0,0	0,3
	60-64 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 38 - Isère

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	2,2	0,0	0,2	0,0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,7	15,2	11,8	17,2	11,1	10,3	13,3
	55-59 ans	17,8	17,6	17,9	19,1	18,3	17,3	17,9
	60-64 ans	19,1	19,4	18,6	10,9	11,1	21,1	19,4
	65-69 ans	18,1	18,2	18,1	20,3	16,7	17,9	18,2
	70-74 ans	17,7	20,1	14,3	32,6	10,0	18,9	14,5
	50-74 ans	17,3	18,1	16,1	18,0	12,5	18,2	17,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,0	34,7	21,9	36,5	21,4	30,1	23,0
	55-59 ans	31,5	34,7	27,2	40,4	23,3	33,4	27,9
	60-64 ans	38,3	43,7	30,2	50,0	41,7	42,4	29,0
	65-69 ans	35,7	40,0	29,9	32,4	36,1	41,0	29,4
	70-74 ans	37,6	39,8	34,5	26,1	40,0	41,2	34,2
	50-74 ans	34,5	38,7	28,6	37,7	25,5	39,1	29,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,9	7,2	6,5	6,0	5,7	10,3	8,1
	55-59 ans	7,9	8,5	7,1	7,9	11,7	8,7	6,2
	60-64 ans	10,3	10,5	10,0	17,4	13,9	9,2	9,6
	65-69 ans	12,6	14,4	10,3	20,3	11,1	13,6	10,2
	70-74 ans	13,1	14,0	11,9	15,2	25,0	13,9	11,1
	50-74 ans	10,3	11,1	9,1	10,0	8,6	11,4	9,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,6	0,2	0,8	0,4	0,0	0,0
	55-59 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 38 - Isère

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	0,0	2,8	0,6	0,3
	65-69 ans	0,9	1,1	0,7	2,7	0,0	0,9	0,7
	70-74 ans	0,4	0,6	0,3	0,0	0,0	0,6	0,3
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	0,7	0,5	0,6	0,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	1,2	1,7	1,6	1,8	0,0	1,5
	55-59 ans	1,5	1,2	1,9	0,0	1,7	1,4	1,9
	60-64 ans	0,5	0,7	0,3	1,1	0,0	0,6	0,3
	65-69 ans	1,4	1,1	1,7	0,0	2,8	1,3	1,7
	70-74 ans	1,6	1,0	2,4	2,2	0,0	0,8	2,6
	50-74 ans	1,3	1,0	1,6	1,2	1,6	1,0	1,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,9	17,2	8,8	19,7	8,8	12,1	8,8
	55-59 ans	16,7	21,6	12,3	26,6	12,1	20,7	12,3
	60-64 ans	21,5	31,0	13,5	40,8	14,5	29,7	13,3
	65-69 ans	24,5	33,7	16,8	40,1	22,8	33,1	16,4
	70-74 ans	28,5	39,5	19,2	45,9	21,1	39,0	19,1
	50-74 ans	19,9	27,1	13,6	24,9	10,9	27,9	14,4
	50-74 ans **	19,8	26,7	13,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	12,0	5,7	13,4	5,8	9,0	5,5
	55-59 ans	10,6	14,3	7,3	18,1	6,8	13,6	7,4
	60-64 ans	14,4	21,5	8,3	33,6	11,5	19,8	8,0
	65-69 ans	16,2	23,1	10,5	24,1	15,6	23,0	10,1
	70-74 ans	19,4	26,3	13,6	20,4	16,9	26,7	13,4
	50-74 ans	13,2	18,5	8,7	16,8	7,3	19,0	9,1
	50-74 ans **	13,2	18,2	8,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	9,8	4,6	10,8	4,6	7,8	4,5
	55-59 ans	8,1	10,7	5,7	13,0	5,8	10,3	5,7
	60-64 ans	10,6	16,0	6,0	28,4	8,4	14,4	5,8
	65-69 ans	12,6	17,3	8,7	21,1	15,6	16,9	8,2
	70-74 ans	14,4	19,7	10,0	11,9	16,9	20,3	9,6
	50-74 ans	10,1	14,0	6,7	13,4	6,1	14,2	6,9
	50-74 ans **	10,1	13,8	6,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 38 - Isère

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	11,0	5,3	12,4	5,5	8,2	5,0
	55-59 ans	9,7	13,4	6,4	17,1	6,3	12,6	6,4
	60-64 ans	13,1	19,8	7,4	32,8	10,0	18,0	7,1
	65-69 ans	15,6	22,2	10,2	27,1	16,8	21,7	9,7
	70-74 ans	18,9	26,3	12,6	23,8	19,0	26,5	12,3
	50-74 ans	12,4	17,5	8,0	16,3	7,1	17,9	8,3
	50-74 ans **	12,3	17,2	7,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,5	1,7	2,2	1,5	3,1	2,0
	55-59 ans	2,7	3,5	1,9	3,5	3,4	3,5	1,6
	60-64 ans	3,9	5,2	2,8	11,7	3,8	4,3	2,6
	65-69 ans	5,7	8,3	3,6	15,0	4,8	7,6	3,5
	70-74 ans	6,7	9,2	4,7	11,9	10,6	9,0	4,4
	50-74 ans	3,9	5,3	2,8	4,5	2,5	5,6	2,9
	50-74 ans **	3,9	5,1	2,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	1,8	0,0	4,3	0,0	7,1	0,0	0,0
	55-59 ans	1,6	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	5,6
	60-64 ans	3,5	1,9	6,1	0,0	25,0	2,5	3,4
	65-69 ans	1,5	1,1	2,2	0,0	0,0	1,4	2,4
	70-74 ans	7,1	5,8	9,3	14,3	20,0	4,8	7,9
	50-74 ans	3,3	2,1	5,4	1,7	9,7	2,2	4,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)