

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 57 - Moselle

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	22 793	11 060	11 733	7 451	7 650	3 609	4 083
	55-59 ans	19 614	9 099	10 515	1 961	2 006	7 138	8 509
	60-64 ans	20 247	9 251	10 996	1 238	1 285	8 013	9 711
	65-69 ans	19 069	8 719	10 350	953	869	7 766	9 481
	70-74 ans	13 040	5 870	7 170	401	440	5 469	6 730
	<b>50-74 ans</b>	<b>94 763</b>	<b>43 999</b>	<b>50 764</b>	<b>12 004</b>	<b>12 250</b>	<b>31 995</b>	<b>38 514</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 734	894	840	646	598	248	242
	55-59 ans	1 519	704	815	199	192	505	623
	60-64 ans	1 395	638	757	115	115	523	642
	65-69 ans	1 284	563	721	95	66	468	655
	70-74 ans	1 076	480	596	39	44	441	552
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 008</b>	<b>3 279</b>	<b>3 729</b>	<b>1 094</b>	<b>1 015</b>	<b>2 185</b>	<b>2 714</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 338	684	654	477	463	207	191
	55-59 ans	1 210	577	633	143	137	434	496
	60-64 ans	1 120	518	602	85	74	433	528
	65-69 ans	1 016	444	572	57	41	387	531
	70-74 ans	807	360	447	24	27	336	420
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 491</b>	<b>2 583</b>	<b>2 908</b>	<b>786</b>	<b>742</b>	<b>1 797</b>	<b>2 166</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	396	210	186	169	135	41	51
	55-59 ans	309	127	182	56	55	71	127
	60-64 ans	275	120	155	30	41	90	114
	65-69 ans	268	119	149	38	25	81	124
	70-74 ans	269	120	149	15	17	105	132
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 517</b>	<b>696</b>	<b>821</b>	<b>308</b>	<b>273</b>	<b>388</b>	<b>548</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	22 397	10 850	11 547	7 282	7 515	3 568	4 032
	55-59 ans	19 305	8 972	10 333	1 905	1 951	7 067	8 382
	60-64 ans	19 972	9 131	10 841	1 208	1 244	7 923	9 597
	65-69 ans	18 801	8 600	10 201	915	844	7 685	9 357
	70-74 ans	12 771	5 750	7 021	386	423	5 364	6 598
	<b>50-74 ans</b>	<b>93 246</b>	<b>43 303</b>	<b>49 943</b>	<b>11 696</b>	<b>11 977</b>	<b>31 607</b>	<b>37 966</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	840	502	338	341	227	161	111
	55-59 ans	803	474	329	121	84	353	245
	60-64 ans	987	551	436	99	61	452	375
	65-69 ans	1 032	559	473	75	47	484	426

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 57 - Moselle

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	902	480	422	44	25	436	397
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 564</b>	<b>2 566</b>	<b>1 998</b>	<b>680</b>	<b>444</b>	<b>1 886</b>	<b>1 554</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	832	496	336	339	225	157	111
	55-59 ans	791	467	324	119	83	348	241
	60-64 ans	972	543	429	98	59	445	370
	65-69 ans	1 009	544	465	73	47	471	418
	70-74 ans	876	464	412	43	24	421	388
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 480</b>	<b>2 514</b>	<b>1 966</b>	<b>672</b>	<b>438</b>	<b>1 842</b>	<b>1 528</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	740	450	290	306	193	144	97
	55-59 ans	710	412	298	98	73	314	225
	60-64 ans	871	482	389	83	52	399	337
	65-69 ans	892	481	411	61	41	420	370
	70-74 ans	773	415	358	40	18	375	340
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 986</b>	<b>2 240</b>	<b>1 746</b>	<b>588</b>	<b>377</b>	<b>1 652</b>	<b>1 369</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	677	412	265	272	177	140	88
	55-59 ans	642	373	269	87	63	286	206
	60-64 ans	799	444	355	76	45	368	310
	65-69 ans	807	436	371	57	37	379	334
	70-74 ans	699	378	321	38	16	340	305
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 624</b>	<b>2 043</b>	<b>1 581</b>	<b>530</b>	<b>338</b>	<b>1 513</b>	<b>1 243</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 57 - Moselle

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	729	444	285	303	191	141	94
	55-59 ans	699	405	294	97	73	308	221
	60-64 ans	856	475	381	82	52	393	329
	65-69 ans	875	470	405	60	41	410	364
	70-74 ans	756	406	350	40	17	366	333
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 915</b>	<b>2 200</b>	<b>1 715</b>	<b>582</b>	<b>374</b>	<b>1 618</b>	<b>1 341</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	11	6	5	3	2	3	3
	55-59 ans	11	7	4	1	0	6	4
	60-64 ans	15	7	8	1	0	6	8
	65-69 ans	17	11	6	1	0	10	6
	70-74 ans	17	9	8	0	1	9	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>28</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	11	7	4	1	1	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>11</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	729	443	286	301	190	142	96
	55-59 ans	701	407	294	98	71	309	223
	60-64 ans	862	478	384	83	51	395	333
	65-69 ans	883	478	405	60	41	418	364
	70-74 ans	760	410	350	40	18	370	332
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 935</b>	<b>2 216</b>	<b>1 719</b>	<b>582</b>	<b>371</b>	<b>1 634</b>	<b>1 348</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	742	451	291	306	194	145	97
	55-59 ans	715	414	301	99	74	315	227
	60-64 ans	878	487	391	84	52	403	339
	65-69 ans	901	486	415	62	41	424	374
	70-74 ans	784	422	362	41	19	381	343
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 020</b>	<b>2 260</b>	<b>1 760</b>	<b>592</b>	<b>380</b>	<b>1 668</b>	<b>1 380</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	307	157	150	108	104	49	46
	55-59 ans	304	137	167	25	41	112	126

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 57 - Moselle

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	301	131	170	17	15	114	155
	65-69 ans	289	130	159	12	13	118	146
	70-74 ans	264	110	154	13	7	97	147
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 465</b>	<b>665</b>	<b>800</b>	<b>175</b>	<b>180</b>	<b>490</b>	<b>620</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	25	16	9	11	5	5	4
	55-59 ans	19	11	8	3	2	8	6
	60-64 ans	16	3	13	0	3	3	10
	65-69 ans	18	11	7	2	1	9	6
	70-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>28</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	95	69	26	41	12	28	14
	55-59 ans	102	63	39	16	7	47	32
	60-64 ans	130	87	43	10	5	77	38
	65-69 ans	149	81	68	15	6	66	62
	70-74 ans	123	69	54	5	3	64	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>599</b>	<b>369</b>	<b>230</b>	<b>87</b>	<b>33</b>	<b>282</b>	<b>197</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	220	143	77	95	54	48	23
	55-59 ans	201	145	56	40	15	105	41
	60-64 ans	281	176	105	37	20	139	85
	65-69 ans	308	184	124	23	14	161	110
	70-74 ans	245	154	91	16	7	138	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 255</b>	<b>802</b>	<b>453</b>	<b>211</b>	<b>110</b>	<b>591</b>	<b>343</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	34	24	10	19	6	5	4

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 57 - Moselle

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	43	31	12	8	4	23	8
	60-64 ans	69	40	29	10	6	30	23
	65-69 ans	58	37	21	7	4	30	17
	70-74 ans	76	43	33	5	1	38	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>280</b>	<b>175</b>	<b>105</b>	<b>49</b>	<b>21</b>	<b>126</b>	<b>84</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	24	16	8	11	7	5	1
	55-59 ans	17	13	4	3	2	10	2
	60-64 ans	34	23	11	6	2	17	9
	65-69 ans	32	20	12	1	2	19	10
	70-74 ans	33	23	10	1	0	22	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>140</b>	<b>95</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>73</b>	<b>32</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	11	9	2	7	1	2	1
	55-59 ans	8	3	5	1	3	2	2
	60-64 ans	17	7	10	1	1	6	9
	65-69 ans	16	8	8	1	0	7	8
	70-74 ans	15	7	8	0	1	7	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	315	212	103	136	66	76	37
	55-59 ans	304	208	96	56	23	152	73
	60-64 ans	413	264	149	47	25	217	124
	65-69 ans	459	266	193	38	20	228	173
	70-74 ans	369	223	146	21	10	202	136
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 860</b>	<b>1 173</b>	<b>687</b>	<b>298</b>	<b>144</b>	<b>875</b>	<b>543</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 57 - Moselle

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	220	143	77	95	54	48	23
	55-59 ans	202	145	57	40	16	105	41
	60-64 ans	282	176	106	37	20	139	86
	65-69 ans	309	184	125	23	14	161	111
	70-74 ans	245	154	91	16	7	138	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 258</b>	<b>802</b>	<b>456</b>	<b>211</b>	<b>111</b>	<b>591</b>	<b>345</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	178	117	61	80	45	37	16
	55-59 ans	158	108	50	34	15	74	35
	60-64 ans	223	144	79	31	18	113	61
	65-69 ans	238	147	91	19	9	128	82
	70-74 ans	184	117	67	14	6	103	61
	<b>50-74 ans</b>	<b>981</b>	<b>633</b>	<b>348</b>	<b>178</b>	<b>93</b>	<b>455</b>	<b>255</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	198	131	67	91	48	40	19
	55-59 ans	184	129	55	37	15	92	40
	60-64 ans	250	165	85	32	18	133	67
	65-69 ans	285	175	110	26	11	149	99
	70-74 ans	224	146	78	18	8	128	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 141</b>	<b>746</b>	<b>395</b>	<b>204</b>	<b>100</b>	<b>542</b>	<b>295</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	35	25	10	20	6	5	4
	55-59 ans	43	31	12	8	4	23	8
	60-64 ans	69	40	29	10	6	30	23
	65-69 ans	58	37	21	7	4	30	17
	70-74 ans	76	43	33	5	1	38	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>281</b>	<b>176</b>	<b>105</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>126</b>	<b>84</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	33	24	9	19	5	5	4
	55-59 ans	40	28	12	7	4	21	8
	60-64 ans	63	35	28	7	6	28	22
	65-69 ans	54	36	18	6	3	30	15
	70-74 ans	72	42	30	5	1	37	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 57 - Moselle

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>262</b>	<b>165</b>	<b>97</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>121</b>	<b>78</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	20	14	6	11	4	3	2
	55-59 ans	23	19	4	5	0	14	4
	60-64 ans	40	22	18	6	5	16	13
	65-69 ans	36	24	12	3	3	21	9
	70-74 ans	44	23	21	2	0	21	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>163</b>	<b>102</b>	<b>61</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>75</b>	<b>49</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	12	9	3	7	1	2	2
	55-59 ans	17	9	8	2	4	7	4
	60-64 ans	23	13	10	1	1	12	9
	65-69 ans	17	12	5	3	0	9	5
	70-74 ans	28	19	9	3	1	16	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>62</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>28</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	10	5	5	1	1	4	4
	65-69 ans	12	9	3	3	0	6	3
	70-74 ans	14	9	5	2	0	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>15</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	10	4	6	1	4	3	2
	60-64 ans	13	8	5	0	0	8	5
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	14	10	4	1	1	9	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>13</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2016-2017		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)								
3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)								
4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu								
	50-54 ans	25	19	6	15	3	4	3
	55-59 ans	31	21	10	5	4	16	6
	60-64 ans	48	28	20	6	3	22	17
	65-69 ans	36	24	12	5	1	19	11
	70-74 ans	50	33	17	3	1	30	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>190</b>	<b>125</b>	<b>65</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>91</b>	<b>53</b>
A40- Perdus de vue								
	50-54 ans	43	26	17	22	10	4	7
	55-59 ans	33	25	8	9	5	16	3
	60-64 ans	48	28	20	7	4	21	16
	65-69 ans	52	27	25	5	3	22	22
	70-74 ans	46	25	21	0	1	25	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>222</b>	<b>131</b>	<b>91</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>88</b>	<b>68</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,6	8,1	7,2	8,7	7,8	6,9	5,9
	55-59 ans	7,7	7,7	7,8	10,1	9,6	7,1	7,3
	60-64 ans	6,9	6,9	6,9	9,3	8,9	6,5	6,6
	65-69 ans	6,7	6,5	7,0	10,0	7,6	6,0	6,9
	70-74 ans	8,3	8,2	8,3	9,7	10,0	8,1	8,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>7,5</b>	<b>7,3</b>	<b>9,1</b>	<b>8,3</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,6	2,3	1,8	1,1	1,2
	55-59 ans	1,6	1,4	1,7	2,9	2,7	1,0	1,5
	60-64 ans	1,4	1,3	1,4	2,4	3,2	1,1	1,2
	65-69 ans	1,4	1,4	1,4	4,0	2,9	1,0	1,3
	70-74 ans	2,1	2,0	2,1	3,7	3,9	1,9	2,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,2	76,5	77,9	73,8	77,4	83,5	78,9
	55-59 ans	79,7	82,0	77,7	71,9	71,4	85,9	79,6
	60-64 ans	80,3	81,2	79,5	73,9	64,3	82,8	82,2
	65-69 ans	79,1	78,9	79,3	60,0	62,1	82,7	81,1
	70-74 ans	75,0	75,0	75,0	61,5	61,4	76,2	76,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,4</b>	<b>78,8</b>	<b>78,0</b>	<b>71,8</b>	<b>73,1</b>	<b>82,2</b>	<b>79,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,6	2,9	4,7	3,0	4,5	2,8
	55-59 ans	4,2	5,3	3,2	6,4	4,3	5,0	2,9
	60-64 ans	4,9	6,0	4,0	8,2	4,9	5,7	3,9
	65-69 ans	5,5	6,5	4,6	8,2	5,6	6,3	4,6
	70-74 ans	7,1	8,3	6,0	11,4	5,9	8,1	6,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>5,9</b>	<b>4,0</b>	<b>5,8</b>	<b>3,7</b>	<b>6,0</b>	<b>4,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,9</b>	<b>5,9</b>	<b>3,9</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,0	98,8	99,4	99,4	99,1	97,5	100,0
	55-59 ans	98,5	98,5	98,5	98,3	98,8	98,6	98,4
	60-64 ans	98,5	98,5	98,4	99,0	96,7	98,5	98,7
	65-69 ans	97,8	97,3	98,3	97,3	100,0	97,3	98,1
	70-74 ans	97,1	96,7	97,6	97,7	96,0	96,6	97,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,2</b>	<b>98,0</b>	<b>98,4</b>	<b>98,8</b>	<b>98,6</b>	<b>97,7</b>	<b>98,3</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,9	90,7	86,3	90,3	85,8	91,7	87,4
	55-59 ans	89,8	88,2	92,0	82,4	88,0	90,2	93,4
	60-64 ans	89,6	88,8	90,7	84,7	88,1	89,7	91,1
	65-69 ans	88,4	88,4	88,4	83,6	87,2	89,2	88,5
	70-74 ans	88,2	89,4	86,9	93,0	75,0	89,1	87,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,0</b>	<b>89,1</b>	<b>88,8</b>	<b>87,5</b>	<b>86,1</b>	<b>89,7</b>	<b>89,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,5	91,6	91,4	88,9	91,7	97,2	90,7
	55-59 ans	90,4	90,5	90,3	88,8	86,3	91,1	91,6
	60-64 ans	91,7	92,1	91,3	91,6	86,5	92,2	92,0
	65-69 ans	90,5	90,6	90,3	93,4	90,2	90,2	90,3
	70-74 ans	90,4	91,1	89,7	95,0	88,9	90,7	89,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,9</b>	<b>91,2</b>	<b>90,5</b>	<b>90,1</b>	<b>89,7</b>	<b>91,6</b>	<b>90,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	102	106	97	108	102	100	88
	55-59 ans	101	101	100	108	105	98	99
	60-64 ans	103	104	102	126	103	100	102
	65-69 ans	98	99	98	111	101	98	97
	70-74 ans	96	98	93	88	82	99	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>110</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>97</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81,5 (62-110)	82 (63,5-110)	80 (57-110)	82 (64-112)	82 (60-107)	78 (63-105)	77 (56-112)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	82 (59,5-113,5)	82 (60-115)	82 (59-113)	85 (59-139)	82,5 (55-119)	80 (60-110)	82 (61-111)
	60-64 ans	82 (60-113)	82 (61-117)	83 (60-112)	96 (68-153)	83 (52,5-112,5)	77,5 (60,5-111)	83 (60-112)
	65-69 ans	81 (61-111)	82 (59-115)	81 (62-111)	88 (62-132)	81 (61-126)	80 (59-110)	81 (63-109)
	70-74 ans	82 (59-112)	82 (61-113)	81 (57-110)	69 (53,5-113,5)	69 (42-111)	84 (62-113)	81 (57-110)
	<b>50-74 ans</b>	<b>82 (60-112)</b>	<b>82 (61-113)</b>	<b>82 (60-111)</b>	<b>84 (62-121)</b>	<b>81 (56-114)</b>	<b>81 (61-111)</b>	<b>82 (60-111)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,1	5,2	5,0	6,5	4,4	2,5	6,3
	55-59 ans	4,1	5,3	2,4	7,4	6,0	4,5	1,2
	60-64 ans	4,9	5,1	4,6	7,1	6,6	4,6	4,3
	65-69 ans	5,0	4,8	5,3	6,7	6,4	4,5	5,2
	70-74 ans	5,1	5,2	5,0	0,0	4,0	5,7	5,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6</b>	<b>6,3</b>	<b>5,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,5	98,4	98,6	98,4	98,4	98,6	99,0
	55-59 ans	98,7	98,8	98,7	100,0	97,3	98,4	99,1
	60-64 ans	99,0	99,2	98,7	100,0	98,1	99,0	98,8
	65-69 ans	99,0	99,4	98,5	98,4	100,0	99,5	98,4
	70-74 ans	98,3	98,8	97,8	100,0	100,0	98,7	97,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>98,9</b>	<b>98,5</b>	<b>99,0</b>	<b>98,4</b>	<b>98,9</b>	<b>98,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,4	34,8	51,5	35,3	53,6	33,8	47,4
	55-59 ans	42,5	33,1	55,5	25,3	55,4	35,6	55,5
	60-64 ans	34,3	26,9	43,5	20,2	28,8	28,3	45,7
	65-69 ans	32,1	26,7	38,3	19,4	31,7	27,8	39,0
	70-74 ans	33,7	26,1	42,5	31,7	36,8	25,5	42,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>36,4</b>	<b>29,4</b>	<b>45,5</b>	<b>29,6</b>	<b>47,4</b>	<b>29,4</b>	<b>44,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	3,5	3,1	3,6	2,6	3,4	4,1
	55-59 ans	2,7	2,7	2,7	3,0	2,7	2,5	2,6
	60-64 ans	1,8	0,6	3,3	0,0	5,8	0,7	2,9
	65-69 ans	2,0	2,3	1,7	3,2	2,4	2,1	1,6
	70-74 ans	1,1	1,7	0,6	2,4	0,0	1,6	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,7	0,0
	55-59 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
	60-64 ans	0,1	0,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

12/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,8	15,3	8,9	13,4	6,2	19,3	14,4
	55-59 ans	14,3	15,2	13,0	16,2	9,5	14,9	14,1
	60-64 ans	14,8	17,9	11,0	11,9	9,6	19,1	11,2
	65-69 ans	16,5	16,7	16,4	24,2	14,6	15,6	16,6
	70-74 ans	15,7	16,4	14,9	12,2	15,8	16,8	14,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,9</b>	<b>16,3</b>	<b>13,1</b>	<b>14,7</b>	<b>8,7</b>	<b>16,9</b>	<b>14,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,6	31,7	26,5	31,0	27,8	33,1	23,7
	55-59 ans	28,1	35,0	18,6	40,4	20,3	33,3	18,1
	60-64 ans	32,0	36,1	26,9	44,0	38,5	34,5	25,1
	65-69 ans	34,2	37,9	29,9	37,1	34,1	38,0	29,4
	70-74 ans	31,3	36,5	25,1	39,0	36,8	36,2	24,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,2</b>	<b>35,5</b>	<b>25,7</b>	<b>35,6</b>	<b>28,9</b>	<b>35,4</b>	<b>24,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	5,3	3,4	6,2	3,1	3,4	4,1
	55-59 ans	6,0	7,5	4,0	8,1	5,4	7,3	3,5
	60-64 ans	7,9	8,2	7,4	11,9	11,5	7,4	6,8
	65-69 ans	6,4	7,6	5,1	11,3	9,8	7,1	4,5
	70-74 ans	9,7	10,2	9,1	12,2	5,3	10,0	9,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,0</b>	<b>7,7</b>	<b>6,0</b>	<b>8,3</b>	<b>5,5</b>	<b>7,6</b>	<b>6,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	2,1
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
	65-69 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
	70-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,2	3,5	2,7	3,6	3,6	3,4	1,0
	55-59 ans	2,4	3,1	1,3	3,0	2,7	3,2	0,9

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

13/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,9	4,7	2,8	7,1	3,8	4,2	2,7
	65-69 ans	3,6	4,1	2,9	1,6	4,9	4,5	2,7
	70-74 ans	4,2	5,5	2,8	2,4	0,0	5,8	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>4,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>	<b>4,4</b>	<b>2,3</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,5	2,0	0,7	2,3	0,5	1,4	1,0
	55-59 ans	1,1	0,7	1,7	1,0	4,1	0,6	0,9
	60-64 ans	1,9	1,4	2,6	1,2	1,9	1,5	2,7
	65-69 ans	1,8	1,6	1,9	1,6	0,0	1,7	2,1
	70-74 ans	1,9	1,7	2,2	0,0	5,3	1,8	2,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,1	19,5	8,9	18,7	8,8	21,3	9,2
	55-59 ans	15,7	23,2	9,3	29,4	11,8	21,5	8,7
	60-64 ans	20,7	28,9	13,7	38,9	20,1	27,4	12,9
	65-69 ans	24,4	30,9	18,9	41,5	23,7	29,7	18,5
	70-74 ans	28,9	38,8	20,8	54,4	23,6	37,7	20,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,9</b>	<b>27,1</b>	<b>13,8</b>	<b>25,5</b>	<b>12,0</b>	<b>27,7</b>	<b>14,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>19,8</b>	<b>26,7</b>	<b>13,3</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,8	13,2	6,7	13,0	7,2	13,5	5,7
	55-59 ans	10,5	16,2	5,5	21,0	8,2	14,9	4,9
	60-64 ans	14,1	19,3	9,8	30,6	16,1	17,5	9,0
	65-69 ans	16,4	21,4	12,3	25,1	16,6	20,9	11,9
	70-74 ans	19,2	26,8	13,0	41,5	16,5	25,7	12,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,5</b>	<b>18,5</b>	<b>9,1</b>	<b>18,0</b>	<b>9,3</b>	<b>18,7</b>	<b>9,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,4</b>	<b>18,3</b>	<b>8,8</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	10,8	5,3	11,0	6,0	10,4	4,0
	55-59 ans	8,2	12,0	4,8	17,8	7,7	10,5	4,2
	60-64 ans	11,2	15,8	7,3	25,7	14,5	14,3	6,4
	65-69 ans	12,7	17,1	8,9	20,8	10,7	16,7	8,8
	70-74 ans	14,4	20,3	9,5	36,3	14,2	19,2	9,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>14,6</b>	<b>7,0</b>	<b>15,2</b>	<b>7,8</b>	<b>14,4</b>	<b>6,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,4</b>	<b>14,4</b>	<b>6,8</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	12,1	5,8	12,5	6,4	11,2	4,7
	55-59 ans	9,5	14,4	5,3	19,4	7,7	13,0	4,8
	60-64 ans	12,5	18,1	7,8	26,5	14,5	16,8	7,0
	65-69 ans	15,2	20,3	10,8	28,4	13,0	19,4	10,6
	70-74 ans	17,5	25,4	11,1	46,6	18,9	23,9	10,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,2</b>	<b>17,2</b>	<b>7,9</b>	<b>17,4</b>	<b>8,3</b>	<b>17,1</b>	<b>7,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,1</b>	<b>17,0</b>	<b>7,7</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,3	0,9	2,7	0,8	1,4	1,0
	55-59 ans	2,2	3,5	1,2	4,2	2,1	3,3	1,0
	60-64 ans	3,5	4,4	2,7	8,3	4,8	3,8	2,4
	65-69 ans	3,1	4,3	2,1	7,7	4,7	3,9	1,8
	70-74 ans	6,0	7,5	4,7	13,0	2,4	7,1	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,0</b>	<b>4,1</b>	<b>2,1</b>	<b>4,3</b>	<b>1,8</b>	<b>4,0</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	60,6	58,3	66,7	57,9	80,0	60,0	50,0
	55-59 ans	57,5	67,9	33,3	71,4	0,0	66,7	50,0
	60-64 ans	63,5	62,9	64,3	85,7	83,3	57,1	59,1
	65-69 ans	66,7	66,7	66,7	50,0	100,0	70,0	60,0
	70-74 ans	61,1	54,8	70,0	40,0	0,0	56,8	72,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>62,2</b>	<b>61,8</b>	<b>62,9</b>	<b>61,4</b>	<b>63,2</b>	<b>62,0</b>	<b>62,8</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)