

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/14

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	45 162	21 510	23 652	15 733	16 800	5 777	6 852
	55-59 ans	36 390	16 455	19 935	4 593	5 263	11 862	14 672
	60-64 ans	36 512	16 107	20 405	3 295	3 688	12 812	16 717
	65-69 ans	35 270	15 553	19 717	2 388	2 679	13 165	17 038
	70-74 ans	20 938	9 180	11 758	1 029	1 182	8 151	10 576
	50-74 ans	174 272	78 805	95 467	27 038	29 612	51 767	65 855
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	4 788	2 379	2 409	1 879	1 843	500	566
	55-59 ans	3 693	1 680	2 013	519	623	1 161	1 390
	60-64 ans	3 262	1 435	1 827	340	406	1 095	1 421
	65-69 ans	3 070	1 284	1 786	239	285	1 045	1 501
	70-74 ans	2 015	837	1 178	109	141	728	1 037
	50-74 ans	16 828	7 615	9 213	3 086	3 298	4 529	5 915
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 390	1 698	1 692	1 298	1 268	400	424
	55-59 ans	2 758	1 272	1 486	342	382	930	1 104
	60-64 ans	2 428	1 061	1 367	213	260	848	1 107
	65-69 ans	2 314	985	1 329	165	165	820	1 164
	70-74 ans	1 450	605	845	61	82	544	763
	50-74 ans	12 340	5 621	6 719	2 079	2 157	3 542	4 562
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 398	681	717	581	575	100	142
	55-59 ans	935	408	527	177	241	231	286
	60-64 ans	834	374	460	127	146	247	314
	65-69 ans	756	299	457	74	120	225	337
	70-74 ans	565	232	333	48	59	184	274
	50-74 ans	4 488	1 994	2 494	1 007	1 141	987	1 353
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	43 764	20 829	22 935	15 152	16 225	5 677	6 710
	55-59 ans	35 455	16 047	19 408	4 416	5 022	11 631	14 386
	60-64 ans	35 678	15 733	19 945	3 168	3 542	12 565	16 403
	65-69 ans	34 514	15 254	19 260	2 314	2 559	12 940	16 701
	70-74 ans	20 373	8 948	11 425	981	1 123	7 967	10 302
	50-74 ans	169 784	76 811	92 973	26 031	28 471	50 780	64 502
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 600	901	699	680	518	221	181
	55-59 ans	1 551	865	686	292	233	573	453
	60-64 ans	1 822	1 026	796	286	187	740	609
	65-69 ans	2 021	1 181	840	245	152	936	688

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1 262	693	569	109	80	584	489
	50-74 ans	8 256	4 666	3 590	1 612	1 170	3 054	2 420
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 595	898	697	679	516	219	181
	55-59 ans	1 545	863	682	290	233	573	449
	60-64 ans	1 813	1 019	794	282	186	737	608
	65-69 ans	1 997	1 166	831	242	150	924	681
	70-74 ans	1 240	679	561	106	80	573	481
	50-74 ans	8 190	4 625	3 565	1 599	1 165	3 026	2 400
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 252	713	539	525	383	188	156
	55-59 ans	1 254	695	559	201	174	494	385
	60-64 ans	1 531	855	676	222	155	633	521
	65-69 ans	1 673	978	695	195	114	783	581
	70-74 ans	998	552	446	77	51	475	395
	50-74 ans	6 708	3 793	2 915	1 220	877	2 573	2 038
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 230	705	525	518	371	187	154
	55-59 ans	1 228	685	543	199	169	486	374
	60-64 ans	1 479	828	651	210	146	618	505
	65-69 ans	1 610	951	659	186	110	765	549
	70-74 ans	945	535	410	73	45	462	365
	50-74 ans	6 492	3 704	2 788	1 186	841	2 518	1 947
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 247	711	536	523	381	188	155
	55-59 ans	1 240	692	548	201	171	491	377
	60-64 ans	1 499	842	657	217	147	625	510
	65-69 ans	1 647	970	677	194	113	776	564
	70-74 ans	973	546	427	76	50	470	377
	50-74 ans	6 606	3 761	2 845	1 211	862	2 550	1 983
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	14	3	11	0	3	3	8
	60-64 ans	32	13	19	5	8	8	11
	65-69 ans	26	8	18	1	1	7	17
	70-74 ans	25	6	19	1	1	5	18
	50-74 ans	102	32	70	9	15	23	55
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	6	2	4	2	0	0	4
	60-64 ans	9	6	3	4	1	2	2
	65-69 ans	23	15	8	3	2	12	6
	70-74 ans	18	9	9	3	0	6	9
	50-74 ans	61	34	27	13	6	21	21
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 238	706	532	518	377	188	155
	55-59 ans	1 237	692	545	200	170	492	375
	60-64 ans	1 496	841	655	221	147	620	508
	65-69 ans	1 642	964	678	191	114	773	564
	70-74 ans	969	544	425	76	50	468	375
	50-74 ans	6 582	3 747	2 835	1 206	858	2 541	1 977
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 257	715	542	526	386	189	156
	55-59 ans	1 260	697	563	203	174	494	389
	60-64 ans	1 540	861	679	226	156	635	523
	65-69 ans	1 696	993	703	198	116	795	587
	70-74 ans	1 016	561	455	80	51	481	404
	50-74 ans	6 769	3 827	2 942	1 233	883	2 594	2 059
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	561	260	301	186	214	74	87
	55-59 ans	478	202	276	52	71	150	205

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	510	219	291	54	63	165	228
	65-69 ans	543	248	295	35	54	213	241
	70-74 ans	311	138	173	18	19	120	154
	50-74 ans	2 403	1 067	1 336	345	421	722	915
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	7	3	4	2	3	1	1
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	12	10	2	2	0	8	2
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	31	17	14	4	5	13	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	10	6	4	2	1	4	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	197	141	56	109	42	32	14
	55-59 ans	255	168	87	38	28	130	59
	60-64 ans	328	221	107	52	22	169	85
	65-69 ans	371	243	128	50	14	193	114
	70-74 ans	226	138	88	15	9	123	79
	50-74 ans	1 377	911	466	264	115	647	351
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	280	191	89	142	59	49	30
	55-59 ans	307	195	112	60	40	135	72
	60-64 ans	408	254	154	71	39	183	115
	65-69 ans	445	274	171	65	28	209	143
	70-74 ans	277	171	106	21	14	150	92
	50-74 ans	1 717	1 085	632	359	180	726	452
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	74	40	34	28	30	12	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	75	48	27	21	11	27	16
	60-64 ans	133	72	61	31	19	41	42
	65-69 ans	169	120	49	27	13	93	36
	70-74 ans	108	60	48	16	5	44	43
	50-74 ans	559	340	219	123	78	217	141
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	20	11	9	7	4	4	5
	55-59 ans	7	2	5	0	3	2	2
	60-64 ans	13	10	3	1	0	9	3
	65-69 ans	17	11	6	1	1	10	5
	70-74 ans	10	4	6	0	0	4	6
	50-74 ans	67	38	29	9	8	29	21
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	19	15	4	10	3	5	1
	55-59 ans	26	16	10	6	3	10	7
	60-64 ans	27	15	12	5	5	10	7
	65-69 ans	54	38	16	9	2	29	14
	70-74 ans	26	18	8	4	2	14	6
	50-74 ans	152	102	50	34	15	68	35
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	5	1	4	1	1	0	3
	60-64 ans	14	7	7	1	2	6	5
	65-69 ans	14	9	5	3	0	6	5
	70-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
	50-74 ans	51	27	24	10	8	17	16
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	477	332	145	251	101	81	44
	55-59 ans	562	363	199	98	68	265	131
	60-64 ans	736	475	261	123	61	352	200
	65-69 ans	816	517	299	115	42	402	257
	70-74 ans	503	309	194	36	23	273	171
	50-74 ans	3 094	1 996	1 098	623	295	1 373	803

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	280	191	89	142	59	49	30
	55-59 ans	307	195	112	60	40	135	72
	60-64 ans	408	254	154	71	39	183	115
	65-69 ans	445	274	171	65	28	209	143
	70-74 ans	277	171	106	21	14	150	92
	50-74 ans	1 717	1 085	632	359	180	726	452
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	225	149	76	115	52	34	24
	55-59 ans	237	147	90	47	33	100	57
	60-64 ans	311	194	117	58	28	136	89
	65-69 ans	345	215	130	49	22	166	108
	70-74 ans	205	128	77	16	10	112	67
	50-74 ans	1 323	833	490	285	145	548	345
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	268	183	85	139	59	44	26
	55-59 ans	308	201	107	58	38	143	69
	60-64 ans	394	258	136	76	32	182	104
	65-69 ans	454	295	159	66	24	229	135
	70-74 ans	274	173	101	20	13	153	88
	50-74 ans	1 698	1 110	588	359	166	751	422
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	74	40	34	28	30	12	4
	55-59 ans	75	48	27	21	11	27	16
	60-64 ans	134	73	61	32	19	41	42
	65-69 ans	170	121	49	28	13	93	36
	70-74 ans	108	60	48	16	5	44	43
	50-74 ans	561	342	219	125	78	217	141
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	61	33	28	24	24	9	4
	55-59 ans	61	37	24	17	9	20	15
	60-64 ans	121	67	54	30	17	37	37
	65-69 ans	156	113	43	25	10	88	33
	70-74 ans	105	58	47	16	5	42	42

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 59 - Nord

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	504	308	196	112	65	196	131
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	12	9	3	6	1	3	2
	65-69 ans	8	7	1	0	1	7	0
	70-74 ans	16	11	5	4	2	7	3
	50-74 ans	45	31	14	13	7	18	7
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	55	31	24	22	21	9	3
	55-59 ans	58	35	23	16	9	19	14
	60-64 ans	108	57	51	24	16	33	35
	65-69 ans	148	106	42	25	9	81	33
	70-74 ans	89	47	42	12	3	35	39
	50-74 ans	458	276	182	99	58	177	124
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	40	21	19	15	16	6	3
	55-59 ans	38	23	15	11	6	12	9
	60-64 ans	71	36	35	16	10	20	25
	65-69 ans	110	77	33	19	7	58	26
	70-74 ans	63	31	32	8	3	23	29
	50-74 ans	322	188	134	69	42	119	92
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	15	10	5	7	5	3	0
	55-59 ans	20	12	8	5	3	7	5
	60-64 ans	37	21	16	8	6	13	10
	65-69 ans	38	29	9	6	2	23	7
	70-74 ans	26	16	10	4	0	12	10
	50-74 ans	136	88	48	30	16	58	32
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	18	10	8	8	6	2	2
	55-59 ans	18	10	8	5	3	5	5
	60-64 ans	39	22	17	7	3	15	14
	65-69 ans	49	35	14	6	1	29	13
	70-74 ans	23	14	9	4	0	10	9
	50-74 ans	147	91	56	30	13	61	43
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	7	4	3	3	1	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	4	8	3	5	1	3
	65-69 ans	18	10	8	3	4	7	4
	70-74 ans	20	6	14	1	2	5	12
	50-74 ans	63	26	37	12	15	14	22
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	11	8	3	4	3	4	0
	55-59 ans	12	8	4	3	2	5	2
	60-64 ans	15	6	9	3	2	3	7
	65-69 ans	28	20	8	7	2	13	6
	70-74 ans	16	8	8	3	1	5	7
	50-74 ans	82	50	32	20	10	30	22
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	15	12	3	3	0	9	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	30	21	9	7	4	14	5
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	53	31	22	22	19	9	3
	55-59 ans	60	37	23	17	9	20	14
	60-64 ans	108	57	51	23	16	34	35
	65-69 ans	142	100	42	22	9	78	33
	70-74 ans	87	46	41	12	3	34	38
	50-74 ans	450	271	179	96	56	175	123
A40- Perdus de vue	50-54 ans	240	127	113	107	96	20	17
	55-59 ans	204	123	81	65	41	58	40
	60-64 ans	200	118	82	48	21	70	61
	65-69 ans	213	124	89	31	28	93	61
	70-74 ans	156	91	65	24	18	67	47
	50-74 ans	1 013	583	430	275	204	308	226

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 59 - Nord

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,6	11,1	10,2	11,9	11,0	8,7	8,3
	55-59 ans	10,1	10,2	10,1	11,3	11,8	9,8	9,5
	60-64 ans	8,9	8,9	9,0	10,3	11,0	8,5	8,5
	65-69 ans	8,7	8,3	9,1	10,0	10,6	7,9	8,8
	70-74 ans	9,6	9,1	10,0	10,6	11,9	8,9	9,8
	50-74 ans	9,7	9,7	9,7	11,4	11,1	8,7	9,0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,1	3,2	3,0	3,7	3,4	1,7	2,1
	55-59 ans	2,6	2,5	2,6	3,9	4,6	1,9	1,9
	60-64 ans	2,3	2,3	2,3	3,9	4,0	1,9	1,9
	65-69 ans	2,1	1,9	2,3	3,1	4,5	1,7	2,0
	70-74 ans	2,7	2,5	2,8	4,7	5,0	2,3	2,6
	50-74 ans	2,6	2,5	2,6	3,7	3,9	1,9	2,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,8	71,4	70,2	69,1	68,8	80,0	74,9
	55-59 ans	74,7	75,7	73,8	65,9	61,3	80,1	79,4
	60-64 ans	74,4	73,9	74,8	62,6	64,0	77,4	77,9
	65-69 ans	75,4	76,7	74,4	69,0	57,9	78,5	77,5
	70-74 ans	72,0	72,3	71,7	56,0	58,2	74,7	73,6
	50-74 ans	73,3	73,8	72,9	67,4	65,4	78,2	77,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,3	3,0	4,5	3,2	3,9	2,7
	55-59 ans	4,4	5,4	3,5	6,6	4,6	4,9	3,1
	60-64 ans	5,1	6,5	4,0	9,0	5,3	5,9	3,7
	65-69 ans	5,9	7,7	4,4	10,6	5,9	7,2	4,1
	70-74 ans	6,2	7,7	5,0	11,1	7,1	7,3	4,7
	50-74 ans	4,9	6,1	3,9	6,2	4,1	6,0	3,8
50-74 ans **	4,9	6,0	3,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	99,7	99,7	99,9	99,6	99,1	100,0
	55-59 ans	99,6	99,8	99,4	99,3	100,0	100,0	99,1
	60-64 ans	99,5	99,3	99,7	98,6	99,5	99,6	99,8
	65-69 ans	98,8	98,7	98,9	98,8	98,7	98,7	99,0
	70-74 ans	98,3	98,0	98,6	97,2	100,0	98,1	98,4
	50-74 ans	99,2	99,1	99,3	99,2	99,6	99,1	99,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 59 - Nord

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	78,5	79,4	77,3	77,3	74,2	85,8	86,2
	55-59 ans	81,2	80,5	82,0	69,3	74,7	86,2	85,7
	60-64 ans	84,4	83,9	85,1	78,7	83,3	85,9	85,7
	65-69 ans	83,8	83,9	83,6	80,6	76,0	84,7	85,3
	70-74 ans	80,5	81,3	79,5	72,6	63,8	82,9	82,1
	50-74 ans	81,9	82,0	81,8	76,3	75,3	85,0	84,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,2	98,9	97,4	98,7	96,9	99,5	98,7
	55-59 ans	97,9	98,6	97,1	99,0	97,1	98,4	97,1
	60-64 ans	96,6	96,8	96,3	94,6	94,2	97,6	96,9
	65-69 ans	96,2	97,2	94,8	95,4	96,5	97,7	94,5
	70-74 ans	94,7	96,9	91,9	94,8	88,2	97,3	92,4
	50-74 ans	96,8	97,7	95,6	97,2	95,9	97,9	95,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	4	3	3	3	4	3
	55-59 ans	4	4	4	4	4	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	5	4	3
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	98	106	88	105	91	107	81
	55-59 ans	92	98	86	106	82	94	88
	60-64 ans	91	90	93	86	94	91	92
	65-69 ans	94	97	90	91	106	99	87
	70-74 ans	87	91	84	97	82	89	84
	50-74 ans	93	96	89	99	91	95	88
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (48-106)	74 (49-113)	67 (46-97)	75 (50-113)	68 (48-98)	74 (47,5-112,5)	64 (44,5-94,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 59 - Nord

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	68 (48-97)	69 (47-101)	65 (48-90)	73 (51-102)	65 (47-85)	67,5 (46-100)	66 (48-96)
	60-64 ans	69 (48-98)	70 (48-99)	67 (49-98)	70 (47-103)	69 (49-98)	71 (49-97)	67 (49-98)
	65-69 ans	68 (49-97)	70 (49-99)	67 (48-96)	64 (47-99)	69 (50-98)	70 (49-100)	67 (48-95)
	70-74 ans	69 (48-97)	69 (49-97)	69 (47-97)	69 (45-97)	63 (48-106)	69 (49-97)	70 (47-96)
	50-74 ans	69 (48-98)	70 (48-101)	67 (48-96)	70 (49-106)	68 (48-96)	70 (48-99)	67 (48-96)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,0	14,1	16,2	15,7	18,5	9,0	9,4
	55-59 ans	13,2	14,2	11,8	22,3	17,6	10,1	8,8
	60-64 ans	11,0	11,5	10,3	16,8	11,2	9,5	10,0
	65-69 ans	10,5	10,5	10,6	12,7	18,4	9,9	8,9
	70-74 ans	12,4	13,1	11,4	22,0	22,5	11,5	9,6
	50-74 ans	12,3	12,5	12,0	17,1	17,4	10,1	9,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	99,0	98,7	98,7	98,4	100,0	99,4
	55-59 ans	98,6	99,6	97,5	99,5	97,7	99,6	97,4
	60-64 ans	97,7	98,4	96,9	99,5	94,8	97,9	97,5
	65-69 ans	98,1	98,6	97,6	97,9	100,0	98,7	97,1
	70-74 ans	97,1	98,6	95,3	98,7	98,0	98,5	94,9
	50-74 ans	98,1	98,8	97,3	98,9	97,8	98,8	97,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,6	36,4	55,5	35,4	55,4	39,2	55,8
	55-59 ans	37,9	29,0	49,0	25,6	40,8	30,4	52,7
	60-64 ans	33,1	25,4	42,9	23,9	40,4	26,0	43,6
	65-69 ans	32,0	25,0	42,0	17,7	46,6	26,8	41,1
	70-74 ans	30,6	24,6	38,0	22,5	37,3	24,9	38,1
	50-74 ans	35,5	27,9	45,4	28,0	47,7	27,8	44,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,6	0,4	0,7	0,4	0,8	0,5	0,6
	55-59 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	1,1	0,0	0,3
	60-64 ans	0,8	1,2	0,3	0,9	0,0	1,3	0,4
	65-69 ans	0,4	0,3	0,6	0,0	0,0	0,4	0,7
	70-74 ans	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
	50-74 ans	0,5	0,4	0,5	0,3	0,6	0,5	0,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	55-59 ans	0,2	0,3	0,0	0,5	0,0	0,2	0,0
	60-64 ans	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 59 - Nord

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,1	0,1	0,1	0,5	0,9	0,0	0,0
	70-74 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
	50-74 ans	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,7	19,7	10,3	20,7	10,9	16,9	9,0
	55-59 ans	20,2	24,1	15,5	18,7	16,1	26,3	15,2
	60-64 ans	21,3	25,7	15,8	23,0	14,1	26,6	16,3
	65-69 ans	21,9	24,5	18,2	25,3	12,1	24,3	19,4
	70-74 ans	22,2	24,6	19,3	18,8	17,6	25,6	19,6
	50-74 ans	20,3	23,8	15,8	21,4	13,0	24,9	17,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,3	26,7	16,4	27,0	15,3	25,9	19,2
	55-59 ans	24,4	28,0	19,9	29,6	23,0	27,3	18,5
	60-64 ans	26,5	29,5	22,7	31,4	25,0	28,8	22,0
	65-69 ans	26,2	27,6	24,3	32,8	24,1	26,3	24,4
	70-74 ans	27,3	30,5	23,3	26,3	27,5	31,2	22,8
	50-74 ans	25,4	28,4	21,5	29,1	20,4	28,0	22,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,9	5,6	6,3	5,3	7,8	6,3	2,6
	55-59 ans	6,0	6,9	4,8	10,3	6,3	5,5	4,1
	60-64 ans	8,6	8,4	9,0	13,7	12,2	6,5	8,0
	65-69 ans	10,0	12,1	7,0	13,6	11,2	11,7	6,1
	70-74 ans	10,6	10,7	10,5	20,0	9,8	9,1	10,6
	50-74 ans	8,3	8,9	7,4	10,0	8,8	8,4	6,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	1,5	1,7	1,3	1,0	2,1	3,2
	55-59 ans	0,6	0,3	0,9	0,0	1,7	0,4	0,5
	60-64 ans	0,8	1,2	0,4	0,4	0,0	1,4	0,6
	65-69 ans	1,0	1,1	0,9	0,5	0,9	1,3	0,9
	70-74 ans	1,0	0,7	1,3	0,0	0,0	0,8	1,5
	50-74 ans	1,0	1,0	1,0	0,7	0,9	1,1	1,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	2,1	0,7	1,9	0,8	2,6	0,6
	55-59 ans	2,1	2,3	1,8	3,0	1,7	2,0	1,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 59 - Nord

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,8	1,7	1,8	2,2	3,2	1,6	1,3
	65-69 ans	3,2	3,8	2,3	4,5	1,7	3,6	2,4
	70-74 ans	2,6	3,2	1,8	5,0	3,9	2,9	1,5
	50-74 ans	2,2	2,7	1,7	2,8	1,7	2,6	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	0,7	0,7	1,0	1,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,1	0,7	0,5	0,6	0,0	0,8
	60-64 ans	0,9	0,8	1,0	0,4	1,3	0,9	1,0
	65-69 ans	0,8	0,9	0,7	1,5	0,0	0,8	0,9
	70-74 ans	0,9	0,9	0,9	0,0	2,0	1,0	0,7
	50-74 ans	0,8	0,7	0,8	0,8	0,9	0,7	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,9	15,9	6,3	16,6	6,2	14,3	6,6
	55-59 ans	15,9	22,6	10,3	22,2	13,5	22,8	9,1
	60-64 ans	20,6	30,2	13,1	38,8	17,2	28,0	12,2
	65-69 ans	23,6	33,9	15,5	49,7	16,4	31,1	15,4
	70-74 ans	24,7	34,5	17,0	36,7	20,5	34,3	16,6
	50-74 ans	18,2	26,0	11,8	23,9	10,4	27,0	12,4
	50-74 ans **	18,5	25,8	11,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	9,2	3,9	9,4	3,6	8,6	4,5
	55-59 ans	8,7	12,2	5,8	13,6	8,0	11,6	5,0
	60-64 ans	11,4	16,1	7,7	22,4	11,0	14,6	7,0
	65-69 ans	12,9	18,0	8,9	28,1	10,9	16,2	8,6
	70-74 ans	13,6	19,1	9,3	21,4	12,5	18,8	8,9
	50-74 ans	10,1	14,1	6,8	13,8	6,3	14,3	7,0
	50-74 ans **	10,2	14,1	6,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	7,2	3,3	7,6	3,2	6,0	3,6
	55-59 ans	6,7	9,2	4,6	10,6	6,6	8,6	4,0
	60-64 ans	8,7	12,3	5,9	18,3	7,9	10,8	5,4
	65-69 ans	10,0	14,1	6,7	21,2	8,6	12,8	6,5
	70-74 ans	10,1	14,3	6,7	16,3	8,9	14,1	6,5
	50-74 ans	7,8	10,8	5,3	10,9	5,1	10,8	5,3
	50-74 ans **	7,9	10,8	5,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 59 - Nord

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	8,8	3,7	9,2	3,6	7,8	3,9
	55-59 ans	8,7	12,5	5,5	13,1	7,6	12,3	4,8
	60-64 ans	11,0	16,4	6,8	24,0	9,0	14,5	6,3
	65-69 ans	13,2	19,3	8,3	28,5	9,4	17,7	8,1
	70-74 ans	13,4	19,3	8,8	20,4	11,6	19,2	8,5
	50-74 ans	10,0	14,5	6,3	13,8	5,8	14,8	6,5
	50-74 ans **	10,1	14,3	6,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	1,8	1,8	2,1	0,6
	55-59 ans	2,1	3,0	1,4	4,8	2,2	2,3	1,1
	60-64 ans	3,8	4,6	3,1	10,1	5,4	3,3	2,6
	65-69 ans	4,9	7,9	2,5	12,1	5,1	7,2	2,2
	70-74 ans	5,3	6,7	4,2	16,3	4,5	5,5	4,2
	50-74 ans	3,3	4,5	2,4	4,8	2,7	4,3	2,2
	50-74 ans **	3,3	4,3	2,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	9,8	6,1	14,3	8,3	12,5	0,0	25,0
	55-59 ans	4,9	5,4	4,2	5,9	0,0	5,0	6,7
	60-64 ans	9,9	13,4	5,6	20,0	5,9	8,1	5,4
	65-69 ans	5,1	6,2	2,3	0,0	10,0	8,0	0,0
	70-74 ans	15,2	19,0	10,6	25,0	40,0	16,7	7,1
	50-74 ans	8,9	10,1	7,1	11,6	10,8	9,2	5,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)