

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 62 - Pas-de-Calais

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	27 996	13 435	14 561	9 453	9 635	3 982	4 926
	55-59 ans	24 073	11 071	13 002	2 642	2 807	8 429	10 195
	60-64 ans	24 644	11 042	13 602	2 196	2 158	8 846	11 444
	65-69 ans	24 403	10 968	13 435	1 701	1 631	9 267	11 804
	70-74 ans	14 395	6 483	7 912	774	818	5 709	7 094
	<b>50-74 ans</b>	<b>115 511</b>	<b>52 999</b>	<b>62 512</b>	<b>16 766</b>	<b>17 049</b>	<b>36 233</b>	<b>45 463</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 384	1 235	1 149	944	814	291	335
	55-59 ans	2 142	1 050	1 092	275	290	775	802
	60-64 ans	2 000	918	1 082	213	208	705	874
	65-69 ans	2 008	889	1 119	178	175	711	944
	70-74 ans	1 262	512	750	74	101	438	649
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 796</b>	<b>4 604</b>	<b>5 192</b>	<b>1 684</b>	<b>1 588</b>	<b>2 920</b>	<b>3 604</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 692	865	827	640	559	225	268
	55-59 ans	1 598	768	830	180	186	588	644
	60-64 ans	1 526	708	818	155	131	553	687
	65-69 ans	1 548	700	848	128	108	572	740
	70-74 ans	941	387	554	47	64	340	490
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 305</b>	<b>3 428</b>	<b>3 877</b>	<b>1 150</b>	<b>1 048</b>	<b>2 278</b>	<b>2 829</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	692	370	322	304	255	66	67
	55-59 ans	544	282	262	95	104	187	158
	60-64 ans	474	210	264	58	77	152	187
	65-69 ans	460	189	271	50	67	139	204
	70-74 ans	321	125	196	27	37	98	159
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 491</b>	<b>1 176</b>	<b>1 315</b>	<b>534</b>	<b>540</b>	<b>642</b>	<b>775</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	27 304	13 065	14 239	9 149	9 380	3 916	4 859
	55-59 ans	23 529	10 789	12 740	2 547	2 703	8 242	10 037
	60-64 ans	24 170	10 832	13 338	2 138	2 081	8 694	11 257
	65-69 ans	23 943	10 779	13 164	1 651	1 564	9 128	11 600
	70-74 ans	14 074	6 358	7 716	747	781	5 611	6 935
	<b>50-74 ans</b>	<b>113 020</b>	<b>51 823</b>	<b>61 197</b>	<b>16 232</b>	<b>16 509</b>	<b>35 591</b>	<b>44 688</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 056	604	452	441	308	163	144
	55-59 ans	1 031	630	401	174	98	456	303
	60-64 ans	1 317	788	529	177	103	611	426
	65-69 ans	1 467	833	634	155	100	678	534

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 62 - Pas-de-Calais

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	955	569	386	83	45	486	341
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 826</b>	<b>3 424</b>	<b>2 402</b>	<b>1 030</b>	<b>654</b>	<b>2 394</b>	<b>1 748</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 036	593	443	436	302	157	141
	55-59 ans	1 010	619	391	173	95	446	296
	60-64 ans	1 282	765	517	175	101	590	416
	65-69 ans	1 429	808	621	149	97	659	524
	70-74 ans	910	542	368	80	44	462	324
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 667</b>	<b>3 327</b>	<b>2 340</b>	<b>1 013</b>	<b>639</b>	<b>2 314</b>	<b>1 701</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	894	503	391	366	259	137	132
	55-59 ans	884	535	349	140	83	395	266
	60-64 ans	1 130	667	463	140	83	527	380
	65-69 ans	1 265	712	553	126	82	586	471
	70-74 ans	825	494	331	66	41	428	290
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 998</b>	<b>2 911</b>	<b>2 087</b>	<b>838</b>	<b>548</b>	<b>2 073</b>	<b>1 539</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	873	498	375	361	248	137	127
	55-59 ans	871	527	344	136	81	391	263
	60-64 ans	1 097	652	445	135	82	517	363
	65-69 ans	1 232	693	539	119	79	574	460
	70-74 ans	794	473	321	62	40	411	281
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 867</b>	<b>2 843</b>	<b>2 024</b>	<b>813</b>	<b>530</b>	<b>2 030</b>	<b>1 494</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	9	8	1	5	1	3	0
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	16	12	4	5	0	7	4
	65-69 ans	25	16	9	3	2	13	7
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>16</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 62 - Pas-de-Calais

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	882	501	381	364	252	137	129
	55-59 ans	881	533	348	139	82	394	266
	60-64 ans	1 112	663	449	139	83	524	366
	65-69 ans	1 252	706	546	124	80	582	466
	70-74 ans	810	485	325	65	41	420	284
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 937</b>	<b>2 888</b>	<b>2 049</b>	<b>831</b>	<b>538</b>	<b>2 057</b>	<b>1 511</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	12	2	10	2	7	0	3
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	18	4	14	1	0	3	14
	65-69 ans	13	6	7	2	2	4	5
	70-74 ans	15	9	6	1	0	8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	7	3	4	2	1	1	3
	70-74 ans	11	6	5	2	0	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	877	500	377	363	250	137	127
	55-59 ans	879	531	348	138	82	393	266
	60-64 ans	1 115	663	452	139	83	524	369
	65-69 ans	1 252	706	546	124	80	582	466
	70-74 ans	810	485	325	64	41	421	284
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 933</b>	<b>2 885</b>	<b>2 048</b>	<b>828</b>	<b>536</b>	<b>2 057</b>	<b>1 512</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	896	505	391	367	259	138	132
	55-59 ans	885	536	349	140	83	396	266
	60-64 ans	1 133	669	464	141	84	528	380
	65-69 ans	1 272	715	557	128	83	587	474
	70-74 ans	836	500	336	68	41	432	295
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 022</b>	<b>2 925</b>	<b>2 097</b>	<b>844</b>	<b>550</b>	<b>2 081</b>	<b>1 547</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	396	187	209	136	133	51	76
	55-59 ans	342	164	178	36	39	128	139

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

4/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	379	171	208	27	32	144	176
	65-69 ans	429	195	234	35	30	160	204
	70-74 ans	289	143	146	13	20	130	126
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 835</b>	<b>860</b>	<b>975</b>	<b>247</b>	<b>254</b>	<b>613</b>	<b>721</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	54	33	21	20	16	13	5
	55-59 ans	45	30	15	4	3	26	12
	60-64 ans	62	32	30	3	10	29	20
	65-69 ans	54	27	27	4	3	23	24
	70-74 ans	30	17	13	5	2	12	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>245</b>	<b>139</b>	<b>106</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>103</b>	<b>72</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	4	2	4	1	0	1
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	139	87	52	61	33	26	19
	55-59 ans	173	107	66	31	19	76	47
	60-64 ans	221	141	80	27	11	114	69
	65-69 ans	232	144	88	22	15	122	73
	70-74 ans	168	110	58	14	6	96	52
	<b>50-74 ans</b>	<b>933</b>	<b>589</b>	<b>344</b>	<b>155</b>	<b>84</b>	<b>434</b>	<b>260</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	229	152	77	115	57	37	20
	55-59 ans	244	173	71	50	15	123	56
	60-64 ans	336	233	103	55	25	178	78
	65-69 ans	387	250	137	40	22	210	115
	70-74 ans	249	156	93	20	11	136	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 445</b>	<b>964</b>	<b>481</b>	<b>280</b>	<b>130</b>	<b>684</b>	<b>351</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	49	29	20	22	14	7	6

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	58	43	15	15	6	28	9
	60-64 ans	112	80	32	27	4	53	28
	65-69 ans	132	77	55	21	11	56	44
	70-74 ans	75	57	18	12	2	45	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>426</b>	<b>286</b>	<b>140</b>	<b>97</b>	<b>37</b>	<b>189</b>	<b>103</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	10	7	3	5	1	2	2
	55-59 ans	9	8	1	0	0	8	1
	60-64 ans	12	7	5	1	1	6	4
	65-69 ans	16	7	9	3	1	4	8
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>17</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	14	9	5	2	1	7	4
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>10</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	368	239	129	176	90	63	39
	55-59 ans	417	280	137	81	34	199	103
	60-64 ans	557	374	183	82	36	292	147
	65-69 ans	619	394	225	62	37	332	188
	70-74 ans	417	266	151	34	17	232	134
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 378</b>	<b>1 553</b>	<b>825</b>	<b>435</b>	<b>214</b>	<b>1 118</b>	<b>611</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 62 - Pas-de-Calais

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	229	152	77	115	57	37	20
	55-59 ans	244	173	71	50	15	123	56
	60-64 ans	336	233	103	55	25	178	78
	65-69 ans	387	250	137	40	22	210	115
	70-74 ans	249	156	93	20	11	136	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 445</b>	<b>964</b>	<b>481</b>	<b>280</b>	<b>130</b>	<b>684</b>	<b>351</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	193	125	68	94	53	31	15
	55-59 ans	195	140	55	41	11	99	44
	60-64 ans	277	191	86	45	19	146	67
	65-69 ans	309	195	114	33	18	162	96
	70-74 ans	190	120	70	16	10	104	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 164</b>	<b>771</b>	<b>393</b>	<b>229</b>	<b>111</b>	<b>542</b>	<b>282</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	225	146	79	107	61	39	18
	55-59 ans	231	168	63	50	15	118	48
	60-64 ans	341	233	108	54	25	179	83
	65-69 ans	382	250	132	42	20	208	112
	70-74 ans	249	158	91	18	10	140	81
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 428</b>	<b>955</b>	<b>473</b>	<b>271</b>	<b>131</b>	<b>684</b>	<b>342</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	49	29	20	22	14	7	6
	55-59 ans	58	43	15	15	6	28	9
	60-64 ans	112	80	32	27	4	53	28
	65-69 ans	133	78	55	22	11	56	44
	70-74 ans	75	57	18	12	2	45	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>427</b>	<b>287</b>	<b>140</b>	<b>98</b>	<b>37</b>	<b>189</b>	<b>103</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	47	27	20	21	14	6	6
	55-59 ans	56	41	15	14	6	27	9
	60-64 ans	103	74	29	25	3	49	26
	65-69 ans	121	71	50	20	9	51	41
	70-74 ans	71	54	17	12	1	42	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 62 - Pas-de-Calais

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>398</b>	<b>267</b>	<b>131</b>	<b>92</b>	<b>33</b>	<b>175</b>	<b>98</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	7	7	0	2	0	5	0
	65-69 ans	9	7	2	1	1	6	1
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	42	25	17	19	12	6	5
	55-59 ans	50	36	14	12	6	24	8
	60-64 ans	96	67	29	23	3	44	26
	65-69 ans	111	63	48	19	8	44	40
	70-74 ans	65	49	16	12	1	37	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>364</b>	<b>240</b>	<b>124</b>	<b>85</b>	<b>30</b>	<b>155</b>	<b>94</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	27	18	9	13	8	5	1
	55-59 ans	41	30	11	11	6	19	5
	60-64 ans	62	47	15	16	1	31	14
	65-69 ans	71	41	30	14	5	27	25
	70-74 ans	50	36	14	7	1	29	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>251</b>	<b>172</b>	<b>79</b>	<b>61</b>	<b>21</b>	<b>111</b>	<b>58</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	15	7	8	6	4	1	4
	55-59 ans	9	6	3	1	0	5	3
	60-64 ans	34	20	14	7	2	13	12
	65-69 ans	40	22	18	5	3	17	15
	70-74 ans	15	13	2	5	0	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>68</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>36</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	14	8	6	5	5	3	1
	55-59 ans	19	15	4	6	2	9	2
	60-64 ans	38	27	11	5	1	22	10
	65-69 ans	35	17	18	4	2	13	16
	70-74 ans	25	20	5	4	0	16	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>87</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>63</b>	<b>34</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	7	7	0	2	0	5	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 62 - Pas-de-Calais

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	4	3	4	0	0	3
	65-69 ans	18	10	8	2	3	8	5
	70-74 ans	15	10	5	3	1	7	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>12</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	8	6	2	5	2	1	0
	55-59 ans	10	7	3	2	2	5	1
	60-64 ans	15	14	1	6	0	8	1
	65-69 ans	11	8	3	5	0	3	3
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>8</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	1	4	1	2	0	2
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	7	6	1	3	0	3	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	43	25	18	19	13	6	5
	55-59 ans	51	37	14	12	6	25	8
	60-64 ans	101	72	29	24	3	48	26
	65-69 ans	115	65	50	18	9	47	41
	70-74 ans	66	51	15	12	1	39	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>376</b>	<b>250</b>	<b>126</b>	<b>85</b>	<b>32</b>	<b>165</b>	<b>94</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	110	75	35	58	31	17	4
	55-59 ans	81	53	28	25	10	28	18
	60-64 ans	89	65	24	26	10	39	14
	65-69 ans	96	55	41	14	13	41	28
	70-74 ans	59	35	24	11	3	24	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>435</b>	<b>283</b>	<b>152</b>	<b>134</b>	<b>67</b>	<b>149</b>	<b>85</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

9/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,5	9,2	7,9	10,0	8,4	7,3	6,8
	55-59 ans	8,9	9,5	8,4	10,4	10,3	9,2	7,9
	60-64 ans	8,1	8,3	8,0	9,7	9,6	8,0	7,6
	65-69 ans	8,2	8,1	8,3	10,5	10,7	7,7	8,0
	70-74 ans	8,8	7,9	9,5	9,6	12,3	7,7	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>8,7</b>	<b>8,3</b>	<b>10,0</b>	<b>9,3</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,8	2,2	3,2	2,6	1,7	1,4
	55-59 ans	2,3	2,5	2,0	3,6	3,7	2,2	1,5
	60-64 ans	1,9	1,9	1,9	2,6	3,6	1,7	1,6
	65-69 ans	1,9	1,7	2,0	2,9	4,1	1,5	1,7
	70-74 ans	2,2	1,9	2,5	3,5	4,5	1,7	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,0	70,0	72,0	67,8	68,7	77,3	80,0
	55-59 ans	74,6	73,1	76,0	65,5	64,1	75,9	80,3
	60-64 ans	76,3	77,1	75,6	72,8	63,0	78,4	78,6
	65-69 ans	77,1	78,7	75,8	71,9	61,7	80,5	78,4
	70-74 ans	74,6	75,6	73,9	63,5	63,4	77,6	75,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,6</b>	<b>74,5</b>	<b>74,7</b>	<b>68,3</b>	<b>66,0</b>	<b>78,0</b>	<b>78,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,9	4,6	3,2	4,8	3,3	4,2	3,0
	55-59 ans	4,4	5,8	3,1	6,8	3,6	5,5	3,0
	60-64 ans	5,4	7,3	4,0	8,3	4,9	7,0	3,8
	65-69 ans	6,1	7,7	4,8	9,4	6,4	7,4	4,6
	70-74 ans	6,8	8,9	5,0	11,1	5,8	8,7	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>6,6</b>	<b>3,9</b>	<b>6,3</b>	<b>4,0</b>	<b>6,7</b>	<b>3,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,1</b>	<b>6,5</b>	<b>3,9</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,1	98,2	98,0	98,9	98,1	96,3	97,9
	55-59 ans	98,0	98,3	97,5	99,4	96,9	97,8	97,7
	60-64 ans	97,3	97,1	97,7	98,9	98,1	96,6	97,7
	65-69 ans	97,4	97,0	97,9	96,1	97,0	97,2	98,1
	70-74 ans	95,3	95,3	95,3	96,4	97,8	95,1	95,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,3</b>	<b>97,2</b>	<b>97,4</b>	<b>98,3</b>	<b>97,7</b>	<b>96,7</b>	<b>97,3</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,3	84,8	88,3	83,9	85,8	87,3	93,6
	55-59 ans	87,5	86,4	89,3	80,9	87,4	88,6	89,9
	60-64 ans	88,1	87,2	89,6	80,0	82,2	89,3	91,3
	65-69 ans	88,5	88,1	89,0	84,6	84,5	88,9	89,9
	70-74 ans	90,7	91,1	89,9	82,5	93,2	92,6	89,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,2</b>	<b>87,5</b>	<b>89,2</b>	<b>82,7</b>	<b>85,8</b>	<b>89,6</b>	<b>90,5</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,7	99,0	95,9	98,6	95,8	100,0	96,2
	55-59 ans	98,5	98,5	98,6	97,1	97,6	99,0	98,9
	60-64 ans	97,1	97,8	96,1	96,4	98,8	98,1	95,5
	65-69 ans	97,4	97,3	97,5	94,4	96,3	98,0	97,7
	70-74 ans	96,2	95,7	97,0	93,9	97,6	96,0	96,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,4</b>	<b>97,7</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>	<b>96,7</b>	<b>97,9</b>	<b>97,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	94	87	94	91	95	77
	55-59 ans	92	92	94	114	90	84	95
	60-64 ans	87	90	81	95	83	89	81
	65-69 ans	83	82	85	78	89	83	84
	70-74 ans	84	86	82	85	64	86	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>94</b>	<b>88</b>	<b>86</b>	<b>85</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72 (48-103)	72 (49-106)	72 (48-99)	71 (48-104)	72 (48-102)	75 (53-107)	69 (47-94,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	72 (49-105,5)	72 (50-102)	72 (48-113)	74 (48,5-127)	68 (46-102)	71 (51-100)	73 (48-114)
	60-64 ans	65 (48-99)	67 (48-103)	63 (47-96)	68,5 (47-103,5)	62 (48-99)	67 (49-103)	63,5 (46-96)
	65-69 ans	66 (47-95)	66,5 (47,5-94)	66 (47-96)	64,5 (47-92)	62 (42-94)	67 (48-94)	67 (47-96)
	70-74 ans	68 (48-96)	68,5 (48-97)	68 (49-96)	69,5 (47-97)	59 (41-75)	68 (48-97)	70 (49-96)
	<b>50-74 ans</b>	<b>68 (48-99)</b>	<b>69 (48-100)</b>	<b>68 (47-98)</b>	<b>69 (48-103)</b>	<b>67 (46,5-99,5)</b>	<b>68 (49-98)</b>	<b>68 (48-97)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,4	12,4	7,7	13,2	10,1	10,4	2,8
	55-59 ans	7,9	8,4	7,0	14,4	10,2	6,1	5,9
	60-64 ans	6,8	8,2	4,5	14,7	9,7	6,4	3,3
	65-69 ans	6,5	6,6	6,5	9,0	13,0	6,0	5,2
	70-74 ans	6,2	6,2	6,2	13,3	6,7	4,9	6,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>13,0</b>	<b>10,2</b>	<b>6,2</b>	<b>4,9</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,1	99,4	96,4	99,2	96,5	100,0	96,2
	55-59 ans	99,4	99,3	99,7	98,6	98,8	99,5	100,0
	60-64 ans	98,7	99,4	97,6	99,3	100,0	99,4	97,1
	65-69 ans	99,0	99,2	98,7	98,4	97,6	99,3	98,9
	70-74 ans	98,2	98,2	98,2	97,0	100,0	98,4	97,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>99,1</b>	<b>98,1</b>	<b>98,8</b>	<b>97,8</b>	<b>99,2</b>	<b>98,2</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,2	37,0	53,5	37,1	51,4	37,0	57,6
	55-59 ans	38,6	30,6	51,0	25,7	47,0	32,3	52,3
	60-64 ans	33,5	25,6	44,8	19,1	38,1	27,3	46,3
	65-69 ans	33,7	27,3	42,0	27,3	36,1	27,3	43,0
	70-74 ans	34,6	28,6	43,5	19,1	48,8	30,1	42,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>36,5</b>	<b>29,4</b>	<b>46,5</b>	<b>29,3</b>	<b>46,2</b>	<b>29,5</b>	<b>46,6</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,0	6,5	5,4	5,4	6,2	9,4	3,8
	55-59 ans	5,1	5,6	4,3	2,9	3,6	6,6	4,5
	60-64 ans	5,5	4,8	6,5	2,1	11,9	5,5	5,3
	65-69 ans	4,2	3,8	4,8	3,1	3,6	3,9	5,1
	70-74 ans	3,6	3,4	3,9	7,4	4,9	2,8	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>4,3</b>	<b>6,2</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,8	0,5	1,1	0,4	0,0	0,8
	55-59 ans	0,6	0,7	0,3	0,7	0,0	0,8	0,4
	60-64 ans	0,4	0,3	0,4	0,7	0,0	0,2	0,5

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

12/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,4	0,6	0,2	0,8	0,0	0,5	0,2
	70-74 ans	0,5	0,6	0,3	1,5	0,0	0,5	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,5	17,2	13,3	16,6	12,7	18,8	14,4
	55-59 ans	19,5	20,0	18,9	22,1	22,9	19,2	17,7
	60-64 ans	19,5	21,1	17,2	19,1	13,1	21,6	18,2
	65-69 ans	18,2	20,1	15,8	17,2	18,1	20,8	15,4
	70-74 ans	20,1	22,0	17,3	20,6	14,6	22,2	17,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,6</b>	<b>20,1</b>	<b>16,4</b>	<b>18,4</b>	<b>15,3</b>	<b>20,9</b>	<b>16,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,6	30,1	19,7	31,3	22,0	26,8	15,2
	55-59 ans	27,6	32,3	20,3	35,7	18,1	31,1	21,1
	60-64 ans	29,7	34,8	22,2	39,0	29,8	33,7	20,5
	65-69 ans	30,4	35,0	24,6	31,3	26,5	35,8	24,3
	70-74 ans	29,8	31,2	27,7	29,4	26,8	31,5	27,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,8</b>	<b>33,0</b>	<b>22,9</b>	<b>33,2</b>	<b>23,6</b>	<b>32,9</b>	<b>22,7</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,5	5,7	5,1	6,0	5,4	5,1	4,5
	55-59 ans	6,6	8,0	4,3	10,7	7,2	7,1	3,4
	60-64 ans	9,9	12,0	6,9	19,1	4,8	10,0	7,4
	65-69 ans	10,4	10,8	9,9	16,4	13,3	9,5	9,3
	70-74 ans	9,0	11,4	5,4	17,6	4,9	10,4	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>9,8</b>	<b>6,7</b>	<b>11,5</b>	<b>6,7</b>	<b>9,1</b>	<b>6,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	1,4	0,8	1,4	0,4	1,4	1,5
	55-59 ans	1,0	1,5	0,3	0,0	0,0	2,0	0,4
	60-64 ans	1,1	1,0	1,1	0,7	1,2	1,1	1,1
	65-69 ans	1,3	1,0	1,6	2,3	1,2	0,7	1,7
	70-74 ans	0,7	0,8	0,6	1,5	0,0	0,7	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	0,8	0,3	0,5	0,4	1,4	0,0
	55-59 ans	0,5	0,4	0,6	0,7	1,2	0,3	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,4	0,3	0,4	0,0	1,2	0,4	0,3
	65-69 ans	1,1	1,3	0,9	1,6	1,2	1,2	0,8
	70-74 ans	1,1	1,0	1,2	1,5	0,0	0,9	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,2	1,0	0,3	0,8	0,0	1,5
	55-59 ans	0,3	0,6	0,0	0,7	0,0	0,5	0,0
	60-64 ans	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
	65-69 ans	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
	70-74 ans	0,4	0,6	0,0	1,5	0,0	0,5	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,5	18,3	9,1	19,2	9,6	16,1	8,0
	55-59 ans	17,7	26,0	10,8	31,8	12,6	24,1	10,3
	60-64 ans	23,0	34,5	13,7	38,4	17,3	33,6	13,1
	65-69 ans	25,9	36,6	17,1	37,6	23,7	36,4	16,2
	70-74 ans	29,6	41,8	19,6	45,5	21,8	41,3	19,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,0</b>	<b>30,0</b>	<b>13,5</b>	<b>26,8</b>	<b>13,0</b>	<b>31,4</b>	<b>13,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>21,1</b>	<b>29,6</b>	<b>13,3</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	11,6	5,4	12,6	6,1	9,4	4,1
	55-59 ans	10,4	16,0	5,6	19,6	5,5	14,9	5,6
	60-64 ans	13,9	21,5	7,7	25,7	12,0	20,5	6,9
	65-69 ans	16,2	23,2	10,4	24,2	14,1	23,0	9,9
	70-74 ans	17,7	24,5	12,1	26,8	14,1	24,2	11,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,8</b>	<b>18,6</b>	<b>7,9</b>	<b>17,2</b>	<b>7,9</b>	<b>19,2</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,8</b>	<b>18,3</b>	<b>7,7</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	9,6	4,8	10,3	5,7	7,9	3,1
	55-59 ans	8,3	13,0	4,3	16,1	4,1	12,0	4,4
	60-64 ans	11,5	17,6	6,4	21,0	9,1	16,8	6,0
	65-69 ans	12,9	18,1	8,7	20,0	11,5	17,7	8,3
	70-74 ans	13,5	18,9	9,1	21,4	12,8	18,5	8,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>14,9</b>	<b>6,4</b>	<b>14,1</b>	<b>6,7</b>	<b>15,2</b>	<b>6,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,3</b>	<b>14,7</b>	<b>6,3</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	11,2	5,5	11,7	6,5	10,0	3,7
	55-59 ans	9,8	15,6	4,9	19,6	5,5	14,3	4,8
	60-64 ans	14,1	21,5	8,1	25,3	12,0	20,6	7,4
	65-69 ans	16,0	23,2	10,0	25,4	12,8	22,8	9,7
	70-74 ans	17,7	24,9	11,8	24,1	12,8	25,0	11,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,6</b>	<b>18,4</b>	<b>7,7</b>	<b>16,7</b>	<b>7,9</b>	<b>19,2</b>	<b>7,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,6</b>	<b>18,1</b>	<b>7,6</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,2	1,4	2,4	1,5	1,8	1,2
	55-59 ans	2,5	4,0	1,2	5,9	2,2	3,4	0,9
	60-64 ans	4,6	7,4	2,4	12,6	1,9	6,1	2,5
	65-69 ans	5,6	7,2	4,2	13,3	7,0	6,1	3,8
	70-74 ans	5,3	9,0	2,3	16,1	2,6	8,0	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>5,5</b>	<b>2,3</b>	<b>6,0</b>	<b>2,2</b>	<b>5,3</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>5,4</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	8,5	3,7	15,0	4,8	14,3	0,0	16,7
	55-59 ans	8,9	9,8	6,7	14,3	0,0	7,4	11,1
	60-64 ans	6,8	9,5	0,0	8,0	0,0	10,2	0,0
	65-69 ans	7,4	9,9	4,0	5,0	11,1	11,8	2,4
	70-74 ans	8,5	9,3	5,9	0,0	0,0	11,9	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>9,0</b>	<b>5,3</b>	<b>6,5</b>	<b>9,1</b>	<b>10,3</b>	<b>4,1</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)