

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 75 - Paris

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	29 385	14 843	14 542	11 724	11 360	3 119	3 182
	55-59 ans	22 336	10 375	11 961	4 284	4 759	6 091	7 202
	60-64 ans	20 855	9 132	11 723	3 559	4 090	5 573	7 633
	65-69 ans	21 483	9 148	12 335	3 051	3 840	6 097	8 495
	70-74 ans	16 078	6 888	9 190	2 075	2 434	4 813	6 756
	50-74 ans	110 137	50 386	59 751	24 693	26 483	25 693	33 268
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 761	1 461	1 300	1 230	1 040	231	260
	55-59 ans	2 168	1 061	1 107	460	483	601	624
	60-64 ans	2 000	901	1 099	370	380	531	719
	65-69 ans	1 933	853	1 080	321	354	532	726
	70-74 ans	1 686	757	929	252	243	505	686
	50-74 ans	10 548	5 033	5 515	2 633	2 500	2 400	3 015
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 219	1 179	1 040	973	808	206	232
	55-59 ans	1 758	859	899	343	363	516	536
	60-64 ans	1 624	717	907	260	297	457	610
	65-69 ans	1 580	687	893	246	270	441	623
	70-74 ans	1 293	587	706	178	170	409	536
	50-74 ans	8 474	4 029	4 445	2 000	1 908	2 029	2 537
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	542	282	260	257	232	25	28
	55-59 ans	410	202	208	117	120	85	88
	60-64 ans	376	184	192	110	83	74	109
	65-69 ans	353	166	187	75	84	91	103
	70-74 ans	393	170	223	74	73	96	150
	50-74 ans	2 074	1 004	1 070	633	592	371	478
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	28 843	14 561	14 282	11 467	11 128	3 094	3 154
	55-59 ans	21 926	10 173	11 753	4 167	4 639	6 006	7 114
	60-64 ans	20 479	8 948	11 531	3 449	4 007	5 499	7 524
	65-69 ans	21 130	8 982	12 148	2 976	3 756	6 006	8 392
	70-74 ans	15 685	6 718	8 967	2 001	2 361	4 717	6 606
	50-74 ans	108 063	49 382	58 681	24 060	25 891	25 322	32 790
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	937	507	430	415	331	92	99
	55-59 ans	820	453	367	196	153	257	214
	60-64 ans	897	457	440	184	171	273	269
	65-69 ans	1 114	558	556	178	191	380	365

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 75 - Paris

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	909	473	436	159	110	314	326
	50-74 ans	4 677	2 448	2 229	1 132	956	1 316	1 273
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	935	506	429	414	330	92	99
	55-59 ans	818	451	367	196	153	255	214
	60-64 ans	896	456	440	184	171	272	269
	65-69 ans	1 114	558	556	178	191	380	365
	70-74 ans	909	473	436	159	110	314	326
	50-74 ans	4 672	2 444	2 228	1 131	955	1 313	1 273
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	647	345	302	274	224	71	78
	55-59 ans	607	327	280	129	102	198	178
	60-64 ans	665	334	331	112	121	222	210
	65-69 ans	831	405	426	114	129	291	297
	70-74 ans	701	364	337	99	76	265	261
	50-74 ans	3 451	1 775	1 676	728	652	1 047	1 024
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	541	288	253	226	185	62	68
	55-59 ans	501	262	239	102	84	160	155
	60-64 ans	528	262	266	95	94	167	172
	65-69 ans	671	314	357	96	109	218	248
	70-74 ans	549	277	272	77	61	200	211
	50-74 ans	2 790	1 403	1 387	596	533	807	854
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 75 - Paris

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	640	343	297	273	222	70	75
	55-59 ans	601	324	277	129	101	195	176
	60-64 ans	658	331	327	112	118	219	209
	65-69 ans	825	402	423	112	129	290	294
	70-74 ans	687	355	332	99	76	256	256
	50-74 ans	3 411	1 755	1 656	725	646	1 030	1 010
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	7	2	5	1	2	1	3
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	7	3	4	0	3	3	1
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3
	70-74 ans	14	9	5	0	0	9	5
	50-74 ans	40	20	20	3	6	17	14
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	615	327	288	257	213	70	75
	55-59 ans	588	318	270	126	98	192	172
	60-64 ans	638	319	319	109	115	210	204
	65-69 ans	804	388	416	110	127	278	289
	70-74 ans	670	347	323	94	75	253	248
	50-74 ans	3 315	1 699	1 616	696	628	1 003	988
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	648	346	302	275	224	71	78
	55-59 ans	608	328	280	130	102	198	178
	60-64 ans	665	334	331	112	121	222	210
	65-69 ans	832	405	427	114	130	291	297
	70-74 ans	702	364	338	99	76	265	262
	50-74 ans	3 455	1 777	1 678	730	653	1 047	1 025
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	290	130	160	98	117	32	43
	55-59 ans	220	95	125	38	49	57	76

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 75 - Paris

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	230	89	141	34	54	55	87
	65-69 ans	283	109	174	37	59	72	115
	70-74 ans	208	87	121	20	24	67	97
	50-74 ans	1 231	510	721	227	303	283	418
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	22	11	11	9	7	2	4
	55-59 ans	26	13	13	6	5	7	8
	60-64 ans	17	9	8	2	4	7	4
	65-69 ans	25	12	13	3	1	9	12
	70-74 ans	20	6	14	1	4	5	10
	50-74 ans	110	51	59	21	21	30	38
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	7	4	3	4	1	0	2
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	16	10	6	8	2	2	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	81	48	33	38	25	10	8
	55-59 ans	82	54	28	19	10	35	18
	60-64 ans	97	48	49	19	21	29	28
	65-69 ans	136	74	62	21	15	53	47
	70-74 ans	128	79	49	19	13	60	36
	50-74 ans	524	303	221	116	84	187	137
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	153	97	56	81	41	16	15
	55-59 ans	160	98	62	39	18	59	44
	60-64 ans	196	116	80	35	26	81	54
	65-69 ans	230	129	101	33	30	96	71
	70-74 ans	204	110	94	32	22	78	72
	50-74 ans	943	550	393	220	137	330	256
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	25	15	10	11	9	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	44	29	15	10	7	19	8
	60-64 ans	45	25	20	7	6	18	14
	65-69 ans	70	41	29	11	11	30	18
	70-74 ans	68	36	32	12	11	24	21
	50-74 ans	252	146	106	51	44	95	62
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	27	21	6	15	5	6	1
	55-59 ans	40	23	17	10	4	13	13
	60-64 ans	34	22	12	7	3	15	9
	65-69 ans	46	19	27	4	6	15	21
	70-74 ans	40	26	14	7	1	19	13
	50-74 ans	187	111	76	43	19	68	57
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	28	17	11	17	8	0	3
	55-59 ans	22	10	12	4	5	6	7
	60-64 ans	26	15	11	4	5	11	6
	65-69 ans	20	12	8	0	2	12	6
	70-74 ans	23	11	12	6	1	5	11
	50-74 ans	119	65	54	31	21	34	33
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	234	145	89	119	66	26	23
	55-59 ans	242	152	90	58	28	94	62
	60-64 ans	293	164	129	54	47	110	82
	65-69 ans	366	203	163	54	45	149	118
	70-74 ans	332	189	143	51	35	138	108
	50-74 ans	1 467	853	614	336	221	517	393

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 75 - Paris

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	153	97	56	81	41	16	15
	55-59 ans	160	98	62	39	18	59	44
	60-64 ans	196	116	80	35	26	81	54
	65-69 ans	230	129	101	33	30	96	71
	70-74 ans	204	110	94	32	22	78	72
	50-74 ans	943	550	393	220	137	330	256
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	129	82	47	70	34	12	13
	55-59 ans	142	85	57	34	17	51	40
	60-64 ans	166	94	72	28	24	66	48
	65-69 ans	187	103	84	27	26	76	58
	70-74 ans	163	89	74	25	18	64	56
	50-74 ans	787	453	334	184	119	269	215
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	137	88	49	75	35	13	14
	55-59 ans	164	103	61	41	19	62	42
	60-64 ans	192	114	78	34	27	80	51
	65-69 ans	231	137	94	36	30	101	64
	70-74 ans	204	114	90	30	24	84	66
	50-74 ans	928	556	372	216	135	340	237
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	25	15	10	11	9	4	1
	55-59 ans	44	29	15	10	7	19	8
	60-64 ans	45	25	20	7	6	18	14
	65-69 ans	70	41	29	11	11	30	18
	70-74 ans	68	36	32	12	11	24	21
	50-74 ans	252	146	106	51	44	95	62
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	25	15	10	11	9	4	1
	55-59 ans	44	29	15	10	7	19	8
	60-64 ans	45	25	20	7	6	18	14
	65-69 ans	70	41	29	11	11	30	18
	70-74 ans	68	36	32	12	11	24	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 75 - Paris

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	252	146	106	51	44	95	62
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	23	13	10	11	9	2	1
	55-59 ans	41	27	14	9	7	18	7
	60-64 ans	41	23	18	7	6	16	12
	65-69 ans	61	37	24	11	8	26	16
	70-74 ans	64	34	30	11	10	23	20
	50-74 ans	230	134	96	49	40	85	56
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	9	4	5	0	3	4	2
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	22	12	10	2	4	10	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	8	5	3	1	2	4	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	8	4	4	0	2	4	2
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	15	8	7	1	2	7	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	6	1	3	1	3	0
	55-59 ans	8	5	3	3	1	2	2
	60-64 ans	11	7	4	2	0	5	4
	65-69 ans	17	10	7	1	4	9	3
	70-74 ans	13	7	6	4	2	3	4
	50-74 ans	56	35	21	13	8	22	13
A40- Perdus de vue	50-54 ans	193	106	87	90	73	16	14
	55-59 ans	148	87	61	48	32	39	29
	60-64 ans	153	84	69	45	28	39	41
	65-69 ans	195	104	91	41	39	63	52
	70-74 ans	143	75	68	37	22	38	46
	50-74 ans	832	456	376	261	194	195	182

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 75 - Paris

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,4	9,8	8,9	10,5	9,2	7,4	8,2
	55-59 ans	9,7	10,2	9,3	10,7	10,1	9,9	8,7
	60-64 ans	9,6	9,9	9,4	10,4	9,3	9,5	9,4
	65-69 ans	9,0	9,3	8,8	10,5	9,2	8,7	8,5
	70-74 ans	10,5	11,0	10,1	12,1	10,0	10,5	10,2
	50-74 ans	9,6	10,0	9,2	10,7	9,4	9,3	9,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,9	1,8	2,2	2,0	0,8	0,9
	55-59 ans	1,8	1,9	1,7	2,7	2,5	1,4	1,2
	60-64 ans	1,8	2,0	1,6	3,1	2,0	1,3	1,4
	65-69 ans	1,6	1,8	1,5	2,5	2,2	1,5	1,2
	70-74 ans	2,4	2,5	2,4	3,6	3,0	2,0	2,2
	50-74 ans	1,9	2,0	1,8	2,6	2,2	1,4	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	80,4	80,7	80,0	79,1	77,7	89,2	89,2
	55-59 ans	81,1	81,0	81,2	74,6	75,2	85,9	85,9
	60-64 ans	81,2	79,6	82,5	70,3	78,2	86,1	84,8
	65-69 ans	81,7	80,5	82,7	76,6	76,3	82,9	85,8
	70-74 ans	76,7	77,5	76,0	70,6	70,0	81,0	78,1
	50-74 ans	80,3	80,1	80,6	76,0	76,3	84,5	84,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,5	3,0	3,6	3,0	3,0	3,1
	55-59 ans	3,7	4,5	3,1	4,7	3,3	4,3	3,0
	60-64 ans	4,4	5,1	3,8	5,3	4,3	5,0	3,6
	65-69 ans	5,3	6,2	4,6	6,0	5,1	6,3	4,3
	70-74 ans	5,8	7,0	4,9	7,9	4,7	6,7	4,9
	50-74 ans	4,3	5,0	3,8	4,7	3,7	5,2	3,9
50-74 ans **	4,3	5,0	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	99,8	99,8	99,8	99,7	100,0	100,0
	55-59 ans	99,8	99,6	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0
	60-64 ans	99,9	99,8	100,0	100,0	100,0	99,6	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,9	99,8	100,0	99,9	99,9	99,8	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 75 - Paris

10/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	69,2	68,2	70,4	66,2	67,9	77,2	78,8
	55-59 ans	74,2	72,5	76,3	65,8	66,7	77,6	83,2
	60-64 ans	74,2	73,2	75,2	60,9	70,8	81,6	78,1
	65-69 ans	74,6	72,6	76,6	64,0	67,5	76,6	81,4
	70-74 ans	77,1	77,0	77,3	62,3	69,1	84,4	80,1
	50-74 ans	73,9	72,6	75,2	64,4	68,3	79,7	80,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	83,6	83,5	83,8	82,5	82,6	87,3	87,2
	55-59 ans	82,5	80,1	85,4	79,1	82,4	80,8	87,1
	60-64 ans	79,4	78,4	80,4	84,8	77,7	75,2	81,9
	65-69 ans	80,7	77,5	83,8	84,2	84,5	74,9	83,5
	70-74 ans	78,3	76,1	80,7	77,8	80,3	75,5	80,8
	50-74 ans	80,8	79,0	82,8	81,9	81,7	77,1	83,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	80	84	79	88	82	76
	55-59 ans	81	82	80	83	70	82	86
	60-64 ans	80	82	77	73	83	86	74
	65-69 ans	80	83	77	94	80	80	76
	70-74 ans	84	86	81	88	78	85	82
	50-74 ans	81	83	80	82	81	83	79
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61 (41-96)	57 (39-91)	66 (42-99)	58 (40-90)	68 (45-101)	57 (37,5-102)	61,5 (35-93,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	61 (39-93)	61 (39-98)	60 (38-85)	60 (36-100)	55 (36-84)	61,5 (41-97)	61,5 (41,5-86)
	60-64 ans	60,5 (39-88)	62 (41,5-88)	58 (36-89)	62,5 (40,5-81,5)	60 (35-98)	62 (42-92)	57,5 (38,5-83,5)
	65-69 ans	61 (39-96)	63,5 (40-99)	56 (37-88)	69,5 (47-109)	56 (38-93)	61 (39-98,5)	56 (37-86)
	70-74 ans	62 (39,5-102)	66 (40-105)	57 (38-92,5)	73,5 (41-115,5)	59 (44-94,5)	64 (40-103)	55 (37-87,5)
	50-74 ans	61 (39-94)	62 (40-97)	59 (38-90)	62,5 (40-96,5)	62 (39-96)	62 (40-98)	58 (37-86)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	20,6	20,9	20,2	21,7	22,1	17,4	14,1
	55-59 ans	18,0	19,2	16,6	24,5	20,9	15,2	13,6
	60-64 ans	17,1	18,4	15,7	24,5	16,4	14,3	15,2
	65-69 ans	17,5	18,6	16,4	23,0	20,4	16,6	14,2
	70-74 ans	15,7	15,9	15,6	23,3	20,0	12,1	14,1
	50-74 ans	17,8	18,6	16,9	23,1	20,3	14,8	14,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,1	94,8	95,4	93,8	95,1	98,6	96,2
	55-59 ans	96,9	97,2	96,4	97,7	96,1	97,0	96,6
	60-64 ans	95,9	95,5	96,4	97,3	95,0	94,6	97,1
	65-69 ans	96,8	95,8	97,7	96,5	98,4	95,5	97,3
	70-74 ans	95,6	95,3	95,8	94,9	98,7	95,5	95,0
	50-74 ans	96,1	95,7	96,4	95,6	96,3	95,8	96,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,8	37,6	53,0	35,6	52,2	45,1	55,1
	55-59 ans	36,2	29,0	44,6	29,2	48,0	28,8	42,7
	60-64 ans	34,6	26,6	42,6	30,4	44,6	24,8	41,4
	65-69 ans	34,0	26,9	40,7	32,5	45,4	24,7	38,7
	70-74 ans	29,6	23,9	35,8	20,2	31,6	25,3	37,0
	50-74 ans	35,6	28,7	43,0	31,1	46,4	27,0	40,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	3,2	3,6	3,3	3,1	2,8	5,1
	55-59 ans	4,3	4,0	4,6	4,6	4,9	3,5	4,5
	60-64 ans	2,6	2,7	2,4	1,8	3,3	3,2	1,9
	65-69 ans	3,0	3,0	3,0	2,6	0,8	3,1	4,0
	70-74 ans	2,8	1,6	4,1	1,0	5,3	1,9	3,8
	50-74 ans	3,2	2,9	3,5	2,9	3,2	2,9	3,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	1,2	1,0	1,5	0,4	0,0	2,6
	55-59 ans	0,3	0,3	0,4	0,8	1,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,3	0,3	0,9	0,0	0,0	0,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	65-69 ans	0,4	0,5	0,2	0,9	0,0	0,3	0,3
	70-74 ans	0,3	0,5	0,0	1,0	0,0	0,4	0,0
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	1,1	0,3	0,2	0,4
	50-54 ans	12,5	13,9	10,9	13,8	11,2	14,1	10,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	55-59 ans	13,5	16,5	10,0	14,6	9,8	17,7	10,1
	60-64 ans	14,6	14,4	14,8	17,0	17,4	13,1	13,3
	65-69 ans	16,3	18,3	14,5	18,4	11,5	18,2	15,8
	70-74 ans	18,2	21,7	14,5	19,2	17,1	22,6	13,7
	50-74 ans	15,2	17,1	13,2	15,9	12,9	17,9	13,4
	50-54 ans	23,6	28,0	18,5	29,5	18,3	22,5	19,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	55-59 ans	26,3	29,9	22,1	30,0	17,6	29,8	24,7
	60-64 ans	29,5	34,7	24,2	31,3	21,5	36,5	25,7
	65-69 ans	27,6	31,9	23,7	28,9	23,1	33,0	23,9
	70-74 ans	29,1	30,2	27,8	32,3	28,9	29,4	27,5
	50-74 ans	27,3	31,0	23,4	30,1	21,0	31,5	25,0
	50-54 ans	3,9	4,3	3,3	4,0	4,0	5,6	1,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	55-59 ans	7,2	8,8	5,4	7,7	6,9	9,6	4,5
	60-64 ans	6,8	7,5	6,0	6,3	5,0	8,1	6,7
	65-69 ans	8,4	10,1	6,8	9,6	8,5	10,3	6,1
	70-74 ans	9,7	9,9	9,5	12,1	14,5	9,1	8,0
	50-74 ans	7,3	8,2	6,3	7,0	6,7	9,1	6,0
	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-54 ans	4,2	6,1	2,0	5,5	2,2	8,5	1,3
	55-59 ans	6,6	7,0	6,1	7,7	3,9	6,6	7,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5,1	6,6	3,6	6,3	2,5	6,8	4,3
	65-69 ans	5,5	4,7	6,3	3,5	4,6	5,2	7,1
	70-74 ans	5,7	7,1	4,1	7,1	1,3	7,2	5,0
	50-74 ans	5,4	6,2	4,5	5,9	2,9	6,5	5,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,3	4,9	3,6	6,2	3,6	0,0	3,8
	55-59 ans	3,6	3,0	4,3	3,1	4,9	3,0	3,9
	60-64 ans	3,9	4,5	3,3	3,6	4,1	5,0	2,9
	65-69 ans	2,4	3,0	1,9	0,0	1,5	4,1	2,0
	70-74 ans	3,3	3,0	3,6	6,1	1,3	1,9	4,2
	50-74 ans	3,4	3,7	3,2	4,2	3,2	3,2	3,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	10,0	6,2	10,4	5,9	8,4	7,3
	55-59 ans	11,0	14,9	7,7	13,9	6,0	15,7	8,7
	60-64 ans	14,3	18,3	11,2	15,7	11,7	20,0	10,9
	65-69 ans	17,3	22,6	13,4	18,1	12,0	24,8	14,1
	70-74 ans	21,2	28,1	15,9	25,5	14,8	29,3	16,3
	50-74 ans	13,6	17,3	10,5	14,0	8,5	20,4	12,0
	50-74 ans **	13,6	17,3	10,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	6,7	3,9	7,1	3,7	5,2	4,8
	55-59 ans	7,3	9,6	5,3	9,4	3,9	9,8	6,2
	60-64 ans	9,6	13,0	6,9	10,1	6,5	14,7	7,2
	65-69 ans	10,9	14,4	8,3	11,1	8,0	16,0	8,5
	70-74 ans	13,0	16,4	10,5	16,0	9,3	16,5	10,9
	50-74 ans	8,7	11,1	6,7	9,1	5,3	13,0	7,8
	50-74 ans **	8,8	11,2	6,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	5,6	3,3	6,1	3,1	3,9	4,1
	55-59 ans	6,5	8,4	4,8	8,2	3,7	8,5	5,6
	60-64 ans	8,1	10,5	6,2	8,1	6,0	12,0	6,4
	65-69 ans	8,8	11,5	6,9	9,1	6,9	12,7	6,9
	70-74 ans	10,4	13,2	8,3	12,5	7,6	13,6	8,5
	50-74 ans	7,3	9,2	5,7	7,6	4,6	10,6	6,6
	50-74 ans **	7,3	9,2	5,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	6,0	3,4	6,5	3,1	4,2	4,4
	55-59 ans	7,5	10,1	5,2	9,8	4,1	10,3	5,9
	60-64 ans	9,4	12,7	6,8	9,9	6,7	14,5	6,8
	65-69 ans	10,9	15,3	7,7	12,1	8,0	16,8	7,6
	70-74 ans	13,0	17,0	10,0	15,0	10,2	17,8	10,0
	50-74 ans	8,6	11,3	6,3	9,0	5,2	13,4	7,2
	50-74 ans **	8,7	11,3	6,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,0	0,7	1,0	0,8	1,3	0,3
	55-59 ans	2,0	2,9	1,3	2,4	1,5	3,2	1,1
	60-64 ans	2,2	2,8	1,7	2,0	1,5	3,3	1,9
	65-69 ans	3,3	4,6	2,4	3,7	2,9	5,0	2,1
	70-74 ans	4,3	5,4	3,6	6,0	4,7	5,1	3,2
	50-74 ans	2,3	3,0	1,8	2,1	1,7	3,8	1,9
	50-74 ans **	2,3	3,0	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	92,0	86,7	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0
	55-59 ans	93,2	93,1	93,3	90,0	100,0	94,7	87,5
	60-64 ans	91,1	92,0	90,0	100,0	100,0	88,9	85,7
	65-69 ans	87,1	90,2	82,8	100,0	72,7	86,7	88,9
	70-74 ans	94,1	94,4	93,8	91,7	90,9	95,8	95,2
	50-74 ans	91,3	91,8	90,6	96,1	90,9	89,5	90,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)