

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/6

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10 210	3 624	6 586	2 855	5 108	769	1 478
	55-59 ans	9 444	3 605	5 839	1 325	1 548	2 280	4 291
	60-64 ans	8 746	3 211	5 535	1 010	1 094	2 201	4 441
	65-69 ans	7 789	2 998	4 791	854	873	2 144	3 918
	70-74 ans	5 762	2 209	3 553	555	506	1 654	3 047
	50-74 ans	41 951	15 647	26 304	6 599	9 129	9 048	17 175
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 490	581	909	489	776	92	133
	55-59 ans	1 477	628	849	242	262	386	587
	60-64 ans	1 326	516	810	182	204	334	606
	65-69 ans	1 083	424	659	128	140	296	519
	70-74 ans	974	374	600	110	100	264	500
	50-74 ans	6 350	2 523	3 827	1 151	1 482	1 372	2 345
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	692	265	427	214	363	51	64
	55-59 ans	727	294	433	88	115	206	318
	60-64 ans	662	252	410	70	93	182	317
	65-69 ans	559	186	373	52	58	134	315
	70-74 ans	500	194	306	49	38	145	268
	50-74 ans	3 140	1 191	1 949	473	667	718	1 282
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	798	316	482	275	413	41	69
	55-59 ans	750	334	416	154	147	180	269
	60-64 ans	664	264	400	112	111	152	289
	65-69 ans	524	238	286	76	82	162	204
	70-74 ans	474	180	294	61	62	119	232
	50-74 ans	3 210	1 332	1 878	678	815	654	1 063
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 412	3 308	6 104	2 580	4 695	728	1 409
	55-59 ans	8 694	3 271	5 423	1 171	1 401	2 100	4 022
	60-64 ans	8 082	2 947	5 135	898	983	2 049	4 152
	65-69 ans	7 265	2 760	4 505	778	791	1 982	3 714

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/6

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5 288	2 029	3 259	494	444	1 535	2 815
	50-74 ans	38 741	14 315	24 426	5 921	8 314	8 394	16 112
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	239	97	142	78	113	19	29
	55-59 ans	271	116	155	50	41	66	114
	60-64 ans	296	118	178	27	41	91	137
	65-69 ans	317	147	170	43	28	104	142
	70-74 ans	288	116	172	25	15	91	157
	50-74 ans	1 411	594	817	223	238	371	579
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	239	97	142	78	113	19	29
	55-59 ans	268	116	152	50	41	66	111
	60-64 ans	292	117	175	27	39	90	136
	65-69 ans	316	146	170	43	28	103	142
	70-74 ans	284	115	169	25	14	90	155
	50-74 ans	1 399	591	808	223	235	368	573
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	200	75	125	60	101	15	24
	55-59 ans	232	101	131	42	34	59	97
	60-64 ans	256	101	155	21	32	80	123
	65-69 ans	280	128	152	38	23	90	129
	70-74 ans	248	102	146	19	12	83	134
	50-74 ans	1 216	507	709	180	202	327	507
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	190	70	120	57	97	13	23
	55-59 ans	213	90	123	36	31	54	92
	60-64 ans	238	95	143	19	30	76	113
	65-69 ans	252	111	141	36	21	75	120
	70-74 ans	220	92	128	16	9	76	119
	50-74 ans	1 113	458	655	164	188	294	467
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/6

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	198	74	124	60	100	14	24
	55-59 ans	232	101	131	42	34	59	97
	60-64 ans	255	101	154	21	32	80	122
	65-69 ans	274	125	149	37	23	88	126
	70-74 ans	242	102	140	19	12	83	128
	50-74 ans	1 201	503	698	179	201	324	497
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	6	0	6	0	0	0	6
	50-74 ans	15	4	11	1	1	3	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	50-74 ans	5	1	4	1	1	0	3

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/6

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/5

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	14,6	16,0	13,8	17,1	15,2	12,0	9,0
	55-59 ans	15,6	17,4	14,5	18,3	16,9	16,9	13,7
	60-64 ans	15,2	16,1	14,6	18,0	18,6	15,2	13,6
	65-69 ans	13,9	14,1	13,8	15,0	16,0	13,8	13,2
	70-74 ans	16,9	16,9	16,9	19,8	19,8	16,0	16,4
	50-74 ans	15,1	16,1	14,5	17,4	16,2	15,2	13,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	7,8	8,7	7,3	9,6	8,1	5,3	4,7
	55-59 ans	7,9	9,3	7,1	11,6	9,5	7,9	6,3
	60-64 ans	7,6	8,2	7,2	11,1	10,1	6,9	6,5
	65-69 ans	6,7	7,9	6,0	8,9	9,4	7,6	5,2
	70-74 ans	8,2	8,1	8,3	11,0	12,3	7,2	7,6
	50-74 ans	7,7	8,5	7,1	10,3	8,9	7,2	6,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	46,4	45,6	47,0	43,8	46,8	55,4	48,1
	55-59 ans	49,2	46,8	51,0	36,4	43,9	53,4	54,2
	60-64 ans	49,9	48,8	50,6	38,5	45,6	54,5	52,3
	65-69 ans	51,6	43,9	56,6	40,6	41,4	45,3	60,7
	70-74 ans	51,3	51,9	51,0	44,5	38,0	54,9	53,6
	50-74 ans	49,4	47,2	50,9	41,1	45,0	52,3	54,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,9	2,3	3,0	2,4	2,6	2,1
	55-59 ans	3,1	3,5	2,9	4,3	2,9	3,1	2,8
	60-64 ans	3,7	4,0	3,5	3,0	4,2	4,4	3,3
	65-69 ans	4,4	5,3	3,8	5,5	3,5	5,2	3,8
	70-74 ans	5,4	5,7	5,3	5,1	3,4	5,9	5,6
	50-74 ans	3,6	4,1	3,3	3,8	2,9	4,4	3,6
50-74 ans **	3,7	4,0	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,9	100,0	98,1	100,0	100,0	100,0	97,4