

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 406	589	817	546	749	43	68
	55-59 ans	1 842	801	1 041	390	461	411	580
	60-64 ans	1 368	611	757	261	259	350	498
	65-69 ans	843	375	468	116	121	259	347
	70-74 ans	422	197	225	48	47	149	178
	50-74 ans	5 881	2 573	3 308	1 361	1 637	1 212	1 671
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	383	159	224	149	210	10	14
	55-59 ans	443	210	233	103	110	107	123
	60-64 ans	347	161	186	78	70	83	116
	65-69 ans	230	97	133	28	39	69	94
	70-74 ans	130	63	67	17	16	46	51
	50-74 ans	1 533	690	843	375	445	315	398
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	169	70	99	67	95	3	4
	55-59 ans	180	85	95	40	40	45	55
	60-64 ans	131	66	65	28	19	38	46
	65-69 ans	89	34	55	11	14	23	41
	70-74 ans	51	24	27	4	4	20	23
	50-74 ans	620	279	341	150	172	129	169
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	214	89	125	82	115	7	10
	55-59 ans	263	125	138	63	70	62	68
	60-64 ans	216	95	121	50	51	45	70
	65-69 ans	141	63	78	17	25	46	53
	70-74 ans	79	39	40	13	12	26	28
	50-74 ans	913	411	502	225	273	186	229
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 192	500	692	464	634	36	58
	55-59 ans	1 579	676	903	327	391	349	512
	60-64 ans	1 152	516	636	211	208	305	428
	65-69 ans	702	312	390	99	96	213	294

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	343	158	185	35	35	123	150
	50-74 ans	4 968	2 162	2 806	1 136	1 364	1 026	1 442
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	36	16	20	14	20	2	0
	55-59 ans	58	23	35	11	16	12	19
	60-64 ans	49	21	28	12	11	9	17
	65-69 ans	35	19	16	8	8	11	8
	70-74 ans	15	9	6	1	1	8	5
	50-74 ans	193	88	105	46	56	42	49
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	36	16	20	14	20	2	0
	55-59 ans	58	23	35	11	16	12	19
	60-64 ans	49	21	28	12	11	9	17
	65-69 ans	35	19	16	8	8	11	8
	70-74 ans	15	9	6	1	1	8	5
	50-74 ans	193	88	105	46	56	42	49
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	16	8	8	6	8	2	0
	55-59 ans	28	15	13	5	6	10	7
	60-64 ans	30	13	17	8	5	5	12
	65-69 ans	15	8	7	3	3	5	4
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	98	48	50	22	23	26	27
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	13	6	7	5	7	1	0
	55-59 ans	19	11	8	4	3	7	5
	60-64 ans	20	8	12	5	4	3	8
	65-69 ans	13	8	5	3	1	5	4
	70-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
	50-74 ans	73	36	37	17	16	19	21
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	16	8	8	6	8	2	0
	55-59 ans	28	15	13	5	6	10	7
	60-64 ans	30	13	17	8	5	5	12
	65-69 ans	15	8	7	3	3	5	4
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	98	48	50	22	23	26	27
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	27,2	27,0	27,4	27,3	28,0	23,3	20,6
	55-59 ans	24,0	26,2	22,4	26,4	23,9	26,0	21,2
	60-64 ans	25,4	26,4	24,6	29,9	27,0	23,7	23,3
	65-69 ans	27,3	25,9	28,4	24,1	32,2	26,6	27,1
	70-74 ans	30,8	32,0	29,8	35,4	34,0	30,9	28,7
	50-74 ans	26,1	26,8	25,5	27,6	27,2	26,0	23,8
	B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	15,2	15,1	15,3	15,0	15,4	16,3
55-59 ans		14,3	15,6	13,3	16,2	15,2	15,1	11,7
60-64 ans		15,8	15,5	16,0	19,2	19,7	12,9	14,1
65-69 ans		16,7	16,8	16,7	14,7	20,7	17,8	15,3
70-74 ans		18,7	19,8	17,8	27,1	25,5	17,4	15,7
50-74 ans		15,5	16,0	15,2	16,5	16,7	15,3	13,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA		50-54 ans	44,1	44,0	44,2	45,0	45,2	30,0
	55-59 ans	40,6	40,5	40,8	38,8	36,4	42,1	44,7
	60-64 ans	37,8	41,0	34,9	35,9	27,1	45,8	39,7
	65-69 ans	38,7	35,1	41,4	39,3	35,9	33,3	43,6
	70-74 ans	39,2	38,1	40,3	23,5	25,0	43,5	45,1
	50-74 ans	40,4	40,4	40,5	40,0	38,7	41,0	42,5
	B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,0	3,2	2,9	3,0	3,2	5,6
55-59 ans		3,7	3,4	3,9	3,4	4,1	3,4	3,7
60-64 ans		4,3	4,1	4,4	5,7	5,3	3,0	4,0
65-69 ans		5,0	6,1	4,1	8,1	8,3	5,2	2,7
70-74 ans		4,4	5,7	3,2	2,9	2,9	6,5	3,3
50-74 ans		3,9	4,1	3,7	4,0	4,1	4,1	3,4
50-74 ans **		3,9	4,2	3,7	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0