

Tableau 2.b. Prévalences et évolutions de l'adoption systématique des 4 mesures d'hygiène selon les conditions de vie liées à l'épidémie de COVID-19 et au confinement (% ; données pondérées). Source : *Enquête CoviPrev*, France métropolitaine, 2020

		Adoption systématique des 4 mesures d'hygiène <sup>1</sup>					
		Période de confinement					
Période de recueil des données		23-25 mars	30 mars-1er avril	14-16 avril	20-22 avril	28-30 avril	4-6 mai
Numéro de vague d'enquête		V1	V2	V3	V4	V5	V6
Nombre de personnes interrogées		2000	2003	2010	2000	2000	2000
Conditions de vie liées à l'épidémie		%	%	%	%	%	%
Ensemble		--	49,9	<b>46,8</b>	45,9	43,2	44,4
<b>Condition de travail</b>							
Inactifs et chômeurs		--	50,0	45,9	44,6	42,6	41,2
Actifs en télétravail		--	46,2	45,8	43,0	43,1	45,0
Actifs extérieur domicile		--	54,1	50,5	52,0	45,4	48,5
Actifs au chômage partiel		--	48,2	46,8	44,4	43,2	45,1
Actifs en arrêt de travail		--	50,2	44,3	47,5	41,2	51,3
<b>Logement avec forte promiscuité</b>							
Non		--	50,4	<b>46,8</b>	45,8	43,1	44,5
Oui		--	43,6	46,3	46,7	44,4	43,5
<b>Logement avec un espace extérieur</b>							
Non		--	46,8	41,7	42,7	43,3	42,8
Oui		--	50,4	47,5	46,3	43,2	44,7
<b>Avoir un soutien moral ou affectif</b>							
					**		
Non		--	48,8	44,7	41,6	41,6	42,5
Oui		--	50,7	48,5	49,0	<b>44,6</b>	46,1
<b>Avoir ou avoir eu un proche malade du COVID-19 ou ayant des symptômes</b>							
Non		--	51,1	<b>47,1</b>	45,9	42,1	44,0
Oui		--	46,1	46,1	45,8	46,0	45,5
<b>Avoir ou avoir eu des symptômes du COVID-19</b>							
							*
Aucun ou autres symptômes		--	50,1	47,0	46,5	<b>43,1</b>	44,0
Toux et/ou fièvre sans difficultés respiratoires		--	51,7	46,9	42,7	40,0	41,1
Au moins des difficultés respiratoires		--	49,8	43,5	42,2	51,3	57,8
<b>Durée quotidienne d'exposition aux médias sur le COVID-19</b>							
					*	***	*
Moins d'1 heure		--	49,9	<b>42,1</b>	43,9	<b>35,3</b>	40,8
Entre 1 et 2 heures		--	46,4	46,4	41,5	40,6	43,0
Entre 3 et 4 heures		--	52,6	50,8	51,6	46,4	50,3
Plus de 4 heures par jour		--	50,3	46,2	51,0	47,2	44,6
<b>Recherche active d'informations sur le COVID-19</b>							
					*	***	
Non		--	47,1	44,3	42,9	38,3	<b>43,2</b>
Oui		--	51,2	48,5	47,9	46,9	45,3
<b>Graves disputes ou climat de violence dans le foyer (15 derniers jours)</b>							
					*	***	
Non		--	50,6	<b>47,1</b>	46,9	44,6	44,7
Oui		--	44,6	44,3	38,7	32,6	<b>42,3</b>
<b>Anxiété<sup>2</sup></b>							
					*		
Pas d'anxiété		--	49,2	45,3	43,6	42,0	43,4
Anxiété probable		--	48,0	47,2	46,7	44,6	43,4
Anxiété certaine		--	54,0	51,3	52,5	46,1	48,8
<b>Dépression<sup>2</sup></b>							
					*		
Pas de dépression		--	51,8	47,8	48,6	<b>43,7</b>	43,4
Dépression probable		--	47,2	48,9	<b>42,0</b>	43,6	44,1
Dépression certaine		--	47,7	40,7	43,9	41,2	47,8
<b>Peur ressentie</b>							
			***	***	***	***	***
Non, pas du tout		--	48,1	<b>39,6</b>	40,1	38,2	39,9
Non, plutôt pas		--	44,1	42,5	40,1	40,0	38,5
Oui, plutôt		--	49,8	48,7	48,6	44,3	47,3
Oui, tout à fait		--	61,1	58,0	60,7	56,9	59,4

Notes : -- données indisponibles ; Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de .05). **Les chiffres (%) en vert présentent une évolution significativement favorable par rapport à la vague précédente. Les chiffres en rouge présentent une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente,** \* les étoiles marquent une association significative (test de Wald ajusté) entre les variables de conditions de vie liées à l'épidémie et au confinement (colonne de gauche) et l'adoption des 4 mesures d'hygiène pour chacune des vagues, \*\*\* : p<0,001 ; \*\* : p<0,01 ; \* : p<0,05.

<sup>1</sup> 4 mesures d'hygiène : Se laver régulièrement les mains ; Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades ; Tousser dans son coude ; Utiliser un mouchoir à usage unique.

<sup>2</sup> HAD : Hospital Anxiety and Depression scale

**Lecture du tableau :**

**Ex. 1 :** La proportion de répondants ayant une anxiété "certaine" et adoptant systématiquement les 4 mesures d'hygiène était de 54,0% en vague 2 (V2). Cette proportion est restée stable (51,3%) en vague 3 (V3).

**Ex. 2 :** L'adoption systématique des 4 mesures de l'hygiène a diminué de façon significative entre la V2 (49,9%) et la V3 (46,8%).

**Ex. 3 :** En V2 et V3, le fait de bénéficier d'un soutien moral ou affectif n'était pas significativement associé à l'adoption systématique des 4 mesures d'hygiène. En V4, cette association devenait significative : les répondants ne bénéficiant pas de soutien adoptaient moins systématiquement les mesures d'hygiène (41,6%) que ceux en bénéficiant (49,0%).