

Tableau 4.c. Déterminants cognitifs et affectifs chez les personnes présentant un état d'anxiété pendant la période postconfinement (% , moyennes, associations ; données pondérées). Source : *Enquête CoviPrev*, France métropolitaine, 2020

Période de recueil des données	Période postconfinement									
	13-15 mai	18-20 mai	27-29 mai	8-10 juin	22-24 juin	6-8 juillet	20-22 juillet	24-26 août	21-23 sept.	
Numéro de vague d'enquête	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	
Nombre de personnes interrogées	2000	2000	2000	2002	2000	2000	2000	2000	2000	
Connaissance sur la transmission du coronavirus SARS-CoV-2		***								
	Mauvaise (%)	34,1	37,6	37,8	36,6	37,5	33,9	33,4	--	--
	Bonne (%)	65,9	62,4	62,3	63,4	62,5	66,1	66,6	--	--
Mesures perçues comme efficaces		***								
	de 0 "Pas du tout" à 10 "Tout à fait efficaces"	7,30	6,93	7,27	7,32	7,19	7,27	7,17	7,13	6,69
Mesures perçues comme contraignantes		***								
	de 0 "Pas du tout" à 10 "Très contraignantes" (Moy.)	6,07	5,85	5,90	5,89	5,91	5,55	5,84	5,50	5,85
Approbation de l'adoption des mesures par les proches		***								
	de 0 "Pas du tout" à 3 "Tout à fait" (Moy.)	2,33	2,33	2,35	2,23	2,27	2,20	2,21	2,27	2,23
Capacité à adopter les mesures mises en place		***								
	de 0 "Pas du tout" à 10 "Tout à fait capable" (Moy.)	7,97	8,07	8,01	8,05	8,23	8,21	8,27	8,11	7,99
Confiance dans les pouvoirs publics		***								
	de 0 "Pas du tout confiant" à 10 "Tout à fait confiant" (Moy.)	4,26	4,31	4,71	4,95	4,71	4,68	4,87	4,59	4,27
Gravité perçue de la COVID-19		***								
	de 0 "Pas du tout" à 10 "Vraiment très grave" (Moy.)	8,23	8,17	8,11	7,75	8,04	8,08	8,02	7,80	7,49
Se sentir vulnérable au risque d'infection par le Coronavirus (SARS-CoV-2)		**								
	de 0 "Pas du tout" à 10 "Tout à fait vulnérable" (Moy.)	6,23	6,11	6,28	6,32	6,50	6,14	6,61	6,21	5,80

Notes : -- données indisponibles ; Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de .05). **Les chiffres (% ou M) en vert présentent une évolution significativement favorable par rapport à la vague précédente. Les chiffres en rouge présentent une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente. Les chiffres en italiques correspondent à la modification de l'indicateur et sont non comparables à la vague précédente.**

Pour chaque vague, l'association entre le facteur cognitif ou affectif et l'anxiété (HAD ; Hospital Anxiety and Depression scale ; Score>10) était testée, après ajustement sur l'ensemble des variables sociodémographiques, des variables liées à la situation épidémique et des autres facteurs cognitifs et affectifs (modèle de régression logistique, test de Wald au seuil de .05), ***: p<0,001 ; **: p<0,01 ; *: p<0,05.

Lecture du tableau :

Ex. 1 : La moyenne de la perception de l'efficacité des mesures de protection était de 7,30 (sur 10) en vague 7 (V7) parmi les personnes avec un état d'anxiété. Cette moyenne a significativement diminué (6,93) en vague 8 (V8).

Ex. 2 : La proportion de répondants avec un état d'anxiété ayant une bonne connaissance de la transmission du COVID-19 est restée stable entre la V7 et la V8.

Ex. 3 : En vague 7, la vulnérabilité perçue au risque d'infection par le Coronavirus (SARS-CoV-2) était significativement associée (au seuil de 1%) à un état d'anxiété, après ajustement sur toutes les autres variables (sociodémographiques, liées à la situation épidémique, et cognitives et affectives).