

SOMMAIRE

- ↓ **EPIDEMIOLOGIE - MESURES DE CONTROLE ET PREVENTION**
- ↓ **DEPISTAGE**
- ↓ **VULNERABILITE - PRISE EN CHARGE - SYMPTOMES - TRAITEMENTS**
- ↓ **ADDICTIONS**
- ↓ **ENFANTS - ADOLESCENT**
- ↓ **INEGALITES SOCIALES DE SANTE**
- ↓ **SANTE MENTALE**
- ↓ **VACCINATION**

EPIDEMIOLOGIE - MESURES DE CONTROLE ET PREVENTION

REACT-1 study of coronavirus transmission: May 2020 results - GOV.UK

Results of real-time assessment of community transmission of coronavirus (COVID-19) during May 2020.

www.gov.uk (e-date: 15/07/2020)

[Lien original](#)

Face coverings to be mandatory in shops and supermarkets from 24 July - GOV.UK

Health and Social Care Secretary Matt Hancock spoke about plans to make face coverings mandatory in shops and supermarkets from 24 July 2020.

www.gov.uk (e-date: 14/07/2020)

[Lien original](#)

Avis relatif à l'adaptation des mesures concernant les différentes doctrines à appliquer dans les milieux scolaire et universitaire, et pour l'accueil collectif des mineurs selon l'évolution de la circulation du virus SARS-CoV-2 dans le cadre de la préparation à la rentrée de septembre 2020

Cet avis concerne plus particulièrement les milieux scolaire, universitaire et d'accueil collectif des mineurs mais peut aussi s'appliquer plus généralement aux différents lieux recevant du public.

www.hcsp.fr (e-date: 12/07/2020)

[Lien original](#)

COVID-19 : Utilisation sécuritaire des parcs et espaces verts urbains en contexte de déconfinement graduel | INSPQ

Le présent document vise à donner des balises pour favoriser l'utilisation des parcs et des espaces verts, dans le contexte de pandémie de la COVID-19. Il rappelle les principaux bienfaits des espaces verts sur la santé et les principes de base à respecter pour y réduire les risques de propagation du virus.

www.inspq.qc.ca (e-date: 11/07/2020)

[Lien original](#)

COVID-19 : Mesures de prévention et de protection pour les entreprises de services funéraires | INSPQ

Cette fiche présente les recommandations intérimaires de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en ce qui a trait aux mesures de prévention et de protection à prendre pour les entreprises de services funéraires (ESF) qui doivent prendre en charge des dépouilles de personnes décédées de la COVID-19 comme cause principale ou comme cause contributoire au décès.

www.inspq.qc.ca (e-date: 11/07/2020)

[Lien original](#)

Coronavirus (COVID-19): reducing risk in adult social care - GOV.UK

A framework for how adult social care employers should assess and reduce risk to their workforce during the coronavirus pandemic.

www.gov.uk (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Healthcare Personnel During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic [mis à jour le 09/07/2020]

Summary of changes to the guidance : Clarified that the recommendations for universal use of eye protection (in addition to a facemask) for HCP working in facilities located in communities with moderate to sustained SARS-CoV-2 transmission is intended to ensure HCP eyes, nose, and mouth are all protected during patient care encounters.

www.cdc.gov (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

Coronavirus (COVID-19) Infection Survey pilot: England, 9 July 2020

Initial data from the COVID-19 Infection Survey.

www.ons.gov.uk (e-date: 09/07/2020)

[Lien original](#)

Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions

This document is an update to the scientific brief published on 29 March 2020 entitled "Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for infection prevention and control (IPC) precaution recommendations" and includes new scientific evidence available on transmission of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19.

www.who.int (e-date: 09/07/2020)

[Lien original](#)

COVID-19 : Recommandations pour la levée des mesures d'isolement des travailleurs de la santé | INSPQ

www.inspq.qc.ca (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions

This document is an update to the scientific brief published on 29 March 2020 entitled "Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for infection prevention and control (IPC) precaution recommendations" and includes new scientific evidence available on transmission of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19.

www.who.int (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

Rapid Review: What is the specific role of daycares and schools in COVID-19 transmission?

This rapid review is based on the most recent research evidence available at the time of release. A previous version was completed on May 19, 2020. This updated version includes evidence available up to June 26, 2020. In this rapid evidence review, we answer the question: What is the specific role of daycares and schools in COVID-19 transmission?

The National Collaborating Centre for Methods and Tools (e-date: 09/07/2020)

[Lien original](#)

Ici, je porte mon couvre-visage - Port du couvre-visage obligatoire [Affiche]

Affiche indiquant que le port du couvre-visage (masque) est obligatoire.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (Québec) (e-date: 15/07/2020)

[Lien original](#)

COVID-19 compendium

The COVID-19 Compendium contains links to current national and international policy, guidance and resources on COVID-19 from key organisations and will be updated daily during the COVID-19 pandemic.

Health Protection Scotland (e-date: 13/07/2020)

[Lien original](#)

Rapid review of public health guidance for residential care facilities in the context of COVID-19 [mis à jour le 10 juillet]

To inform guidance development by the Health Protection Surveillance Centre (HPSC) and decision making by the National Public Health Emergency Team (NPHE), HIQA is undertaking an ongoing rapid review of guidance for residential care facilities in the context of COVID-19. The review summarises recommendations that have been issued internationally to limit the spread of COVID-19 and protect healthcare workers and residents.

Health Information and Quality Authority (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

Is there evidence that temperature checks for healthcare workers (HCWs) reduce the transmission of COVID-19 in healthcare settings?

In a recent clinical evidence assessment, ECRI concluded that the weight of evidence does not favour screening programmes using temperature screening devices alone or in combination with a questionnaire, concluding that such programmes are ineffective in detecting infected persons. Under best-case scenarios, simulation studies suggest such screening will miss more than half of infected individuals. Real-world data show detection rates around 19%.

National Health Library & Knowledge Service (e-date: 14/07/2020)

[Lien original](#)

Interim Guidance on Management of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Correctional and Detention Facilities

This document provides interim guidance specific for correctional facilities and detention centers during the outbreak of COVID-19, to ensure continuation of essential public services and protection of the health and safety of incarcerated and detained persons, staff, and visitors. Recommendations may need to be revised as more information becomes available.

CDC (e-date: 14/07/2020)

[Lien original](#)

COVID-19 Science Report: What's New - As of 10 July 2020

National University of Singapore (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

COVID-19 Science Report: Containment Measures - As of 10 July 2020

National University of Singapore (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

EuroHealthNet Magazine Edition 15 | EuroHealthNet

This issue of EuroHealthNet magazine features the most noteworthy projects and developments in the field of health equity and health promotion in Europe today, especially looking at how the public health

community has responded to the health and social consequences of the COVID-19 pandemic and how it is planning to build back better.

eurohealthnet.eu (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

[Sommaire](#)

DEPISTAGE

Types and uses of coronavirus (COVID-19) tests - GOV.UK

Guidance on the different types of coronavirus test available.

www.gov.uk (e-date: 14/07/2020)

[Lien original](#)

Avis relatif à la pertinence d'un âge minimal pour tester les enfants par RT-PCR de SARS-CoV-2 avant un départ en Outre-mer

Le HCSP évalue la pertinence de fixer à 11 ans la limite d'âge pour un dépistage de Covid-19 par RT-PCR pour entrer en Outre-mer.

www.hcsp.fr (e-date: 12/07/2020)

[Lien original](#)

[Sommaire](#)

VULNERABILITE - PRISE EN CHARGE - SYMPTOMES - TRAITEMENTS

Avis de l'Académie : Les séquelles de la Covid-19

L'épidémie de Covid-19 diminue nettement en France. Chez les malades les plus sévèrement atteints, les séquelles sont une menace réelle dont l'importance reste mal évaluée. Des soignants et des malades feront également face à des séquelles psychiques qu'il ne faut pas mésestimer.

www.academie-medecine.fr (e-date: 15/07/2020)

[Lien original](#)

Le COVID-19 et ses complications : le recours à l'orthophonie peut être nécessaire

La HAS poursuit la rédaction de Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 destination des professionnels de santé, pour les outiller dans la reprise progressive de leurs consultations. Elle publie aujourd'hui des Réponses rapides destination des orthophonistes intervenant en cas de complications post-réanimation et de séquelles neurologiques liées au virus.

www.has-sante.fr (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

Perte d'odorat : le SARS-CoV-2 n'infecterait pas les nerfs olfactifs

Des études très récentes émettent l'hypothèse que le virus infecte les nerfs olfactifs dans le nez. Mais des chercheurs d'INRAE, en collaboration avec l'Anses, ont démontré dans le contexte d'un modèle expérimental chez le hamster que le virus infecte d'autres cellules de la muqueuse nasale, mais pas les nerfs olfactifs. Leurs travaux sont parus le 3 juillet dans la revue *Brain Behaviour and Immunity*.

www.anses.fr (e-date: 09/07/2020)

[Lien original](#)

INESSS: Lopinavir-Ritonavir (Kaletra) (mise à jour 09-07-2020)

www.inesss.qc.ca (e-date: 09/07/2020)

[Lien original](#)

Questionnaire des symptômes COVID-19 | INSPQ

Il est destiné aux milieux de travail (autres que les milieux de soins, les milieux scolaires, les garderies et les camps de jour) afin d'assurer le retrait rapide des travailleurs risquant d'être atteints de la COVID-19 et pour prévenir la transmission aux personnes présentes dans l'entreprise.

www.inspq.qc.ca (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

COVID-19 : Prise en charge des travailleurs de la santé dans les milieux de soins | INSPQ

Ce document vise à préciser les facteurs à prendre en compte lors d'une exposition à un cas de COVID-19 survenue en milieu de soins, pour la gestion des personnes exposées. Il doit être utilisé comme un guide pour aider à la décision sur les mesures à recommander (surveillance des symptômes, retrait du travail et retour au travail) pour les travailleurs de la santé exposés lors d'une situation précise.

www.inspq.qc.ca (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

What are the risk factors and effectiveness of prophylaxis for venous thromboembolism in COVID-19 patients?

This study identified a paucity of evidence for both the risks factors of VTE and the effectiveness of prophylactic strategies to prevent VTE in COVID-19 patients.

CEBM (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

COVID-19 : Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs immunosupprimés | INSPQ

Au cours des dernières semaines, plusieurs directives et recommandations importantes ont été émises par les autorités de santé publique provinciales afin de protéger les populations les plus vulnérables d'une infection par le SRAS-CoV-2. Ces politiques incluent entre autres l'interdiction de visites dans les centres de personnes âgées ainsi que le retrait préventif de la travailleuse enceinte dans certains contextes d'exposition professionnelle à risque.

www.inspq.qc.ca (e-date: 14/07/2020)

[Lien original](#)

COVID-19 et les approches favorisant l'observance des mesures de précaution et de protection auprès des personnes en situation de vulnérabilité : réponse rapide

Le présent document ainsi que les constats qu'il énonce ont été rédigés en réponse à une interpellation du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le contexte de l'urgence sanitaire liée à la maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec. L'objectif est de réaliser une recension sommaire des données publiées et de mobiliser les savoirs clés afin d'informer les décideurs publics et les professionnels de la santé et des services sociaux.

INESSS (e-date: 09/07/2020)

[Lien original](#)

Rapid review of public health guidance on protective measures for vulnerable groups in the context of COVID-19 [mis à jour le 13 juillet]

HIQA undertook a review of public health guidance on COVID-19, to summarise the range of advice and recommendations that have been issued to protect vulnerable groups who may be at risk of severe illness. This update includes information from Public Health England, Health Protection Scotland (HPS), the Australia Department of Health and the New Zealand Ministry of Health.

Health Information and Quality Authority (e-date: 13/07/2020)

[Lien original](#)

[Sommaire](#)

ADDICTIONS

COVID-19: guidance for commissioners and providers of services for people who use drugs or alcohol - GOV.UK

COVID-19 guidance for commissioners and service providers for those dependent on drugs or alcohol.

www.gov.uk (e-date: 14/07/2020)

[Lien original](#)

COVID-19 - Pandémie et consommation d'alcool | INSPQ

COVID-19 - Pandémie et consommation d'alcool abusive (4 verres et plus lors d'une même occasion chez les femmes et 5 verres et plus chez les hommes). Plusieurs études réalisées au Canada et ailleurs dans le monde ont indiqué que la pandémie a contribué une hausse de la consommation d'alcool. La

consommation d'alcool est associée plus de 200 problèmes de santé et plus de 77 000 hospitalisations par année lui sont attribuables.

www.inspq.qc.ca (e-date: 11/07/2020)

[Lien original](#)

Understanding the experiences of people who inject drugs during the COVID-19 pandemic: Interim report 2

Second interim report from telephone interviews with 30 people who inject drugs, to understand the challenges that people who inject drugs are facing during the COVID-19 pandemic.

National Institute for Health Research (e-date: 07/07/2020)

[Lien original](#)

[Sommaire](#)

ENFANTS - ADOLESCENT

New focus on babies' and children's health as review launches - GOV.UK

A major new review into improving health outcomes in babies and young children has launched today.

www.gov.uk (e-date: 15/07/2020)

[Lien original](#)

Le syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant ayant un lien temporel avec la COVID-19

Les enfants ne représentent qu'un petit pourcentage des cas d'infection aiguë à SARS-CoV-2 et, en général, ils éprouvent des symptômes légers à modérés ou sont asymptomatiques. Cependant, des rapports récents décrivent une maladie inflammatoire aiguë qui a un lien temporel avec la COVID-19 chez quelques patients pédiatriques.

Société canadienne de pédiatrie (e-date: 08/07/2020)

[Lien original](#)

[Sommaire](#)

INEGALITES SOCIALES DE SANTE

L'accroissement des inégalités femmes-hommes pendant le confinement en graphiques

La pratique du télétravail révèle des inégalités profondes dans la sphère privée, en particulier chez les cadres, selon une étude de l'INED.

Le Monde (e-date: 09/07/2020)

INED

[Lien original](#)

Coronavirus and deaths of homeless people, England and Wales: deaths registered up to 26 June 2020

Of deaths involving the coronavirus (COVID-19) in England and Wales registered up to 26 June 2020, 16 were identified as people who were homeless.

www.ons.gov.uk (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

[Sommaire](#)

SANTE MENTALE

What is the evidence for the efficacy of remote psychological assessment [as opposed to therapy/intervention] with children for whom there is a query of a disability such as intellectual disability, Autism Spectrum Disorder, ADHD, or emotional or behavioural difficulties?

This interest has been extended to the current pandemic which has led to a reduction in face to face psychological interventions and a growing recognition that services, including assessments, may have to be delivered in different ways.

National Health Library & Knowledge Service (e-date: 13/07/2020)

[Lien original](#)

[Sommaire](#)

VACCINATION

More than 150 countries engaged in COVID-19 vaccine global access facility

More than 150 countries engaged in COVID-19 vaccine global access facility. The COVAX Facility, and the AMC within it, is designed to guarantee rapid, fair and equitable access to COVID-19 vaccines for every country in the world, rich and poor, to make rapid progress towards slowing the pandemic.

www.who.int (e-date: 15/07/2020)

[Lien original](#)

How WHO is supporting ongoing vaccination efforts during the COVID-19 pandemic

As one deadly disease spreads throughout the world, immunization efforts must continue to prevent outbreaks of other diseases.

www.who.int (e-date: 14/07/2020)

[Lien original](#)

Does the flu vaccine increase the risk of contracting COVID-19?

No study established a link between the flu vaccine and an increased risk of contracting COVID-19. Wolff, investigating viral interference among Department of Defence personnel concluded that the flu vaccine was not associated with viral interference and provides protection against influenza. The study did show varied results for how each non-flu respiratory virus, such as a coronavirus, impacted vaccinated subjects. This paper drew attention on social media with claims that the flu vaccine would increase the chances of getting COVID-19 by 36%. These claims are contradicted by Fichera.

National Health Library & Knowledge Service (e-date: 10/07/2020)

[Lien original](#)

[Sommaire](#)