

Synthèse :

En semaine 02 (du 11 au 17 janvier 2021), 2^{ème} semaine après la rentrée scolaire, l'activité totale des associations SOS Médecins est toujours en hausse chez les enfants (+27% soit +3 949 actes) et en baisse chez les adultes (-6% soit -2 716 actes).

En semaine 02, après 2 semaines consécutives de hausse, les actes médicaux pour **suspicion de COVID-19 tous âges** sont stables avec **2 718 actes** enregistrés (vs 2 749 actes en S01, soit -1%) et une part dans l'activité totale tous âges de 4,5% (vs 4,6% en S01). Selon l'âge, ces actes sont en forte hausse chez les **2-14 ans** (+54% soit +135 actes), stables chez les **moins de 2 ans** (24 actes vs 23 actes en S01) et les **75 ans et plus** (195 actes vs 194 actes en S01) et en baisse chez les **15-74 ans** (-8% soit -175 actes). La suspicion de COVID-19 constitue le **7^{ème} diagnostic le plus fréquent** chez les **2-14 ans** et le **4^{ème} chez les 15-74 ans**. Les actes médicaux pour suspicion de COVID-19 sont stables ou en baisse dans la majorité des régions à l'exception de **Centre-Val-de-Loire** (+44% soit +28 actes), **Pays-de-la-Loire** (+14% soit +20 actes), **PACA** (+11% soit +35 actes), **Occitanie** (+10% soit +13 actes) et **Nouvelle-aquitaine** (+7% soit +22 actes). Depuis le début de la surveillance, **168 218 actes** pour suspicion de COVID-19 ont été réalisés.

Chez les enfants, la quasi-totalité des indicateurs (pour les pathologies saisonnières et pathologies les plus fréquentes) est en hausse, de +44% (ORL) à 133% (crise d'asthme) pour les affections respiratoires et de +13% (vomissements) à +33% (gastro-entérite pour les tableaux gastro-intestinaux). La part d'activité pour la plupart de ces pathologies tend à revenir dans des valeurs proches de celles observées au cours des années précédentes.

Chez les **15-74 ans**, les actes pour **gastro-entérite** sont en légère hausse (+8%). A noter également une hausse de 12% des actes pour angoisse chez les 75 ans et plus, mais avec de faibles effectifs (+25 actes).

Figure 1 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins, tous âges




Figure 2 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins avec suspicion de COVID-19, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins toutes causes codées, par classe d'âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S51-20	4 803	12 293	34 616	7 151
S52-20	5 725	10 894	35 126	8 124
S53-20	5 035	9 507	39 139	9 023
S01-21	3 759	10 122	38 178	7 448
S02-21	4 732	12 965	35 782	7 072

Tableau 2 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19, par classe d'âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S51-20	22	314	1 791	169
S52-20	27	178	1 652	216
S53-20	16	142	2 002	237
S01-21	23	251	2 264	194
S02-21	24	386	2 089	195

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins.

- **Activité totale dans le réseau SOS Médecins France** : nombre d'actes SOS Médecins toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre d'actes SOS Médecins, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, à l'exception de l'indicateur Toux, établi à partir des motifs de consultation.

Indicateurs présentés dans le bulletin		Indicateurs surveillés non présentés dans le bulletin
Suspicion d'infection au COVID-19	p 8-9	
Fièvre isolée	p 10	
Vomissements	p 11	
Malaise	p 12	
Crise d'asthme	p 13	
Traumatisme	p 14	
Conjonctivite	p 15	
Gastro-entérite	p 16	
Grippe, syndrome grippal	p 17	
Bronchiolite	p 18	
Bronchite aiguë	p 19	
Pneumopathie	p 20	
Pathologies des voies respiratoires hautes	p 21	

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir des 60 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1^{er} janvier 2018. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencées par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.
- Dans les tableaux 3 et 4 (page 4), l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
 - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
 - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.

Note relative à l'interprétation des données

L'interprétation de l'ensemble des éléments chiffrés et graphes présentés dans ce document doit tenir compte de la baisse importante du nombre d'actes médicaux SOS Médecins tous âges et dans l'ensemble des classes d'âges.

Ainsi dans un contexte d'activité totale en baisse, pour un indicateur donné :

- une part d'activité en hausse sera le reflet : soit d'une augmentation ou d'une stabilisation de l'effectif, soit une diminution de l'effectif moins importante que la diminution de l'activité totale ;
- une part d'activité stable sera le reflet d'une évolution de l'effectif comparable à celle de l'activité totale ;
- une part d'activité en baisse sera le reflet d'une diminution de l'effectif plus importante que celle de l'activité totale.

Pour en savoir plus


Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2020, 62 associations SOS Médecins sur les 63 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Légende

- Emplacement d'une association SOS Médecins
- Département n'ayant pas d'association SOS Médecins
- Département ayant au moins une association SOS Médecins

Réalisation : DCAR USS - mars 2015
Sources : données SOS Médecins, IGN

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 2 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	>
Vomissements	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	≈	≈
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	>
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Traumatisme	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	>

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières)

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	<	<
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	<
Grippe, syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	<	<
Bronchiolite	Moins de 2 ans	>	<
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	≈	<
Pathologies des voies respiratoires hautes	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	<

Tableau 5 | Evolution des actes médicaux pour suspicion de COVID-19 |


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	>	sans objet
	Plus de 15 ans	<	sans objet

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	12 773	10 827	17,97%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 266	3 667	16,33%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 785	2 931	-4,98%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	2 718	2 749	-1,13%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 540	2 562	-0,86%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 258	2 278	-0,88%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 074	2 389	-13,19%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 990	2 277	-12,60%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 618	1 479	9,40%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 489	1 551	-4,00%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 466	1 884	30,89%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	358	239	49,79%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	271	221	22,62%
BRONCHITE (Diag SOS)	183	126	45,24%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	155	81	91,36%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	127	79	60,76%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	110	95	15,79%
ALLERGIE (Diag SOS)	102	90	13,33%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	90	89	1,12%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	86	98	-12,24%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	5 498	3 647	50,75%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 301	1 006	29,32%
BRONCHITE (Diag SOS)	533	308	73,05%
TRAUMATISME (Diag SOS)	468	428	9,35%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	415	386	7,51%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	404	469	-13,86%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	386	251	53,78%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	311	199	56,28%
ALLERGIE (Diag SOS)	278	267	4,12%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	266	217	22,58%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	4 493	5 017	-10,44%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 426	2 533	-4,22%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 421	2 236	8,27%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	2 089	2 264	-7,73%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 940	1 919	1,09%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 601	1 897	-15,60%
TRAUMATISME (Diag SOS)	1 490	1 522	-2,10%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 339	1 524	-12,14%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 044	1 129	-7,53%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	1 026	1 141	-10,08%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SOS)	492	514	-4,28%
DECES (Diag SOS)	445	444	0,23%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	424	448	-5,36%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	314	358	-12,29%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	265	248	6,85%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	252	234	7,69%
CHUTE (Diag SOS)	238	248	-4,03%
ANGOISSE (Diag SOS)	208	185	12,43%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	200	230	-13,04%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	195	194	0,52%

Activité liée à une suspicion de COVID-19


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de suspicion de covid-19 dans les actes codés




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Proportion de passage aux actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19

Tableau 3 : Part d'activité des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 dans l'activité toutes causes codées, par classe d'âges, France entière

	Nombre - Tous âges	% d'activité - Moins de 2 ans	% d'activité - 2-14 ans	% d'activité - 15-74 ans	% d'activité - 75 ans ou plus
S28-20	2 341,00	2,28	4,28	4,77	1,18
S29-20	3 172,00	1,49	4,35	6,08	1,66
S30-20	2 400,00	1,20	3,29	4,97	1,39
S31-20	2 029,00	1,40	3,04	4,13	1,17
S32-20	1 896,00	1,57	2,85	3,92	1,15
S33-20	2 096,00	1,12	2,47	4,37	,94
S34-20	2 503,00	1,46	3,19	5,25	1,33
S35-20	3 070,00	1,73	4,11	6,47	1,54
S36-20	4 185,00	1,93	5,97	8,10	1,56
S37-20	7 266,00	1,81	8,45	11,93	3,04
S38-20	6 967,00	1,70	8,09	11,64	3,21
S39-20	5 079,00	,67	5,64	9,80	2,57
S40-20	4 777,00	,87	4,79	9,46	2,68
S41-20	5 288,00	,73	4,76	10,45	3,25
S42-20	6 080,00	,56	4,67	12,38	4,03
S43-20	7 417,00	1,06	4,04	15,38	6,30
S44-20	7 655,00	1,05	4,70	16,64	7,58
S45-20	6 275,00	1,13	6,31	13,87	6,40
S46-20	4 569,00	,95	4,85	9,84	5,11
S47-20	3 008,00	,86	3,76	6,97	3,16
S48-20	2 401,00	,47	2,94	5,71	2,55
S49-20	2 151,00	,44	2,70	5,03	2,16
S50-20	2 203,00	,40	2,29	5,10	2,46
S51-20	2 310,00	,46	2,55	5,17	2,36
S52-20	2 086,00	,47	1,63	4,70	2,66
S53-20	2 417,00	,32	1,49	5,12	2,63
S01-21	2 749,00	,61	2,48	5,93	2,60
S02-21	2 718,00	,51	2,98	5,84	2,76

Evolution quotidienne régionale des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19

Tableau 4 : Evolution quotidienne des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 sur la semaine passée par région, tous âges


	11/01/2021	12/01/2021	13/01/2021	14/01/2021	15/01/2021	16/01/2021	17/01/2021
Auvergne-Rhône-Alpes	64	51	48	51	33	39	29
Bourgogne-Franche-Comté	14	20	10	13	12	9	10
Bretagne	14	14	8	16	8	22	16
Centre-Val de Loire	12	13	9	10	19	10	19
Corse	2	10	3	1	0	3	4
Grand-Est	26	34	37	43	24	23	41
Guadeloupe	0	0	0	0	0	0	0
Guyane	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-de-France	58	31	59	31	23	24	24
Ile-de-France	74	68	75	69	54	33	59
La Réunion	0	0	0	0	0	0	0
Martinique	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	31	24	35	28	23	33	33
Nouvelle-Aquitaine	54	39	51	55	38	41	42
Occitanie	27	18	11	12	20	21	29
Pays de la Loire	23	19	29	23	24	19	30

Provence-Alpes-Côte d'Azur	62	46	63	57	36	50	46
----------------------------	----	----	----	----	----	----	----

Activité liée à une **fièvre isolée**

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux vomissements

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de vomissements dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour vomissements parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour vomissements parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **malaise**

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés



Motifs SOS Médecins pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion d'asthme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour asthme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour asthme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour asthme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un traumatisme

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de traumatisme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une conjonctivite

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de conjonctivite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour conjonctivite parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour conjonctivite parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **grippe, syndrome grippal**

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de grippe, syndrome grippal dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe, syndrome grippal parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe, syndrome grippal parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour grippe, syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée à une bronchiolite (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de bronchiolite dans les actes codés




Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S52-20	123,00	79,00	41,38	21,54
S53-20	97,00	69,00	-21,14	-12,66
S01-21	49,00	31,00	-49,48	-55,07
S02-21	89,00	64,00	81,63	106,45

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions de bronchiolite parmi les actes codés, Enfants de moins de 2 ans



Activité liée à une bronchite aiguë (Diagnostics)

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de bronchite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aiguë parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aiguë parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Répartition des consultations pour bronchite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une pneumopathie (Diagnostics)

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de pneumopathie dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Répartition des consultations pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée aux pathologies des voies respiratoires hautes* (Diagnostics)

* : ce regroupement comprend les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion des pathologies liées aux voies respiratoires hautes dans les actes codés





Actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour pathologies des voies respiratoires hautes parmi les actes codés, moins de 15 ans



Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour pathologies des voies respiratoires hautes parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Répartition des consultations pour pathologies de la sphère ORL



Chez les enfants de moins de 2 ans

Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans

Chez les adultes de plus de 75 ans



Directrice de la publication : Pr Geneviève CHENE

Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Jean-Christophe Masseron, Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja

Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex.

Tél. : 01 41 79 57 21 – <http://www.santepubliquefrance.sante.fr>