

Spain	2%	1%			1%					4%	1%	1%	1%						1%	
Amérique Latine et Caraïbes	3%	4%	3%	5%	4%	7%	5%	2%	5%	4%	5%	7%	7%	6%	9%	4%	10%	5%	14%	
Argentina																			2%	
Bolivia (Plurinational State of)												1%							2%	
Brazil	2%	0%					1%		1%		1%	2%		4%	4%	2%	2%		2%	
Colombia																			2%	
Cuba							1%													
Dominica											1%									
Dominican Republic		1%		1%		2%	2%					1%			2%					
Guatemala													3%							
Haiti			1%	4%	2%	3%		1%		2%	1%				2%		2%		4%	
Mexico					1%		1%	1%	2%	1%	2%	3%	2%	1%	2%		3%	2%	3%	
Paraguay									1%											
Peru	1%	2%	1%		1%	1%			1%			1%	2%			1%			2%	
Saint Lucia																		2%		
Suriname						1%					2%			1%		1%			2%	
Amérique du Nord	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%
Canada					1%														1%	
United States of America											1%									
Océanie	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
French Polynesia					1%															

* Pays visités dans le mois précédant le diagnostic.

Pour les pays non mentionnés dans ce tableau, aucun cas de fièvre typhoïde ou paratyphoïde chez des voyageurs revenant de ces pays n'a été rapporté pour la période 1999-2017.