

ARCHIVES

Publié le 08/01/2014

Situation épidémiologique de la bronchiolite en France métropolitaine. Situation au 8 janvier 2014.

La situation épidémiologique actuelle montre que le nombre de recours aux services d'urgence hospitaliers pour bronchiolite du nourrisson commence à décroître en France métropolitaine. Le pic épidémique avait été franchi en semaine 49 en Ile de France et a été franchi au cours de la dernière semaine de décembre dans le reste de la France. Le nombre de recours aux services hospitaliers d'urgence est encore élevé mais devrait rapidement diminuer dans les prochaines semaines.

Depuis le 1^{er} septembre 2013, parmi les nourrissons ayant eu recours aux services hospitaliers d'urgence pour bronchiolite, 59 % étaient des garçons et 55 % avaient moins de 6 mois, ce qui est habituellement observé.

Voir aussi

- Réseau OSCOUR - Organisation de la surveillance coordonnée des urgences

Figure 1

Nombre de recours aux urgences hospitalières pour bronchiolite des enfants de moins de 2 ans et moins de 6 mois dans les 406 établissements hospitaliers participant à la surveillance, données InVS, 8 janvier 2014 (nb : nombre ; MM7 : moyenne mobile 7 jours)





Figure 2

Nombre hebdomadaire de recours aux urgences hospitalières pour bronchiolite des enfants de moins de 2 ans dans les 314 établissements hospitaliers participant à la surveillance depuis 2011, données InVS, 8 janvier 2014



[Haut de page](#)