

ARCHIVES

Publié le 22/01/2014

Situation épidémiologique des gastro-entérites aiguës en France. Point au 21 janvier 2014.

Voir aussi


- Risques infectieux d'origine alimentaire. Dossier.

Surveillance des consultations pour diarrhées aiguës par le Réseau Sentinelles

Pour la semaine n°03 (du 13 au 19 janvier 2014), d'après les données non consolidées du Réseau Sentinelles (<http://www.sentiweb.fr>), l'incidence nationale de la diarrhée aiguë ayant conduit à une consultation d'un médecin généraliste était de 266 cas/100 000 habitants, en-dessous du seuil épidémique de 278 cas pour 100 000 habitants (figure 1). Six régions ont un taux d'incidence au-dessus du seuil épidémique national : Aquitaine, Limousin, Languedoc-Roussillon, Basse-Normandie, Haute-Normandie et Alsace.

Figure 1

Taux d'incidence national (en cas pour 100 000 habitants) de diarrhée aiguë et seuil épidémique, septembre 2011 - janvier 2014, données du Réseau Sentinelles au 21 janvier 2014




Surveillance des gastro-entérites à partir des données OSCOUR® des services d'urgences hospitalières

L'activité des services d'urgence hospitaliers pour gastro-entérite aiguë (GEA) est en diminution dans toutes les tranches d'âge. Cette semaine, l'activité est inférieure à celle observée à la même période des saisons 2011-2012 et 2012-2013 (figure 2).

Figure 2

Consultations journalières aux urgences hospitalières pour gastro-entérite aiguë dans les établissements hospitaliers métropolitains participant à la surveillance, hivers 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 (moyennes mobiles sur 7 jours) - Hôpitaux constants (N=319), données InVS au 20 janvier 2014



Episodes de cas groupés de GEA virales signalés à l'InVS

Depuis le début de la semaine 45 (04/11/2013), des échantillons ont été reçus au Centre National de Référence (CNR) des virus entériques pour 61 foyers de gastro-entérites notifiés au CNR. Ces foyers de gastro-entérites sont survenus majoritairement en maison de retraite. Un norovirus a été identifié dans 28 des 37 foyers pour lesquels des résultats virologiques définitifs sont disponibles au CNR.

Conclusion

L'activité de consultations pour GEA à l'hôpital (réseau Oscour) est en diminution par rapport aux semaines précédentes. L'activité de consultation pour GEA en médecine générale (réseau Sentinelles) continue d'augmenter, mais reste encore en-dessous du seuil épidémique.

