



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



MARS 2021

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

LYMPHOME FOLLICULAIRE

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et le sexe et IC à 95%

	1 an			5 ans		
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
40 ans	99 [98;100]	99 [98;100]	99 [98;100]	94 [91;96]	97 [94;98]	95 [93;97]
50 ans	98 [97;99]	99 [98;99]	98 [98;99]	91 [89;93]	95 [93;96]	93 [91;94]
60 ans	96 [95;97]	98 [97;99]	97 [96;98]	86 [84;88]	91 [89;93]	88 [87;90]
70 ans	93 [91;94]	96 [94;97]	94 [93;95]	77 [74;80]	83 [80;85]	80 [78;82]
80 ans	85 [82;88]	89 [87;91]	87 [85;89]	56 [51;60]	65 [61;69]	61 [58;64]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour Hommes et Femmes ensemble et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
40 ans	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,02]
50 ans	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]
60 ans	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]
70 ans	0,07 [0,05;0,09]	0,05 [0,04;0,06]	0,03 [0,03;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,02;0,03]
80 ans	0,16 [0,12;0,21]	0,09 [0,08;0,11]	0,06 [0,05;0,08]	0,03 [0,02;0,05]	0,04 [0,02;0,06]

Figure C1. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) (a) et survie nette (b) selon le temps depuis le diagnostic pour différents âges, chez l'homme et chez la femme





Figure C2. Survie nette à 1 et 5 ans selon l'âge au diagnostic avec IC à 95%, chez l'homme et chez la femme



Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1995 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1995-2015, Hommes et Femmes ensemble)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1995	86 [85;88]	88 [85;89]	62 [59;65]	67 [64;71]	47 [44;49]	56 [52;60]
2000	90 [89;91]	92 [91;93]	70 [68;72]	77 [74;79]	55 [54;57]	67 [65;70]
2005	92 [91;93]	94 [93;94]	74 [73;75]	82 [80;83]	60 [59;62]	74 [72;76]
2010	93 [92;94]	95 [94;96]	78 [76;79]	86 [85;88]	66 [64;67]	80 [78;82]
2015	94 [93;95]	96 [95;97]	81 [79;82]	89 [87;91]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
40 ans					
1995	0,01 [0,00;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,03]
2000	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]
2005	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,00;0,01]
2010	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]
2015	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	ND
60 ans					
1995	0,06 [0,04;0,09]	0,06 [0,05;0,08]	0,06 [0,05;0,07]	0,04 [0,04;0,06]	0,03 [0,02;0,04]
2000	0,04 [0,03;0,06]	0,04 [0,03;0,05]	0,04 [0,04;0,05]	0,03 [0,03;0,04]	0,02 [0,01;0,03]
2005	0,03 [0,02;0,04]	0,03 [0,02;0,04]	0,03 [0,02;0,03]	0,02 [0,02;0,03]	0,01 [0,01;0,02]
2010	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,02;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
2015	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	ND
80 ans					
1995	0,42 [0,32;0,54]	0,29 [0,24;0,35]	0,21 [0,18;0,26]	0,10 [0,07;0,14]	0,05 [0,02;0,10]
2000	0,29 [0,23;0,37]	0,20 [0,17;0,24]	0,15 [0,13;0,18]	0,07 [0,05;0,09]	0,03 [0,02;0,07]
2005	0,20 [0,16;0,25]	0,14 [0,12;0,16]	0,10 [0,09;0,12]	0,05 [0,04;0,06]	0,02 [0,01;0,05]
2010	0,14 [0,11;0,18]	0,10 [0,08;0,12]	0,07 [0,06;0,09]	0,03 [0,02;0,05]	0,02 [0,01;0,03]
2015	0,10 [0,08;0,13]	0,07 [0,06;0,09]	0,05 [0,04;0,06]	0,02 [0,02;0,03]	ND

ND : Non Disponible

Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%

Age	1995	2000	2005	2010	2015
1 an					
40	99 [98;99]	99 [99;99]	99 [99;100]	100 [99;100]	100 [100;100]
50	97 [96;98]	98 [97;99]	99 [98;99]	99 [99;99]	99 [99;100]
60	94 [93;95]	96 [95;97]	97 [96;98]	98 [97;98]	99 [98;99]
70	87 [85;89]	91 [90;92]	94 [93;94]	96 [95;96]	97 [96;97]
80	74 [70;78]	81 [78;84]	86 [84;88]	90 [89;92]	93 [92;94]
5 ans					
40	90 [87;92]	93 [91;94]	95 [94;96]	96 [96;97]	98 [97;98]
50	85 [82;87]	89 [87;91]	92 [91;93]	94 [93;95]	96 [95;97]
60	76 [72;79]	83 [81;84]	88 [86;89]	91 [90;92]	94 [92;95]
70	63 [58;68]	73 [70;75]	80 [78;82]	86 [84;87]	90 [88;91]
80	45 [38;51]	57 [53;61]	68 [64;71]	76 [73;79]	83 [79;86]
10 ans					
40	84 [80;87]	88 [86;90]	92 [90;93]	94 [93;95]	ND
50	76 [72;79]	83 [80;85]	87 [86;89]	91 [89;92]	ND
60	65 [60;69]	74 [71;76]	81 [79;83]	86 [84;88]	ND
70	50 [44;55]	61 [58;65]	71 [68;73]	79 [76;81]	ND
80	31 [25;38]	44 [39;50]	57 [52;61]	67 [63;71]	ND

ND : Non Disponible