

Tableau 5. Prévalences et évolutions des pensées suicidaires selon les profils sociodémographiques et les conditions de vie liées à l'épidémie (% ; données pondérées)  
Source : Enquête CoviPrev, France métropolitaine, 2020-2021



	Pensées suicidaires <sup>1</sup> (au cours des 12 derniers mois)											
	Confinement 2			Conf. 3								
	4-6 nov. 2020	23-25 nov. 2020	14-16 déc. 2020	18-20 janv. 2021	15-17 fév. 2021	15-17 mars 2021	21-23 avril 2021	17-19 mai 2021	21-28 juin 2021	15-21 juillet 2021	31 août / sept. 2021	
	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	
	Nombre de personnes interrogées			2000	2000	2000	2001	2000	2000	2000	2001	
<b>Profil sociodémographiques</b>												
	%											
<b>Sexe</b>	Ensemble											
	--	--	--	--	8,2	9,0	9,4	8,5	9,2	9,1	9,8	
	*											
	Homme											
	--	--	--	--	9,5	9,2	10,2	7,5	7,3	11,1	9,2	
	Femme											
	--	--	--	--	7,1	8,7	8,7	9,3	10,9	7,3	10,4	
<b>Age</b>	Ensemble											
	--	--	--	--	10,9	18,1	18,1	15,7	20,1	18,8	18,9	
	--	--	--	--	8,9	10,3	10,4	10,2	9,9	11,9	18,4	
	--	--	--	--	11,1	12,2	13,0	8,8	11,2	8,6	8,7	
	--	--	--	--	7,0	7,1	8,2	9,5	6,9	8,0	7,7	
	--	--	--	--	4,8	2,6	2,5	3,0	4,3	4,9	3,7	
<b>GSP en 2 classes (avec retraités et chômeurs recodés)</b>	***											
	--	--	--	--	7,1	8,8	7,9	8,1	8,4	7,4	7,9	
	--	--	--	--	9,1	8,5	9,8	8,5	8,0	8,5	10,2	
<b>Situation professionnelle</b>	***											
	--	--	--	--	9,2	8,9	11,1	8,8	9,2	9,6	10,8	
	--	--	--	--	10,1	13,6	18,1	21,4	23,4	21,7	20,9	
	--	--	--	--	14,3	20,7	13,9	15,7	13,4	12,4	16,8	
	--	--	--	--	4,3	3,2	3,5	3,2	5,3	4,4	3,9	
	--	--	--	--	9,9	18,7	10,9	13,6	12,4	13,7	13,1	
<b>Situation financière perdue</b>	***											
	--	--	--	--	5,3	4,6	7,2	6,6	5,7	5,9	6,6	
	--	--	--	--	7,6	9,3	8,6	8,0	9,8	10,0	11,5	
	--	--	--	--	16,0	20,1	17,4	15,0	18,3	18,0	17,9	
<b>Vit seul</b>	**											
	--	--	--	--	7,4	8,3	8,9	7,9	8,4	8,7	8,6	
	--	--	--	--	11,1	11,2	11,0	10,8	11,1	10,3	13,0	
<b>Parent d'enfant(s) de 16 ans ou moins</b>	**											
	--	--	--	--	7,7	8,7	8,6	7,8	8,5	8,0	9,3	
	--	--	--	--	9,4	9,5	11,5	10,2	10,6	11,5	10,9	
<b>Présente un risque de développer une forme grave de COVID-19<sup>2</sup></b>	**											
	--	--	--	--	6,9	7,5	9,0	8,2	8,5	8,3	8,5	
	--	--	--	--	10,7	11,7	10,1	9,0	10,4	10,3	12,0	
<b>Antécédents de trouble psychologique</b>	***											
	--	--	--	--	4,7	5,8	6,2	5,2	5,5	5,9	5,2	
	--	--	--	--	22,7	21,8	23,2	22,2	23,1	21,8	26,1	
<b>Conditions de vie liées à l'épidémie</b>												
	%											
<b>Condition de travail (population active)</b>	**											
	--	--	--	--	9,1	7,0	9,2	11,1	--	--	--	
	--	--	--	--	9,1	8,8	11,3	8,0	--	--	--	
	--	--	--	--	7,9	9,0	3,6	16,1	--	--	--	
	--	--	--	--	13,3	16,1	26,7	12,9	--	--	--	
<b>Logement avec forte promiscuité</b>	**											
	--	--	--	--	8	8,4	9,3	7,8	8,3	8,4	8,5	
	--	--	--	--	11,5	15,4	10,0	16,4	18,5	18,0	28,2	
<b>Avoir un soutien moral ou affectif</b>	**											
	--	--	--	--	9,3	8,7	9,2	9,7	8,4	7,6	8,0	
	--	--	--	--	7,2	9,2	9,8	7,1	10,4	11,4	12,4	
<b>Avoir ou avoir eu des symptômes de la COVID-19</b>	***											
	--	--	--	--	7,6	7,6	8,0	7,0	7,8	7,1	7,0	
	--	--	--	--	10,9	15,0	14,6	14,4	14,7	16,0	20,8	

Notes : -- données indisponibles ; Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de 5%).  
Les pourcentages en vert présentent une évolution significativement favorable par rapport à la vague précédente. Les pourcentages en rouge présentent une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente.  
Les étoiles marquent une association significative (test de Wald ajusté) entre les variables sociodémographiques (colonne de gauche) et les problèmes de sommeil pour chacune des vagues : \*\* : p<0,001 ; \* : p<0,01 ; - : p<0,05.

<sup>1</sup> Question posée à partir de la vague 21 (15-17 février) : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà pensé à vous suicider ? (oui/non)

<sup>2</sup> Facteurs de risque de développer une forme grave de COVID-19 : diabète ; hypertension artérielle ; problème respiratoire ou pulmonaire : bronchite chronique, BPCO, asthme, agnésie du sommeil, mucoviscidose, insuffisance, emphysème ; problème cardiaque ou cardiovasculaire : insuffisance, angine de poitrine, antécédent d'infarctus, de pontage ou d'AVC, trouble du rythme cardiaque, cardiopathie congénitale, maladie des valves cardiaques, maladie des artères du cœur ; problème rénal : néphropathie, dialyse, syndrome néphrotique ; cancer avec traitement en cours ; obésité (IMC>30).

**Lecture du tableau :**

Ex. : La proportion de personnes en situation d'inactivité professionnelle déclarant des pensées suicidaires présente une évolution défavorable entre la vague 21 (9,9%) et la vague 22 (18,7%). Les pensées suicidaires survenues au cours des 12 derniers mois ont été mesurées à partir de la vague 21.