



Surveillance des épidémies hivernales

BRONCHIOLITE (MOINS DE 2 ANS) : GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL :



Evolution régionale : ➡
Pas d'épidémie



Evolution régionale : ➡
Pas d'épidémie

Phases épidémiques
(bronchiolite / grippe et
syndrome grippal uniquement) :

- Pas d'épidémie
- Pré ou post épidémie
- Épidémie

Evolution des indicateurs (sur la
semaine écoulée par rapport à la
précédente) :

- ➡ En augmentation
- ➡ Stable
- ➡ En diminution

GASTRO-ENTERITE

- Evolution régionale : ➡
- En médecine libérale (associations SOS Médecins) : **activité faible.**
- En médecine hospitalière (structures d'urgence du réseau Oscour®) : **activité faible.**

Détail des indicateurs régionaux en pages :

- Bronchiolite 2
- Grippe et syndrome
grippal..... 3
- Gastro-entérite 4
- Mortalité 5

Autres surveillances régionales

Mortalité toutes causes (données Insee)

Sous réserve de consolidation des données à 3 semaines, pas de fluctuation anormale des effectifs de décès jusqu'en semaine S43.

Surveillance des arboviroses

En Auvergne-Rhône-Alpes, depuis le 1er mai 2018, 120 cas suspects ont été signalés dans les 8 départements sous surveillance renforcée. Parmi ces signalements, ont été confirmés 30 cas importés de dengue (de retour de zone de circulation virale), 1 cas de chikungunya et aucun cas de zika. Aucun cas autochtone n'a été confirmé.

Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone

➡ se reporter au *Point Epidémio mensuel dédié* (point au 5 novembre) accessible ici : [lien](#)

Faits marquants

Agénésies transverses des membres supérieurs : Plus d'informations sur le site de [Santé publique France](#)

Mois sans tabac

30-10-2018

#MoisSansTabac compte déjà plus de 185 000 inscrits dès son lancement !

La France compte encore aujourd'hui 12 millions de fumeurs. Malgré une baisse historique d'1 million de fumeurs entre 2016 et 2017, le tabagisme féminin en constante augmentation depuis les années 70 reste préoccupant selon les données du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) publié aujourd'hui à l'occasion du lancement du #MoisSansTabac. La campagne nationale d'aide à l'arrêt du tabac conçue et pilotée par Santé publique France en partenariat avec le Ministère des Solidarités et de la Santé et l'Assurance Maladie revient pour une 3ème édition.

● ○ ○ ○ ○

EN SAVOIR PLUS

Plus d'informations sur le site de [Santé publique France](#).

Vaccination contre la grippe saisonnière

Pouvoirs publics, professionnels de santé, institutions : tous mobilisés en faveur de la vaccination contre la grippe. Inciter les personnes fragiles à se faire vacciner est également la mission des professionnels de santé. Ils doivent adopter une conduite exemplaire en se faisant eux-mêmes vacciner afin de ne pas contribuer involontairement à la propagation de l'infection. Plus d'information dans le [communiqué de presse](#).


BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans)

Synthèse des données disponibles – Activités stables à un niveau bas

En médecine hospitalière, selon les données transmises par les structures d'urgence au réseau Oscour®, les consultations et les hospitalisations pour diagnostic de bronchiolite chez les moins de 2 ans étaient stables par rapport aux semaines précédentes (Figure 1). En semaine 44, 114 passages pour ce diagnostic et dans cette classe d'âge ont été relevés soit 5,5% des passages dans cette classe d'âge (108 passages en semaine 43). Parmi ces passages, 36 ont été suivis d'une hospitalisation soit un taux d'hospitalisation de 32% pour ce diagnostic et de 11,5% parmi l'ensemble des hospitalisations dans cette classe d'âge (Tableau 1).


En médecine libérale, d'après les données des associations SOS Médecins de la région, les consultations pour diagnostic de bronchiolite chez les moins de 2 ans étaient stables par rapport aux semaines précédentes (Figure 2). En semaine 44, 20 consultations pour diagnostic de bronchiolite chez des moins de 2 ans ont été relevées soit 3,4% de l'activité globale des associations SOS Médecins (11 consultations en semaine 43).

D'après les données virologiques hospitalières du CNR (réseau Rénal), la circulation du virus respiratoire syncytial (VRS) était stable avec quelques cas sporadiques en semaine 43 : 1,1% des échantillons testés dans la région ARA étaient positifs à VRS contre 0,4% en semaine S42.



Semaine	Nombre d'hospitalisations pour bronchiolite, moins de 2 ans	Taux de bronchiolite parmi toutes les hospitalisations codées, moins de 2 ans (%)
S43	32	10%
S44	36	11,5

Tableau 1- Hospitalisations après passage (réseau Oscour®), moins de 2 ans, ARA



Pour en savoir plus

Au national :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la bronchiolite : [cliquez ici](#)

Prévention de la bronchiolite

Comment diminuer le risque de bronchiolite ?

Un document grand public intitulé "Votre enfant et la bronchiolite" est disponible sur le site de Santé publique France : [brochure](#)

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL

Synthèse des données disponibles - niveau de base de tous les indicateurs

En médecine libérale, d'après les données des associations SOS Médecins de la région, les consultations tous âges pour diagnostic de grippe/syndrome grippal étaient stables par rapport aux semaines précédentes (Figure 4). En semaine 44, 61 consultations pour ce diagnostic ont été relevées soit moins de 1% de l'activité globale des associations SOS Médecins (68 consultations en semaine S43).




Selon les données du réseau Sentinelles, le taux d'incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale était de 8/100 000 [0 ; 17], stable aux semaines précédentes (Figure 5).

En médecine hospitalière, selon les données transmises par les structures d'urgence au réseau Oscour®, les recours tous âges pour diagnostic de grippe/syndrome grippal étaient stables par rapport aux semaines précédentes (Figure 3). En semaine S44, 35 passages pour ce diagnostic ont été relevés soit 0,1% des passages (17 passages en semaine S43).

D'après les données virologiques ambulatoire du CNR, aucun virus grippal n'a été mis en évidence dans la région.

La surveillance des cas graves de grippe a repris en semaine 42 (5 novembre).

Dans les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad) de la région, 9 foyers d'infections respiratoires aiguës (IRA) ont été signalés depuis début octobre 2018.



Pour en savoir plus

Au national :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la grippe: [cliquez ici](#)

Prévention de la grippe et des syndromes grippaux

Retrouvez sur le site Internet de Santé publique France, l'intégralité des informations concernant les mesures de contrôle et recommandations vis à vis notamment des populations sensibles : <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Point-sur-les-connaissances>




GASTRO-ENTERITE ET DIARRHEES AIGUES

Synthèse des données disponibles : niveau d'activité faible

En médecine hospitalière, selon les données transmises par les structures d'urgence au réseau Oscour®, l'activité pour gastro-entérite était faible. Les recours tous âges pour diagnostic de gastro-entérite étaient stables par rapport aux semaines précédentes (Figure 6). En semaine 44, 467 passages pour gastro-entérite ont été relevés soit 1,5% des passages (414 passages en semaine 43). Près de 50% des passages concernent des enfants de moins de 5 ans.

En médecine libérale, d'après les données des associations SOS Médecins de la région, l'activité pour gastro-entérite était faible. Les consultations tous âges pour diagnostic de gastro-entérite étaient stable par rapport aux semaines précédentes (Figure 7). En semaine 44, 488 consultations pour ce diagnostic ont été relevées soit 6,9% de l'activité globale des associations SOS Médecins (548 consultations en semaine 43). Près de 20% des consultations concernent des enfants de moins de 5 ans.

Selon les données du réseau Sentinelles, le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale était de 107/100 000 [56 ; 158], en légère augmentation par rapport aux semaines précédentes (Figure 8).



Pour en savoir plus

Au national :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® : [cliquez ici](#)

Prévention de la gastro-entérite

Recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique relatives aux conduites à tenir devant des gastro-entérites aiguës en Ehpad : [cliquez ici](#)

MORTALITE TOUTES CAUSES

Synthèse des données disponibles

Selon les **données de mortalité fournies par l'Insee** pour la semaine S43, les nombres de décès toutes causes observés tous âges confondus se situaient dans des marges de fluctuation habituelle sur cette période (**Figure 9**). Compte-tenu des délais habituels de transmission des données, les effectifs de mortalité observés pour les 3 semaines précédentes sont encore incomplets. Il convient donc de rester prudent dans l'interprétation de ces observations.

Pour en savoir plus

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour, SOS Médecins, Mortalité) : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la mortalité : [cliquez ici](#)




Figure 9- Nombre hebdomadaire de décès toutes causes tous âges confondus

QUALITE DES DONNEES

Nombre d'associations et de structures d'urgence participant sur la semaine 44 et taux de codage des diagnostics au niveau régional :

Semaine	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Etablissements inclus dans l'analyse des tendances	7/7 associations	84/86 structures d'urgence
Taux de codage du diagnostic sur la semaine précédente sur ces établissements	97,9 %	72,7 %

Le point épidémiolo

Remerciements à nos partenaires :

- Services d'urgences du réseau Oscour®,
- Associations SOS Médecins de Grenoble, St Etienne, Clermont-Ferrand, Lyon, Chambéry, Annecy, Thonon-Chablais
- Services de réanimation (Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation),
- Le Réseau Sentinelles de l'Inserm et son antenne régionale en ARA basée au CH de Firminy,
- Le CNR Virus des infections respiratoires (Laboratoire de Virologie-Institut des Agents Infectieux, Lyon)
- Les établissements hébergeant des personnes âgées
- Les SAMU
- Les mairies et leur service d'état civil qui transmettent en continu les déclarations de décès à l'INSEE
- L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
- L'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance
- Les équipes de l'ARS ARA notamment celles chargées de la veille sanitaire et de la santé environnementale

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention



Directeur de la publication

François Bourdillon
Directeur général
Santé publique France

Responsable de la Cire

Christine SAURA

Comité de rédaction

Baptiste ANDRIVOT
Elise BROTET
Delphine CASAMATTA
Sylvette FERRY
Erica FOUGERE
Philippe PEPIN
Isabelle POUJOL
Guillaume SPACCAFERRI
Garance TERPANT
Alexandra THABUIS
Emmanuelle VAISSIERE
Jean-Marc YVON

Diffusion

Cire Auvergne-Rhône-Alpes
Tél. 04.72.34.31.15

cire-ara@santepubliquefrance.fr