

CIRE
OCCITANIE

Le point épidémiologique

Surveillance des épidémies hivernales

BRONCHIOLITE (MOINS DE 2 ANS) :



Evolution régionale : ↗

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL :



Evolution régionale : →

Phases épidémiques (bronchiolite / grippe et syndrome grippal uniquement) :

- Pas d'épidémie
- Pré ou post épidémie
- Épidémie

Evolution des indicateurs (sur la semaine écoulée par rapport à la précédente) :

- ↗ En augmentation
- Stable
- ↘ En diminution

GASTRO-ENTERITE

- Evolution régionale : →

Détail des indicateurs régionaux en pages :
- Bronchiolite2

Faits marquants

Grippe et syndromes grippaux : la vaccination pour diminuer le risque de grippe

La vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications. **Un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé.**

L'Occitanie expérimente la vaccination par les pharmaciens : [site de l'ARS Occitanie](#)

Pour plus d'information, consultez le site : [Vaccination info service](#).

#MOISSANSTABAC

La troisième édition de ce défi national a débuté le 1^{er} novembre et comptait déjà plus de 185 000 inscrits fin octobre. Tout au long du mois de novembre, Santé publique France et les partenaires de #MoisSansTabac organisent plusieurs milliers d'opérations sur l'ensemble du territoire (métropole et DOM).

Cette campagne d'aide à l'arrêt du tabac mise sur un élan collectif en incitant les fumeurs à arrêter tous ensemble pendant 30 jours, au mois de novembre. En effet, un mois sans tabac multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement, car après 30 jours d'abstinence, la dépendance est bien moins forte et les symptômes de manque (nervosité, irritabilité) sont moins présents.

Les fumeurs et leurs proches sont invités à venir à la rencontre de tabacologues et d'autres acteurs de prévention qui seront à leur disposition pour leur proposer de rejoindre les participants au #MoisSansTabac. Ils étaient près de 15 500 en Occitanie l'an dernier !



Pour plus d'informations : [Tabac-info-service](#) - [Santé publique France](#) - [ARS Occitanie](#) - [URPS](#) - [Médecins libéraux Occitanie](#)

BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans)

Synthèse des données disponibles : Passage en phase pré-épidémique

En médecine hospitalière, selon les données transmises par les structures d'urgence au réseau Oscour®, les recours et hospitalisations pour diagnostic de bronchiolite chez les moins de 2 ans étaient en augmentation par rapport à la semaine précédente (Figure 1). En semaine 46, 108 passages pour ce diagnostic et dans cette classe d'âge ont été relevés, soit 8,4% des passages (66 passages en semaine 45). Parmi ces passages, 45 ont été suivis d'une hospitalisation, soit un taux d'hospitalisation de 41,7% pour ce diagnostic et de 21,5% parmi l'ensemble des hospitalisations dans cette classe d'âge (Tableau 1).

En médecine libérale, d'après les données des associations SOS Médecins de la région (Montpellier, Nîmes, Perpignan et Toulouse), les consultations pour diagnostic de bronchiolite chez les moins de 2 ans étaient en augmentation par rapport à la semaine précédente (Figure 2). En semaine 46, 20 consultations pour diagnostic de bronchiolite chez des moins de 2 ans ont été relevées, soit 8,2% de l'activité globale des associations SOS Médecins dans cette classe d'âge (14 consultations en semaine 45).

D'après les données virologiques des CHU de Nîmes, Montpellier et Toulouse, la circulation du virus respiratoire syncytial (VRS) était en légère augmentation par rapport à la semaine précédente : 7,4% des échantillons testés dans les laboratoires de virologie des CHU de la région Occitanie étaient positifs à VRS contre 7,1% en semaine 45.




Figure 1- Passages hospitaliers (réseau Oscour®), moins de 2 ans, Occitanie




Figure 2- Consultations SOS Médecins, moins de 2 ans, Occitanie

Semaine	Nombre d'hospitalisations pour bronchiolite, moins de 2 ans	Taux de bronchiolite parmi toutes les hospitalisations codées, moins de 2 ans (%)
S45 2018	23	13,9
S46 2018	45	21,5

Tableau 1- Hospitalisations après passage (réseau Oscour®), moins de 2 ans, Occitanie

Pour en savoir plus

Au national :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la bronchiolite : [cliquez ici](#)

Prévention de la bronchiolite

Comment diminuer le risque de bronchiolite ?

Un document grand public intitulé "Votre enfant et la bronchiolite" est disponible sur le site de Santé publique France : [brochure](#)

QUALITE DES DONNEES

Nombre d'associations et de structures d'urgence participant sur la semaine 46 de 2018 et taux de codage des diagnostics au niveau régional :

Semaine	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Etablissements inclus dans l'analyse des tendances	4/4 associations	66/66 structures d'urgence
Taux de codage du diagnostic sur la semaine précédente sur ces établissements	100,0 %	81,3 %

Le point épidémiologique

Remerciements à nos partenaires :

- Structures d'urgences du réseau Oscour® ;
- Associations SOS Médecins de Montpellier, Nîmes, Perpignan et Toulouse ;
- Réseau Sentinelles ;
- Services de réanimation de la région Occitanie ;
- Laboratoires de virologie des CHU de Montpellier, Nîmes et Toulouse ;
- Etablissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes de la région Occitanie ;
- Agence Régionale de Santé Occitanie.

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention



Directeur de la publication

François Bourdillon
Directeur général
Santé publique France

Comité de rédaction

Damien Mouly
Séverine Bailleul
Leslie Banzet
Olivier Catelinois
Amandine Cochet
Cécile Durand
Anne Guinard
Jérôme Pouey
Stéphanie Rivière
Cyril Rousseau
Caroline Six

Diffusion

Cire Occitanie
Tél. 05 34 30 25 25
Occitanie@santepubliquefrance.fr