


**Surveillance des épidémies hivernales**

Phases épidémiques : ■ Pas d'épidémie ■ pré ou post épidémie ■ épidémie

**BRONCHIOLITE  
(MOINS DE 2 ANS)**




Evolution régionale :



Post-épidémie

[Page 2](#)

**GASTRO-ENTERITE**




Evolution régionale :



Post-épidémie

[Page 3](#)

**GRIPPE  
ET SYNDROME GRIPPAL**



Evolution régionale :



9<sup>ème</sup> semaine épidémique

[Page 5](#)

**Autres surveillances régionales**

**Mortalité toutes causes (données Insee, [page 7](#))**

La mortalité toutes causes, tous âges et chez les plus de 65 ans, est proche de l'attendu à cette période.

→ Pour plus d'informations, se reporter au Point Epidémiologique national [ici](#)

**Morbidité (SurSaUD®, [page 7](#)):** activité des associations SOS Médecins stable tous âges confondus ; passages aux urgences stables tous âges confondus mais en augmentation chez les plus de 75 ans.

**Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone**

→ se reporter au Point Epidémiologique mensuel dédié (point au 4 février) accessible [ici](#)

**Faits marquants**

**Bronchiolite :** phase post-épidémique – rebond d'activité SAU de fin d'épidémie : plus d'information en [page 2](#)

**GEA :** 8<sup>ème</sup> semaine épidémique en ARA : plus d'informations en [page 3](#)

**Grippe :** 9<sup>ème</sup> semaine d'épidémie en ARA : plus d'information en [page 5](#)

**Dépistage organisé du cancer colorectal en 2016-2017 :** Santé publique France, en charge de l'évaluation du programme national de dépistage organisé du cancer colorectal vient de mettre à jour sur son site internet les indicateurs de participation et d'évaluation du programme de dépistage organisé du cancer colorectal en France . [Accéder aux données nationales, régionales et départementales 2016-2017](#)

**[Recrudescence des cas de rougeole en France, données de surveillance au 20 février 2018](#)**

Pour la **situation en Auvergne-Rhône-Alpes**, se reporter au Point Epidémiologique spécial (point au 12 février) accessible [ici](#)

# BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans)

La région Auvergne-Rhône-Alpes est en phase post-épidémique :

## Synthèse des données disponibles : pour les moins de 2 ans

- **SOS Médecins** : L'activité est en légère hausse en semaine 07 (S07) avec 35 consultations pour bronchiolite soit 5,7% de l'activité totale des associations SOS médecins de la région pour les moins de 2 ans.
- **Oscour®** : Activité en baisse en S07 avec 219 passages soit 8,8% de l'activité totale des SAU de la région contre 9,5% la semaine passée. Sur les 219 passages aux urgences, 96 (44%) ont été hospitalisés. La bronchiolite était responsable de 21% des hospitalisations chez les moins de 2 ans (en diminution).
- **Données de virologie jusqu'en semaine 04 (source : CNR Virus des infections respiratoires)** : le nombre de VRS isolés est en forte baisse dans la région avec 55 VRS isolés en S06 soit un taux de positivité de 3,7% (en diminution par rapport à la semaine précédente).




Figure 1- Evolution hebdomadaire du nombre de consultations (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, SOS Médecins, ARA 2015-2018.




Figure 2- Evolution hebdomadaire du nombre de passages (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, Oscour®, ARA 2015-2018.

Semaine	Nombre d'hospitalisations	Pourcentage de variation (S-1)	Part de la bronchiolite parmi les hospitalisations (%)
2018-S06	126	-13,7%	25,6
2018-S07	96	-23,8%	20,9

Tableau 1- Hospitalisations pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, Oscour®, ARA, ces deux dernières semaines.

### Consulter les données nationales :

Surveillance de la bronchiolite : [cliquez ici](#)

### Prévention de la bronchiolite

La **bronchiolite** est une maladie respiratoire qui touche les enfants de moins de 2 ans. Elle est due à un virus, le plus souvent le virus respiratoire syncytial (VRS), qui se transmet facilement d'une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements, et peut rester sur les mains et les objets (comme sur les jouets, les tétines, les « doudous »).

#### La prévention de la bronchiolite repose sur les mesures d'hygiène :

- le lavage des mains de toute personne qui approche le nourrisson, surtout avant de préparer les biberons et les repas ;
- éviter autant que possible d'emmener son enfant dans les lieux publics très fréquentés et confinés (centres commerciaux, transports en commun, hôpitaux, ...)
- le nettoyage régulier des objets avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines,...)
- l'aération régulière de la chambre
- éviter le contact avec les personnes enrhumées et les lieux enfumés.

Recommandations sur les mesures de prévention : [cliquez ici](#)

# GASTRO-ENTERITES ET DIARRHEES AIGUES

La région Auvergne-Rhône-Alpes est en phase post-épidémique :

## Synthèse des données disponibles

- **SOS Médecins** : Activité en légère augmentation par rapport à la semaine précédente avec 533 consultations pour GEA soit **7,2%** de l'activité totale ; activité en-dessous de celle observée l'année précédente à la même période. La part des moins de 5 ans représentait 22% (n=116) des consultations.
- **Oscour®** : Activité également en hausse par rapport à la semaine précédente avec 593 passages pour GEA soit près de **1,8%** de l'activité totale ; activité en-dessous de celle observée l'année précédente à la même période. La part des moins de 5 ans, représentait plus de la moitié des passages (61,4%, n=364).
- **Réseau Sentinelles** : Incidence régionale des diarrhées aiguës vues en consultation de médecine générale en augmentation, avec en semaine 07 : **130 cas pour 100 000 habitants (IC [90 – 170])**.
- **Surveillance des GEA en EHPAD** : Depuis début octobre 2017, 129 cas groupés de GEA ont été signalés en ARA, soit 7 épisodes supplémentaires depuis le dernier bilan.
- **Données de virologie** : Depuis la semaine 40, 23 norovirus et 5 rotavirus ont été isolés parmi les épisodes survenus en Ehpad.




Figure 3- Evolution hebdomadaire du nombre de consultations (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour GEA, SOS Médecins, ARA, 2015-2018.



Figure 4- Evolution hebdomadaire du nombre de passages (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour GEA, Oscour®, ARA, 2015-2018.




Figure 5- Incidence hebdomadaire régionale (pour 100 000 hab.) des diarrhées aiguës, Réseau Sentinelles, ARA, 2015-2018.




Figure 6- Nombre hebdomadaire de cas groupés de GEA signalés par les EHPAD, ARA, 2015-2018.

GEA en EHPAD	
<b>Episodes</b>	
Nombre de foyers signalés	129
Nombre de foyers clôturés	114
Taux de foyer clôturés	88,4%
<b>Recherche étiologique</b>	
Recherche effectuée	66
Norovirus confirmé	23
Rotavirus confirmé	5
<b>Résidents - Episodes clôturés</b>	
Nombre total de résidents malades	3021
Taux d'attaque moyen	31,1%
Nombre d'hospitalisations en unité de soins	17
Taux d'hospitalisation moyen	0,6%
Nombre de décès	5
Létalité moyenne	0,2%
<b>Personnel - Episodes clôturés</b>	
Nombre total de membres du personnel malades	611
Taux d'attaque moyen	7,6%

Tableau 2- Caractéristiques des cas groupés de GEA signalés par les EHPAD, ARA, saison 2017-2018.

**Consulter les données nationales :**

Surveillance de la gastro-entérite : [cliquez ici](#)

**Prévention de la gastro-entérite**

**Les GEA hivernales** sont surtout d'origine virale. Elles se manifestent, après une période d'incubation variant de 24 à 72 heures, par de la diarrhée et des vomissements qui peuvent s'accompagner de nausées, de douleurs abdominales et parfois de fièvre. La durée de la maladie est généralement brève, de l'ordre de quelques jours. La principale complication est la déshydratation aiguë qui survient le plus souvent aux âges extrêmes de la vie.

**La prévention des GEA repose sur les mesures d'hygiène :**

Hygiène des mains et des surfaces : le mode de transmission oro-fécal principal des virus conditionne en grande partie les mesures de prévention et de contrôle des gastro-entérites virales basées sur l'application de mesures d'hygiène. Les mains constituent le vecteur le plus important de la transmission et nécessite de ce fait un nettoyage au savon soigneux et fréquent. De même, certains virus (rotavirus et norovirus) étant très résistants dans l'environnement et présents sur les surfaces, celles-ci doivent être nettoyées soigneusement et régulièrement dans les lieux à risque élevé de transmission (services de pédiatrie, institutions accueillant les personnes âgées) ([Guide HCSP 2010](#)).

Lors de la préparation des repas : application de mesures d'hygiènes strictes (lavage soigneux des mains) avant la préparation des aliments et à la sortie des toilettes, en particulier dans les collectivités (institutions accueillant des personnes âgées, services hospitaliers, crèches), ainsi que l'éviction des personnels malades (cuisines, soignants, etc.) permet d'éviter ou de limiter les épidémies d'origine alimentaire.

[Recommandation sur les mesures de prévention de la déshydratation chez les jeunes enfants : cliquez ici](#)

# GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL

## Synthèse des données disponibles : 9<sup>ème</sup> semaine épidémique en Auvergne-Rhône Alpes.

- **SOS Médecins** : Activité en diminution avec 833 consultations (*versus* 1109 la semaine précédente) soit 11,2% de l'activité totale.
- **Oscour®** : Activité en diminution avec 675 passages *versus* 752 en semaine précédente, soit 2,1% de l'activité totale. 19% des passages pour grippe ont fait l'objet d'une hospitalisation en S07.
- **Réseau Sentinelles** : Activité en légère hausse avec une incidence estimée à 300 cas pour 100 000 habitants (IC:[239-361]).
- **Données de virologie (source CNR Virus des infections respiratoires – réseau Sentinelles)** : Depuis la semaine 40, 229 virus grippaux ont été isolés : 80 A(H1N1)pdm09, 12 A(H3N2), 19 A non typé et 118 B. le taux de positivité reste à un niveau élevé (75%).
- **Surveillance des IRA en EHPAD** : Depuis le 1<sup>er</sup> octobre, 160 épisodes ont été signalés dont 25 sur les 2 dernières semaines (activité en augmentation). Parmi les 144 épisodes où une recherche étiologique a été effectuée, 97 ont mis en évidence un virus grippal.
- **Surveillance des cas graves de grippe** : 277 cas graves de grippe ont été signalés, dont 39 lors des 15 derniers jours.

Consulter les données nationales : Surveillance de la grippe: [cliquez ici](#)




Figure 7- Evolution hebdomadaire du nombre de consultations (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour grippe, SOS Médecins, ARA 2015-2018.




Figure 8- Evolution hebdomadaire du nombre de passages (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour grippe, Oscour®, ARA 2015-2018.




Figure 9- Evolution hebdomadaire du taux d'incidence des syndromes grippaux, Réseau Sentinelles, ARA, 2015-2018.

### Prévention de la grippe et des syndromes grippaux

- **La vaccination** est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications. Un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé.

Pour plus d'information, consultez le site [Vaccination info service](#)

- **Les mesures barrières**
  - Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro- alcoolique
  - Porter un masque quand on présente un syndrome grippal
  - Limiter les contacts avec les personnes malades
  - Aérer son logement chaque jour pour en renouveler l'air

Recommandations sur les mesures de prévention : [cliquez ici](#)

Des vidéos pour comprendre la grippe : symptômes, transmission gestes de prévention pour se protéger et protéger les autres sont disponibles [ici](#)




Figure 10 - Nombre hebdomadaire de cas groupés d'IRA signalés par les Ehpads, ARA, 2015-2018.




Figure 11 - Nombre hebdomadaire des cas graves de grippe, ARA, 2015-2018.

IRA en Ehpads	
<b>Episodes</b>	
Nombre de foyers signalés	160
Nombre de foyers clôturés	122
Taux de foyer clôturés	76,3%
<b>Recherche étiologique</b>	
Recherche effectuée	144
Grippe confirmée	97
Grippe A	19
Grippe B	57
Recherche en cours / non typage	21
VRS confirmé	3
Autre virus confirmé (Adéno, Méta pneumo, Rhino)	4
<b>Résidents - Episodes clôturés</b>	
Nombre total de résidents malades	2210
Taux d'attaque moyen	19,0%
Nombre d'hospitalisations en unité de soins	99
Taux d'hospitalisation moyen	4,5%
Nombre de décès	84
Létalité moyenne	3,8%
<b>Personnel - Episodes clôturés</b>	
Nombre total de membres du personnel malades	323
Taux d'attaque moyen	3,8%

Tableau 3- Caractéristiques des cas groupés d'IRA signalés par les Ehpads, ARA, saison 2017-2018.

	Effectif	%
<b>Statut virologique</b>		
A (H3N2)	11	4,0%
A (H1N1)pdm09	71	25,6%
A non sous-typé	90	32,5%
B	103	37,2%
Co-infectés	1	0,4%
Non confirmés	1	0,4%
<b>Classe d'âge</b>		
0-4 ans	19	6,9%
5-14 ans	8	2,9%
15-64 ans	108	39,0%
65 ans et plus	142	51,3%
Non renseigné	0	0,0%
<b>Sexe</b>		
Sexe Ratio (H/F) - % d'hommes	1,9	
<b>Facteurs de risque de complication</b>		
Aucun	60	21,7%
Grossesse sans autre comorbidité	1	0,4%
Obésité (IMC ≥ 40) sans autre comorbidité	3	1,1%
Autres cibles de la vaccination	213	76,9%
Non renseigné		0,0%
<b>Statut vaccinal</b>		
Non Vacciné	155	56,0%
Vacciné	54	19,5%
Non renseigné ou ne sait pas	68	24,5%
<b>Gravité</b>		
SDRA (Syndrome de détresse respiratoire aigu)	174	62,8%
Mineure*	25	14,4%
Modéré*	61	35,1%
Sévère*	88	50,6%
Décès	42	15,2%
<b>Prise en charge</b>		
Ventilation non invasive	69	24,9%
Oxygénothérapie à haut débit	64	23,1%
Ventilation invasive	136	49,1%
ECMO (Oxygénation par membrane extra-corporelle)	4	1,4%
ECCO2R (Epuration extracorporelle du CO2)	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>277</b>	

\* Pourcentage rapporté au nombre de SDRA

Figure 3- Caractéristiques des cas graves de grippe – saison 2017-18

# MORTALITE TOUTES CAUSES

## Synthèse des données disponibles

Après la hausse observée en semaines 01 et 02, les nombres de décès toutes causes observés tous âges et chez les 65 ans ou plus, se situaient dans des marges de fluctuation habituelle sur cette période pour les semaines 03 à 06 (du 05/02 au 11/02/2018) (**Figure 10**).

Compte-tenu des délais habituels de transmission des données, les effectifs de mortalité observés pour les 3 semaines précédentes sont encore incomplets. Il convient donc de rester prudent dans l'interprétation de ces observations.

Au plan national, l'excès de mortalité hivernale toutes causes entre la semaine 49-2017 et la semaine 04-2018 est estimé à 8% soit 7800 décès dont 6000 sont attribués à la grippe. En ARA, un excès de mortalité toutes causes de 6% est observé entre la semaine 49-2017 et la semaine 02-2018.

### Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour, SOS Médecins, Mortalité) : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la mortalité : [cliquez ici](#)




Figure 10- Nombre hebdomadaire de décès toutes causes et tous âges confondus.

# MORBIDITE

## Synthèse des données disponibles.

- **Surveillance ambulatoire**

L'activité des associations SOS Médecins est stable sur l'ensemble de la région tous âges confondus par rapport à la semaine précédente.

- **Surveillance hospitalière**

L'activité hospitalière reste également stable sur l'ensemble de la région tous âges confondus par rapport à la semaine précédente, on observe cependant une augmentation de l'activité pour les plus de 75 ans.

Zone	SOS						SAU					
	Moins de 15 ans		75 ans ou plus		Tous âges		Moins de 15 ans		75 ans ou plus		Tous âges	
Ain	-	-	-	-	-	-	9701	↘	6388	→	44704	→
Allier	-	-	-	-	-	-	471	→	371	→	2394	→
Ardèche	-	-	-	-	-	-	148	→	426	→	1752	→
Cantal	-	-	-	-	-	-	246	→	250	→	1483	→
Drôme	-	-	-	-	-	-	191	→	174	→	973	→
Isère	483	→	66	↘	1387	↘	743	→	522	→	3107	→
Loire	246	↘	211	→	1104	→	1682	→	923	→	6476	→
Haute-Loire	-	-	-	-	-	-	1231	↘	785	→	5440	↘
Puy-de-Dôme	272	→	153	→	1111	→	134	↘	189	→	853	→
Rhône	565	→	310	→	2163	→	686	→	414	→	2936	→
Savoie	232	→	97	→	747	→	1911	↘	1296	→	9691	↘
Haute-Savoie	333	→	76	→	905	→	866	→	454	→	3680	→
<b>Auvergne-Rhône-Alpes</b>	<b>2 227</b>	<b>→</b>	<b>956</b>	<b>→</b>	<b>7 686</b>	<b>→</b>	<b>96</b>	<b>→</b>	<b>43</b>	<b>↗</b>	<b>269</b>	<b>→</b>

Figure 11- Nombre de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins sur la semaine précédente et évolution par rapport aux 12 semaines précédentes - SurSaUD®, Santé publique France

# QUALITE DES DONNEES

## Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance sanitaire dit syndromique a vu le jour en 2003 et est coordonné par Santé Publique France. Il couvre actuellement environ 88% de l'activité des services d'urgences en France, 90% de l'activité SOS Médecins, 80% des décès quotidiens et 6% de la certification électronique des décès. Les données des consultations sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- **les données des associations SOS Médecins de Grenoble, St Etienne, Clermont-Ferrand, Lyon, Chambéry et Annecy** : Ces associations assurent une activité de continuité et de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et les médecins traitants. Ses médecins interviennent 24h/24, en visite à domicile ou en centre de consultation.

- **les données des services d'urgences des établissements hospitaliers** (Oscour - Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) : Les urgentistes consultent 24h/24 au sein de l'établissement de santé. Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi des données à Santé Publique France sous forme de Résumé de Passage aux Urgences (RPU).

- **la mortalité « toutes causes » est suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'Etat-civil dans les communes informatisées de la région (qui représente près de 80 % des décès de la région)** :

Un projet européen de surveillance de la mortalité, baptisé Euromomo (<http://www.euromomo.eu>), permet d'assurer un suivi de la mortalité en temps réel et de coordonner une analyse normalisée afin que les signaux entre les pays soient comparables. Les données proviennent des services d'état-civil et nécessitent un délai de consolidation de plusieurs semaines. Ce modèle permet notamment de décrire « l'excès » du nombre de décès observés pendant les saisons estivales et hivernales. Ces « excès » sont variables selon les saisons et sont à mettre en regard de ceux calculés les années précédentes.

- **les données de certification des décès (CépiDc - Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès, Inserm)** : Le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis aux agences régionales de santé (ARS) et au CépiDc de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) par voie papier ou voie électronique puis à Santé Publique France.

Liens utiles :

- [Santé Publique France](#)

- [BVS SurSaUD Rhône-Alpes](#) (2015)

- [BVS SurSaUD Auvergne](#) (2014)

### □ Les regroupements syndromiques suivis sont composés :

- Pour la grippe ou syndrome grippal : codes J09, J10, J11 et leurs dérivés selon la classification CIM-10 de l'Organisation mondiale de la santé ;
- Pour la bronchiolite : codes J210, J218 et J219, chez les enfants de moins de 2 ans ;
- Pour la GEA : codes A08, A09 et leurs dérivés.

□ Pour les regroupements syndromiques précédents, depuis la saison hivernale 2016-2017, la définition des périodes épidémiques est basée sur la combinaison de méthodes statistiques appliquées à deux ou trois sources de données (SOS Médecins, Oscour® et, selon la pathologie, réseau Sentinelles). Sont appliquées jusqu'à trois méthodes statistiques, selon les conditions d'application : (i) un modèle de régression périodique (dit de « *Serfling* ») sur 5 ans d'historique avec écrêtage des journées présentant les valeurs les plus élevées (ii) un modèle de régression périodique « robuste » avec pondération des journées selon leur valeur et (iii) un modèle

Nombre d'associations et de structures d'urgence participant sur la semaine 47 et taux de codage des diagnostics au niveau régional :

Semaine	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Etablissements inclus dans l'analyse des tendances	<b>7/7 associations</b>	<b>85/88 structures d'urgence</b>
Taux de codage du diagnostic sur la semaine précédente sur ces établissements	<b>97,0 %</b>	<b>92,6 %</b>

## Le point épidémiolo

### Remerciements à nos partenaires :

- Services d'urgences du réseau Oscour®,
- Associations SOS Médecins de Grenoble, St Etienne, Clermont-Ferrand, Lyon, Chambéry, Annecy
- Services de réanimation (Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation),
- Le Réseau Sentinelles de l'Inserm et son antenne régionale en ARA basée au CH de Firminy,
- Le CNR Virus des infections respiratoires (Laboratoire de Virologie-Institut des Agents Infectieux, Lyon)
- Les établissements hébergeant des personnes âgées
- Les SAMU
- Les mairies et leur service d'état civil qui transmettent en continu les déclarations de décès à l'INSEE
- L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
- L'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance
- Les équipes de l'ARS ARA notamment celles chargées de la veille sanitaire et de la santé environnementale

Retrouvez nous sur : [santepubliquefrance.fr](http://santepubliquefrance.fr)

Twitter : @sante-prevention



### Directeur de la publication

François Bourdillon  
Directeur général  
Santé publique France

### Responsable de la Cire

Christine SAURA

### Comité de rédaction

Delphine CASAMATTA

Sylvette FERRY

Erica FOUGERE

Meghann GALLOUCHE

Philippe PEPIN

Isabelle POUJOL

Guillaume SPACCAFERRI

Garance TERPANT

Alexandra THABUIS

Emmanuelle VAISSIERE

Jean-Marc YVON

### Diffusion

Cire Auvergne-Rhône-Alpes

Tél. 04.72.34.31.15

[ars-ara-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-ara-cire@ars.sante.fr)

