


**Surveillance des épidémies hivernales**

**BRONCHOLITE (MOINS DE 2 ANS)**




**Évolution régionale :**

Activité en baisse,  
épidémie terminée

[Page 2](#)

**GASTRO-ENTERITE**




**Évolution régionale :**

Activité en légère hausse,  
4<sup>ème</sup> semaine post-épidémique

[Page 2](#)

**GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL**



**Évolution régionale :**

Activité en légère hausse,  
9<sup>ème</sup> semaine épidémique

[Page 2](#)

**Autres surveillances régionales**

**Mortalité toutes causes (données Insee)**

[Page 8](#)

La mortalité toutes causes, tous âges et pour les sujets de 65 ans ou plus, est en-dessous des valeurs attendues à cette période.

**Faits marquants**

**Calendrier des vaccinations 2018**

Le calendrier des vaccinations 2018 a été rendu public le 9 février. Il tient compte des nouvelles obligations vaccinales pour les enfants de moins de 2 ans. Il est accessible [ici](#).

**Grippe**

**Au niveau national :** L'épidémie de grippe stagne en France métropolitaine. Les virus de type B sont majoritaires depuis début février. De S49-2017 à S04-2018, l'excès de mortalité toutes causes et tous âges confondus est estimé à 7 800 décès, dont 6 000 attribuables à la grippe. L'efficacité du vaccin contre la grippe chez les personnes de 65 ans ou plus est modérée à élevée selon les premières estimations.

**Au niveau régional :** La région Centre-Val de Loire est passée en épidémie de grippe en S51-2017. Le pic a été atteint en S52-2017. Les indicateurs de recours aux soins stagnent. Un nombre important d'admissions en réanimation pour grippe grave a été signalé par rapport aux années précédentes.

**Rougeole**

**Au niveau national :** Entre le 1<sup>er</sup> novembre 2017 et le 12 février 2018, 387 cas de rougeole ont été déclarés en France, dont 269 (69,5 %) en région Nouvelle-Aquitaine. Ces 387 cas ont entraîné 83 hospitalisations (dont 6 en services de réanimation) et **1 décès** survenu en février. Entre 2008 et début 2018, 21 personnes sont mortes de la rougeole en France. Parmi elles, au moins 8 étaient des personnes jeunes présentant une contre-indication à la vaccination et dont les décès auraient pu être évités si elles avaient été protégées par un entourage vacciné. Plus d'informations sont disponibles [ici](#) et [ici](#).

**Au niveau régional :** Entre le 19 janvier et le 20 février 2018, 22 cas de rougeole ont été signalés à l'ARS Centre-Val de Loire : 18 en Indre-et-Loire et 4 en Eure-et-Loir. Parmi les cas, 18 sont des enfants (dont 3 bébés de moins d'1 an) et 4 sont des adultes (dont 1 femme enceinte). La majorité des cas a été enregistrée au sein de la communauté des gens du voyage. Des mesures préventives sont mises en œuvre autour des cas par l'ARS et ses partenaires, notamment la vaccination des sujets-contacts non ou insuffisamment vaccinés.

**Se protéger contre la rougeole : la vaccination ROR (rougeole-oreillons-rubéole)**

*La rougeole n'est pas une maladie bénigne : elle peut entraîner des complications respiratoires et neurologiques graves. De plus, elle est très contagieuse : 1 personne atteinte peut contaminer jusqu'à 20 personnes non vaccinées. La vaccination est la meilleure protection individuelle et collective.*

*Le calendrier vaccinal comporte l'injection d'une première dose de vaccin trivalent ROR à l'âge de 12 mois et d'une seconde dose à l'âge de 16-18 mois ; cette vaccination est obligatoire depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018. Un rattrapage vaccinal est recommandé pour tout sujet né depuis 1980 et âgé de plus de 18 mois non à jour dans ses vaccinations. La vaccination ROR est contre-indiquée pendant la grossesse.*

*L'éviction des cas est recommandée pendant toute la période de contagiosité, à savoir jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption. Un rattrapage vaccinal réalisé dans les 72 heures qui suivent le contact avec un cas peut éviter la survenue de la maladie chez le vacciné.*

**Personnes à risque : les femmes enceintes et les enfants de moins d'1 an (non ciblés par la vaccination) sont à risque de subir des formes graves de rougeole. Ils peuvent cependant être protégés indirectement par la vaccination de leur entourage.**

*L'information et la vigilance s'imposent aussi en population générale, avec information des praticiens et de leur patientèle, afin d'augmenter la couverture vaccinale et d'enrayer ces foyers épidémiques. La vaccination des professionnels de santé est essentielle.*

*Pour en savoir plus : [Calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales selon l'avis du Haut Conseil de la santé publique](#) et <http://www.info-rougeole.fr/vaccination.html>*

# BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans)

L'épidémie de bronchiolite est terminée en région Centre-Val de Loire.

## Synthèse des données disponibles :

- **SOS Médecins** : L'activité est en baisse en S07, avec 6 consultations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans, soit 3,6 % de l'activité pour cette classe d'âge. L'activité est inférieure à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Oscour®** : L'activité est en baisse en S07, avec 18 passages aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans, soit 4,9 % de l'activité pour cette classe d'âge. L'activité est comparable à celle observée l'année précédente sur la même période. La part de la bronchiolite parmi les hospitalisations est de 8,7 %.




Figure 1- Évolution hebdomadaire du nombre de consultations et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, SOS Médecins, Centre-Val de Loire, 2015-2018




Figure 2- Évolution hebdomadaire du nombre de passages et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, Oscour®, Centre-Val de Loire, 2015-2018

Semaine	Nombre d'hospitalisations	Pourcentage de variation (S -1)	Part de la bronchiolite parmi les hospitalisations
2018-S06	9	+200 %	16,1 %
2018-S07	4	-55 %	8,7 %

Tableau 1- Hospitalisations pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, Oscour®, Centre-Val de Loire

### Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, mortalité) : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la bronchiolite : [cliquez ici](#)

## Prévention de la bronchiolite

La **bronchiolite** est une maladie respiratoire qui touche les enfants de moins de 2 ans. Elle est due à un virus, le plus souvent le virus respiratoire syncytial (VRS), qui se transmet facilement d'une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements, et peut rester sur les mains et les objets (jouets, tétines, doudous...).

### La prévention de la bronchiolite repose sur les mesures d'hygiène :

- **Se laver les mains** et demander à toute personne qui approche le nourrisson de se laver les mains, surtout avant de préparer les biberons et les repas ;
- **Éviter autant que possible d'emmener son enfant dans les lieux publics** très fréquentés et confinés (centres commerciaux, transports en commun, hôpitaux...);
- **Nettoyer régulièrement les objets** avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines...);
- **Aérer la chambre** régulièrement ;
- **Éviter le contact avec les personnes enrhumées** et les lieux enfumés.

Recommandations sur les mesures de prévention : [cliquez ici](#).

# GASTRO-ENTERITE ET DIARRHEES AIGUES

La région Centre-Val de Loire est en 4<sup>ème</sup> semaine post-épidémique pour la gastro-entérite et les diarrhées aiguës.

## Synthèse des données disponibles :

- **SOS Médecins** : L'activité est stable en S07, avec 184 consultations pour gastro-entérite aiguë (GEA), soit 6,2 % de l'activité totale. L'activité est inférieure à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Oscour®** : L'activité est en hausse en S07, avec 130 passages aux urgences pour GEA, soit 1,7 % de l'activité totale. L'activité est légèrement inférieure à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Réseau Sentinelles** : L'incidence des diarrhées aiguës vues en consultation de médecine générale est en hausse en S07, avec 154 cas pour 100 000 habitants (IC95% [102 ; 206]). L'incidence est supérieure à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Surveillance des GEA en Ehpad** : Les Ehpad de la région ont signalé 22 épisodes de cas groupés de GEA depuis le début de la surveillance en S40-2017.




Figure 3- Évolution hebdomadaire du nombre de consultations et proportion d'activité pour GEA, SOS Médecins, Centre-Val de Loire, 2015-2018




Figure 4- Évolution hebdomadaire du nombre de passages et proportion d'activité pour GEA, Oscour®, Centre-Val de Loire, 2015-2018




Figure 5- Incidence hebdomadaire régionale (pour 100 000 habitants) des diarrhées aiguës, Réseau Sentinelles, Centre-Val de Loire, 2015-2018

## Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, mortalité) : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la gastro-entérite : [cliquez ici](#)

## Prévention de la gastro-entérite

Les GEA hivernales sont surtout d'origine virale. Elles se manifestent, après une période d'incubation variant de 24 à 72 heures, par de la diarrhée et des vomissements qui peuvent s'accompagner de nausées, de douleurs abdominales et parfois de fièvre. La durée de la maladie est de l'ordre de quelques jours. La principale complication est la déshydratation aiguë qui survient le plus souvent aux âges extrêmes de la vie.

### La prévention des GEA repose sur les mesures d'hygiène :

- **Se laver soigneusement et fréquemment les mains** (eau et savon, ou produit hydro-alcoolique). Les mains constituant le vecteur le plus important de la transmission des virus entériques, c'est l'une des meilleures façons d'en limiter la transmission.
- **Nettoyer soigneusement et régulièrement les surfaces** à risque élevé de transmission (en particulier dans les services de pédiatrie et les institutions accueillant des personnes âgées). Certains virus sont très résistants dans l'environnement et sur les surfaces.
- **Lors de la préparation des repas, appliquer des mesures d'hygiène strictes** (lavage soigneux des mains) avant la préparation des aliments et à la sortie des toilettes (en particulier dans les collectivités : institutions accueillant des personnes âgées, services hospitaliers, crèches...) ; **l'éviction des personnels malades** (cuisines, soignants...) permet d'éviter ou de limiter les épidémies d'origine alimentaire.

La meilleure prévention des complications de la diarrhée aiguë est la **réhydratation précoce** à l'aide des solutés de réhydratation orale (SRO), en particulier chez le nourrisson.

Recommandations sur les mesures de prévention : [cliquez ici](#).

**La région Centre-Val de Loire est en phase épidémique pour la 9<sup>ème</sup> semaine consécutive.**

## Synthèse des données disponibles :

- **SOS Médecins** : L'activité est en hausse en S07, avec 143 consultations pour grippe, soit 4,9 % de l'activité totale. L'activité est supérieure à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Oscour®** : L'activité est en hausse en S07, avec 85 passages aux urgences pour grippe, soit 1,0 % de l'activité totale. L'activité est supérieure à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Réseau Sentinelles** : L'incidence des syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale est en hausse en S07, avec 167 cas pour 100 000 habitants (IC95% [114 ; 220]). L'incidence est supérieure par rapport à celle observée l'année précédente sur la même période.
- **Surveillance des IRA en Ehpad** : Les Ehpad de la région ont signalé 35 épisodes de cas groupés d'IRA depuis le début de la surveillance en S40-2017, dont 4 en S07-2018.
- **Surveillance des cas graves en réanimation** : Les services de réanimation et les unités de soins continus du CHRU de Tours et du CHR d'Orléans ont signalé 82 cas graves de grippe depuis le début de la surveillance en S45-2017, dont 4 en S07-2018. Parmi ces cas, 64 sont en lien avec une grippe de type A et 16 avec une grippe de type B (non typé pour 2 cas). Deux cas concernent des enfants de moins de 15 ans. Plus de la moitié des cas ont été admis en réanimation au cours des semaines 52-2017 et 01-2018.




Figure 6- Évolution hebdomadaire du nombre de consultations et proportion d'activité pour grippe, SOS Médecins, Centre-Val de Loire, 2015-2018




Figure 7- Évolution hebdomadaire du nombre de passages et proportion d'activité pour grippe, Oscour®, Centre-Val de Loire, 2015-2018




Figure 8- Incidence hebdomadaire régionale (pour 100 000 habitants) des syndromes grippaux, Réseau Sentinelles, Centre-Val de Loire, 2015-2018

### Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, mortalité) : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la grippe : [cliquez ici](#)

## Prévention de la grippe

**La grippe** est une infection respiratoire aiguë, contagieuse, due aux virus *Influenzae*. Les virus grippaux se répartissent essentiellement entre 2 types, A et B, se divisant eux-mêmes en deux sous-types. Les virus de la grippe se transmettent de personne à personne par les sécrétions respiratoires à l'occasion d'éternuements ou de toux. Ils peuvent également se transmettre par contact avec des objets contaminés. Les lieux confinés et très fréquentés sont propices à la transmission de ces virus.

### La prévention de la grippe repose sur :

- **Les mesures d'hygiène simples :**

- Concernant le malade, il est recommandé, dès le début des symptômes, de : - limiter les contacts avec d'autres personnes et en particulier les personnes à risque ; - se couvrir la bouche à chaque fois qu'il tousse ; - se couvrir le nez à chaque fois qu'il éternue ; - se moucher dans des mouchoirs en papier à usage unique jetés dans une poubelle recouverte d'un couvercle ; - ne cracher que dans un mouchoir en papier à usage unique jeté dans une poubelle recouverte d'un couvercle. Tous ces gestes doivent être suivis d'un lavage des mains à l'eau et au savon ou, à défaut, avec un produit hydro-alcoolique.
- Concernant l'entourage du malade, il est recommandé de : - éviter les contacts rapprochés avec les personnes malades, en particulier quand on est une personne à risque ; - se laver les mains à l'eau et au savon après contact avec le malade ou le matériel utilisé par le malade ; - nettoyer les objets couramment utilisés par le malade.

- **La vaccination :** elle est recommandée pour toutes les personnes de 65 ans et plus, pour certaines personnes considérées comme fragiles car souffrant de pathologies chroniques (affections respiratoires ou cardiovasculaires, diabète, obésité morbide...), pour les femmes enceintes afin qu'elles se protègent elles-mêmes et protègent leur enfant, ainsi que pour l'entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque graves.

Recommandations sur les mesures de prévention : [cliquez ici](#).

Des vidéos pour comprendre la grippe : symptômes, transmission gestes de prévention pour se protéger et protéger les autres : [cliquez ici](#).


Devenez acteur de la surveillance de la grippe : [cliquez ici](#).

GrippeNet.fr permet à chacun de participer à la surveillance et à la recherche sur la grippe en France, de façon anonyme, volontaire et directement en ligne. Pas besoin d'être malade pour participer !

# DONNEES DU RESEAU SENTINELLES


Le réseau Sentinelles, coordonné par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC), et en collaboration avec Santé publique France, permet le recueil, l'analyse, la prévision et la redistribution de données épidémiologiques hebdomadaires issues de l'activité des médecins généralistes libéraux sur le territoire métropolitain.

## Données nationales du réseau Sentinelles



## Données de l'antenne Centre-Val de Loire du réseau Sentinelles

En S07, parmi les 61 médecins généralistes inscrits au réseau Sentinelles en région Centre-Val de Loire, 18 ont participé à la surveillance des indicateurs du réseau. L'activité rapportée par ces médecins était forte pour les syndromes grippaux, modérée pour les diarrhées aiguës, et faible pour la varicelle.



## Appel à participation

Vous êtes médecin généraliste et vous êtes sensible à l'épidémiologie et à la recherche en médecine générale, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur le réseau Sentinelles. Vous pouvez contacter Mathieu Rivière, l'animateur du réseau pour votre région aux coordonnées ci-dessous.

Mathieu Rivière



02 38 74 40 05




[mathieu.riviere@jplesp.upmc.fr](mailto:mathieu.riviere@jplesp.upmc.fr)

# SUIVI VIROLOGIQUE

**Au niveau national :** Malgré la baisse du nombre d'échantillons analysés, le pourcentage de détections positives pour grippe ne diminue pas : 23 % en S06, contre 19 % en S02. En médecine générale, les détections de virus grippaux sont stables à 62 % des prélèvements analysés. Les virus de la grippe B sont majoritaires et représentent 59 % des détections positives, contre 33 % pour les virus de la grippe A(H1N1)pdm09. Les détections des rhino/entérovirus et des VRS atteignent respectivement 12 % et 5 %. (Source : RENAL, Réseau national des laboratoires hospitaliers)

**Au niveau régional :** En S07, les virus circulants majoritairement identifiés au laboratoire de virologie du CHRU de Tours étaient le rhinovirus (19 %), le virus de la grippe B (14 %) et le virus de la grippe A (11 %).



Données issues de l'analyse des prélèvements respiratoires par PCR multiplex (Allplex™, Seegene)

**Figure 9- Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par le laboratoire de virologie du CHRU de Tours**

# MORTALITE TOUTES CAUSES

## Synthèse des données disponibles :

En S06, les données de l'Insee concernant la mortalité toutes causes (pour tous âges et pour les sujets de 65 ans ou plus) sont en-dessous des valeurs attendues à cette période.




Figure 10- Nombre hebdomadaire de décès toutes causes chez les personnes âgées de 65 ans ou plus, Insee, Centre-Val de Loire




Figure 11- Nombre hebdomadaire de décès toutes causes, tous âges, Insee, Centre-Val de Loire

## Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, mortalité) : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la mortalité : [cliquez ici](#)

# ANALYSE REGIONALE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Selon les prévisions, la qualité de l'air sera bonne en cette fin de semaine, avec un indice de qualité de l'air ATMO à 3-4.




Figure 12- Analyse régionale de la pollution atmosphérique

Source : Cartographie réalisée par Lig'Air - Ocarina/Prevair (<http://www.ligair.fr/cartographies>)

L'indice ATMO est calculé pour une journée et qualifie la qualité de l'air global pour une zone géographique.

Le calcul est basé sur les concentrations de 4 indicateurs de la pollution atmosphérique :

**ozone, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, particules en suspension.**

L'indice ATMO ou indicateur de la qualité de l'air est égal au plus grand des quatre sous-indices.

# ANALYSE REGIONALE DES SIGNAUX DE VEILLE ET D'ALERTE SANITAIRES

	Nombre de cas et localisation	Commentaires
<b>Maladies à déclaration obligatoire</b>		
<b>Hépatite A</b>	1 cas en Indre-et-Loire	1 homme de 72 ans
<b>Rougeole</b> (Attention : certains cas déclarés peuvent être infirmés par la suite en fonction des résultats d'analyses biologiques)	3 cas en Eure-et-Loir	1 fille de 11 ans 1 fille de 7 ans 1 garçon de 1 an
	11 cas en Indre-et-Loire	1 homme de 45 ans 1 homme de 38 ans 1 femme de 20 ans 1 adolescente de 16 ans 1 adolescent de 13 ans 1 fille de 4 ans 1 fille de 3 ans 1 garçon de 3 ans 1 fille de 2 ans 1 fille de 1 an 1 bébé à la naissance (rougeole néonatale)
<b>Toxi-infection alimentaire collective (Tiac)</b>	1 événement en Eure-et-Loir	3 personnes malades suite à la consommation d'un repas dans un restaurant
	1 événement en Indre-et-Loire	4 personnes d'une même famille malades suite à la consommation d'un repas surgelé
<b>Tuberculose</b>	1 cas dans le Cher	1 homme de 27 ans
	1 cas en Eure-et-Loir	1 femme de 87 ans
	1 cas dans l'Indre	1 homme de 27 ans
	2 cas dans le Loiret	1 femme de 72 ans 1 femme de 28 ans
	1 cas dans le Loir-et-Cher	1 homme de 33 ans
<b>Maladies sans déclaration obligatoire</b>		
<b>Infection invasive à streptocoques A</b>	1 cas dans le Loiret	1 personne de 72 ans
<b>Infection respiration aigüe (IRA) dans les collectivités de personnes âgées</b>	1 cas groupé en Eure-et-Loir	20 résidents et 2 personnels malades
	1 cas groupé dans l'Indre	11 résidents et 2 personnels malades
	1 cas groupé en Indre-et-Loire	16 résidents malades
	1 cas groupé dans le Loir-et-Cher	16 résidents et 1 personnel malades
<b>Expositions environnementales</b>		
<b>Présence de légionelles</b>	1 événement dans le Loiret	1 entreprise agro-alimentaire

Tableau 2- Synthèse des signalements d'événements sanitaires dans la région Centre-Val de Loire du 12/02/2018 au 18/02/2018

## Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès) :

Ce système de surveillance sanitaire dit syndromique a vu le jour en 2003 et est coordonné par Santé publique France. Il couvre actuellement environ 88 % de l'activité des services d'urgences en France, 90 % de l'activité SOS Médecins, 80 % des décès quotidiens et 6 % de la certification électronique des décès. Les données des consultations sont transmises quotidiennement à Santé publique France selon un format standardisé :

- **Les données des associations SOS Médecins** (Bourges, Orléans et Tours pour la région Centre-Val de Loire) : ces associations assurent une activité de continuité et de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et les médecins traitants. Ses médecins interviennent 24h/24, en visite à domicile ou en centre de consultation.
- **Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers** (Oscour® – Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) : les urgentistes consultent 24h/24 au sein de l'établissement de santé. Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi des données à Santé publique France sous forme de résumé de passage aux urgences (RPU). Les nombres sont calculés à établissements non constants.
- **La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées de la région (qui représente près 79 % des décès de la région)** : un projet européen de surveillance de la mortalité, baptisé EuroMOMO (<http://www.euromomo.eu>), permet d'assurer un suivi de la mortalité en temps réel et de coordonner une analyse normalisée afin que les signaux entre les pays soient comparables. Les données proviennent des services d'état-civil et nécessitent un délai de consolidation de plusieurs semaines. Ce modèle permet notamment de décrire « l'excès » du nombre de décès observés pendant les saisons estivales et hivernales. Ces « excès » sont variables selon les saisons et sont à mettre en regard de ceux calculés les années précédentes.
- **Les données de certification des décès** (CépiDc – Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis aux agences régionales de santé (ARS) et au CépiDc de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) par voie papier ou voie électronique, puis à Santé publique France.

**Les données de virologie** présentées ici sont les données transmises par le laboratoire de virologie du CHRU de Tours, issues de l'analyse des prélèvements respiratoires par PCR multiplex (Allplex™, Seegene). Les échantillons sont transmis par les services du CHRU ainsi que par différents établissements extérieurs (CH Amboise, Centre Bois-Gibert, CRF Bel Air, Maison de retraite de Beaune, CH Bourges, CH Blois, CHLS La Membrolle, Luynes SSR SEHPA, CH Chinon).

**La surveillance des cas graves de grippe** fait partie de la surveillance de la grippe en milieu hospitalier. En région Centre-Val de Loire, les professionnels des services de réanimation adultes et pédiatriques du CHRU de Tours et du CHR d'Orléans signalent à la Cire l'ensemble des patients admis dans leur service pour grippe (confirmée biologiquement ou suspectée devant une forme clinique grave sans autre étiologie identifiée, dont le tableau clinique et l'anamnèse évoquent le diagnostic de grippe).

**La surveillance des IRA et GEA en Ehpad** : le médecin coordonnateur ou la personne « référent épidémie » de chaque Ehpad signale à l'ARS via une fiche de signalement standardisée tout cas groupé d'IRA ou de GEA, défini comme la survenue d'au moins 5 cas d'IRA ou de GEA d'origine infectieuse dans un délai de 4 jours, parmi les personnes résidentes de l'établissement. La transmission à l'ARS se fait par mail à [ars45-alerte@ars-sante.fr](mailto:ars45-alerte@ars-sante.fr) ou par fax au 02 34 00 02 58.

## Les regroupements syndromiques suivis sont composés :

- Pour la grippe ou syndrome grippal : codes J09, J10, J11 et leurs dérivés selon la classification CIM-10 de l'Organisation mondiale de la santé ;
- Pour la bronchiolite : codes J210, J218 et J219, chez les enfants de moins de 2 ans ;
- Pour la GEA : codes A08, A09 et leurs dérivés.

Pour les regroupements syndromiques précédents, depuis la saison hivernale 2016-2017, la définition des périodes épidémiques est basée sur la combinaison de **méthodes statistiques** appliquées à 2 ou 3 sources de données (SOS Médecins, Oscour® et, selon la pathologie, réseau Sentinelles). Sont appliquées jusqu'à trois méthodes statistiques, selon les conditions d'application : (i) un modèle de régression périodique « de Serfling » sur 5 ans d'historique avec écrêtage des journées présentant les valeurs les plus élevées ; (ii) un modèle de régression périodique « robuste » avec pondération des journées selon leur valeur ; et (iii) un modèle de Markov.

## Point qualité des données – S07-2018

	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances = participation au dispositif depuis la semaine S40-2014	3 / 3 associations	24 / 25 services d'urgence
Taux de codage du diagnostic sur la semaine précédente sur ces établissements	93,4 %	46,9 %

## Le point épidémi

### Remerciements à nos partenaires :

- Les 25 services d'urgences du réseau Oscour®
- Les associations SOS Médecins de Bourges, Orléans et Tours
- Le réseau Sentinelles
- Les systèmes de surveillance spécifique :
  - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation
  - Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës et de gastro-entérites aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées
  - Analyses virologiques réalisées aux CHRU de Tours
- L'Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire et ses délégations départementales
- GCS Télésanté Centre
- Les Samu
- Les services d'état civil des 9 communes informatisées
- Lig'Air
- Météo France
- Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA)

Retrouvez nous sur : [santepubliquefrance.fr](http://santepubliquefrance.fr)  
Twitter : @sante-prevention



### Directeur de la publication

François Bourdillon  
Directeur général  
Santé publique France

### Responsable de la Cire

Dominique Jeannel

### Comité de rédaction

Aurélien Etienne  
Esra Morvan  
Jean-Rodrigue Ndong  
Isa Palloure  
Julie Wendling  
Marie Ansoborlo

### Diffusion

Cire Centre-Val de Loire  
Tél. 02 38 77 47 81  
[cire-cvl@santepubliquefrance.fr](mailto:cire-cvl@santepubliquefrance.fr)