



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



MARS 2021

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

GLANDES SALIVAIRES

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et le sexe et IC à 95%

	1 an			5 ans		
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
30 ans	95 [89;98]	100 [98;100]	98 [94;99]	79 [66;88]	97 [91;99]	89 [81;93]
40 ans	94 [89;97]	99 [97;100]	96 [94;98]	76 [66;83]	95 [90;98]	85 [80;89]
50 ans	92 [89;95]	98 [97;99]	95 [93;96]	71 [64;77]	91 [87;95]	80 [76;84]
60 ans	89 [86;92]	97 [95;98]	93 [90;94]	64 [57;71]	85 [79;89]	73 [68;78]
70 ans	85 [81;88]	93 [89;95]	88 [86;91]	56 [50;61]	71 [65;77]	63 [58;67]
80 ans	75 [70;80]	81 [76;86]	79 [75;82]	40 [33;46]	45 [36;53]	43 [37;48]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour Hommes et Femmes ensemble et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
30 ans	0,02 [0,01;0,06]	0,02 [0,01;0,05]	0,02 [0,01;0,05]	0,02 [0,01;0,04]	0,02 [0,01;0,06]
40 ans	0,03 [0,01;0,06]	0,03 [0,02;0,05]	0,03 [0,02;0,05]	0,03 [0,02;0,05]	0,03 [0,01;0,05]
50 ans	0,04 [0,02;0,07]	0,04 [0,03;0,06]	0,04 [0,03;0,06]	0,04 [0,03;0,06]	0,03 [0,02;0,05]
60 ans	0,06 [0,04;0,10]	0,06 [0,05;0,09]	0,06 [0,05;0,09]	0,05 [0,04;0,07]	0,03 [0,02;0,06]
70 ans	0,11 [0,08;0,16]	0,11 [0,08;0,14]	0,10 [0,08;0,13]	0,07 [0,05;0,09]	0,04 [0,02;0,06]
80 ans	0,24 [0,18;0,32]	0,21 [0,17;0,26]	0,18 [0,15;0,22]	0,09 [0,07;0,13]	0,04 [0,02;0,08]

Figure C1. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) (a) et survie nette (b) selon le temps depuis le diagnostic pour différents âges, chez l'homme et chez la femme




Figure C2. Survie nette à 1 et 5 ans selon l'âge au diagnostic avec IC à 95%, chez l'homme et chez la femme

