

Santé mentale

ANALYSE BIMESTRIELLE DES INDICATEURS SURVEILLÉS EN CONTINU

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

2 • 23/12/2021

Un suivi régional prospectif de la santé mentale est mis en place avec une analyse bimestrielle d'indicateurs de santé mentale issus des sources de données suivantes :

- Les passages aux urgences (Oscour®) et les actes médicaux SOS Médecins ;
- Les informations recueillies auprès de la population adulte par l'enquête COVIPREV.

Ces trois sources sont actuellement les seules exploitables dans un délai court après la collecte de données permettant une surveillance réactive et continue de l'évolution de la santé mentale de la population. Les autres sources de données disponibles pour la surveillance de la santé mentale font l'objet de bilans rétrospectifs annuels ou pluriannuels, avec un délai variable de consolidation des données allant de quelques mois à plus d'une année.

POINTS CLÉS

Données de passages aux urgences du réseau Oscour® :

- Le nombre moyen de passages pour troubles psychiques chez l'enfant en 2021 était supérieur aux 3 années précédentes (+50 %), principalement chez les 0-10 ans (respectivement ; +36 %, +67 % et +88 % par rapport à 2020, 2019 et 2018).
- Tous âges confondus, le nombre moyen de passages pour gestes suicidaires était supérieur aux 3 années précédentes (respectivement ; +10 %, +6% et +26 % par rapport à 2020, 2019 et 2018).

Données d'actes médicaux des associations SOS Médecins :

- Hausse des actes pour angoisses en 2021, comparée aux 3 années précédentes (respectivement, +15 %, +37 % et +39 % par rapport à 2020, 2019 et 2018).

ANALYSE SUR LES DEUX DERNIERS MOIS

Données des passages aux urgences du réseau Oscour® :

- Le nombre mensuel de passages pour troubles psychiques chez l'enfant en octobre-novembre 2021 était supérieur aux 2 mois précédents (+20 % par rapport à août-septembre 2021).
- Le nombre mensuel de passages pour gestes suicidaires tous âges confondus en octobre-novembre 2021 était supérieur aux 2 mois précédents (+17 % par rapport à août-septembre 2021).

Données des actes médicaux des associations SOS Médecins :

- Diminution du nombre mensuel d'actes pour angoisse (-48 %) et états dépressifs (-54 %), en octobre-novembre 2021 par rapport à août-septembre 2021 (à interpréter avec précaution en raison des faibles effectifs).

Données issues de l'enquête COVIPREV :

- Augmentation du score de satisfaction vie actuelle en vague 30 (30/11 au 07/12) par rapport à la vague précédente (28/10 au 05/11).

TROUBLES PSYCHIQUES / ADULTES

Evolution en 2020 et 2021 : En Centre-Val de Loire, la moyenne mensuelle des passages aux urgences pour troubles psychiques de l'adulte en 2020 était stable par rapport à 2019 (-2 %) mais supérieure à 2018 (+15 %). En 2020, le pic des passages aux urgences était enregistré pendant la période estivale (1 472 passages en août ; +8 % par rapport au mois précédent) (figure 1).


Sur la période de janvier – novembre 2021, la moyenne mensuelle de cet indicateur était comparable à 2020 (-2 %) et 2019 (-4 %) mais supérieure à 2018 (+17 %) à la même période (figure 1). Chez les 65 ans et plus, cet indicateur était comparable à 2020 (-6 %) et 2019 (+3 %) et en augmentation par rapport à 2018 (+23 %) (figure 2).

Evolution récente : Le nombre mensuel de passages en octobre - novembre 2021 était stable par rapport à août - septembre 2021 (-3,5 %) (figure 1).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

Centre-Val de Loire - Troubles psychiques / adultes (Oscour®)


Figure 1 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **18 ans ou plus**



COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

Centre-Val de Loire - Troubles psychiques / adultes (Oscour®)

Figure 2 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **par classe d'âges**



TROUBLES PSYCHIQUES / ENFANTS (<18 ANS)

Evolution en 2020 et 2021 : En Centre-Val de Loire, la moyenne mensuelle des passages aux urgences pour troubles psychiques de l'enfant sur l'année 2020 était stable par rapport à 2019 (+1,4 %) et 2018 (+3 %). Une augmentation des passages était observée entre mai et septembre (fin du premier confinement). Le pic des passages aux urgences a été enregistré en janvier (183 passages ; +48 % par rapport au mois précédent) (figure 3).


Sur la période de janvier – novembre 2021, la moyenne mensuelle de cet indicateur était supérieure à celles observées les 3 dernières années précédentes sur la même période (+50 %) (figure 3). Chez les 0-10 ans, cet indicateur était en augmentation par rapport aux 3 années précédentes (respectivement ; +36 %, +67 % et + 88 % par rapport à 2020, 2019 et 2018) (figure 4).

Evolution récente : Le nombre mensuel de passages en octobre - novembre 2021 était en augmentation par rapport à août - septembre 2021 (+20 %) (figure 3).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

Centre-Val de Loire - Troubles psychiques / enfants (<18 ans) (Oscour®)




Figure 3 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **chez les moins de 18 ans**



COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

Centre-Val de Loire - Troubles psychiques / enfants (<18 ans) (Oscour®)

Figure 4 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **par classe d'âges**



GESTE SUICIDAIRE

Evolution 2020-2021 : En Centre-Val de Loire, la moyenne mensuelle des passages aux urgences pour geste suicidaire sur l'année 2020 était stable par rapport à 2019 (- 3%) et supérieure à 2018 (+14 %). Le pic des passages aux urgences sur cette année a été enregistré en septembre (225 passages ; +26 % par rapport au mois précédent) (figure 5).


Sur la période de janvier - novembre 2021, la moyenne mensuelle de cet indicateur était supérieure aux 3 années précédentes sur la même période (respectivement ; +10 %, +6 % et +26 % par rapport à 2020, 2019 et 2018) (figure 5). La répartition par classes d'âge indiquait une augmentation de cet indicateur chez les 11-17 ans par rapport aux 3 années précédentes (respectivement ; +64 %, +44 % et +64 % par rapport à 2020, 2019 et 2018) (figure 6). Chez les 18 ans et plus, cet indicateur était stable par rapport aux 3 années précédentes sur la même période (figure 6).

Evolution récente : Le nombre mensuel de passages en octobre - novembre 2021 était en augmentation par rapport à août - septembre 2021 (+17 %) (figure 5).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

Centre-Val de Loire - Geste suicidaire (Oscour®)



Figure 5 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **tous âges à partir de 11 ans**



COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

Centre-Val de Loire - Geste suicidaire (Oscour®)

Figure 6 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **par classe d'âges**




IDÉES SUICIDAIRES

L'interprétation des données tous âges et par classes d'âge doit être prudente compte-tenu des effectifs faibles (figures 7 et 8). Cependant, il semble y avoir une augmentation des passages aux urgences pour idées suicidaires en 2021 chez les 11 ans et plus par rapport aux 3 années précédentes. Le nombre mensuel de passages en octobre – novembre 2021 pour cet indicateur était en augmentation par rapport à août – septembre 2021 (+21 %).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

Centre-Val de Loire - Idées suicidaires (Oscour®)


Figure 7 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **tous âges à partir de 11 ans**



COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

Centre-Val de Loire - Idées suicidaires (Oscour®)

Figure 8 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **par classe d'âges**



TROUBLES DE L'HUMEUR

Evolution en 2020 et 2021 : En Centre-Val de Loire, la moyenne mensuelle des passages aux urgences pour troubles de l'humeur sur l'année 2020 était stable par rapport à 2019 (+0,3 %) et supérieure à 2018 (+22 %). Le pic des passages aux urgences a été enregistré en janvier (259 passages ; +39 % par rapport au mois précédent) (figure 9).


La moyenne mensuelle pour cet indicateur sur la période de janvier à novembre 2021 était stable par rapport aux 2 dernières années (respectivement, +6 % par rapport à 2020 et 2019) et supérieure à 2018 sur la même période (+27 %). (figure 9). La répartition par classes d'âge indiquait une augmentation de la moyenne mensuelle des passages aux urgences par rapport aux 3 années précédentes chez les 0-17 ans (respectivement ; +71 %, +86 % et +64 % par rapport à 2020, 2019 et 2018) (figure 10).

Evolution récente : Le nombre mensuel de passages en octobre - novembre 2021 était stable par rapport à août - septembre 2021 (+2 %) (figure 9).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

Centre-Val de Loire - Troubles de l'humeur (Oscour®)


Figure 9 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **tous âges**



COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

Centre-Val de Loire - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Figure 10 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **par classe d'âges**



TROUBLES ANXIEUX

Evolution en 2020 et 2021 : En Centre-Val de Loire, la moyenne mensuelle des passages aux urgences pour troubles anxieux sur l'année 2020 était stable par rapport à 2019 (+0,4 %) et supérieure à 2018 (+12 %). Le pic des passages aux urgences a été enregistré en janvier (544 passages ; +25 % par rapport au mois précédent) (figure 11).


La moyenne mensuelle pour cet indicateur sur la période de janvier à novembre 2021 était stable par rapport à celles observées les 3 années précédentes sur la même période (respectivement ; -3,5 %, -2,9 % et +7,9 % par rapport à 2020, 2019 et 2018) (figure 11). La répartition par classes d'âge indiquait une augmentation de la moyenne mensuelle des passages aux urgences entre 2018 et 2021 chez les 0-17 ans (+29 %). Chez les 18 ans et plus, cet indicateur était comparable aux 3 années précédentes (respectivement ; -8 %, -6 % et +5 % en 2020, 2019 et 2018) (figure 12).

Evolution récente : Le nombre mensuel de passages en octobre - novembre 2021 était stable par rapport à août - septembre 2021 (-7,7 %) (figure 11).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

Centre-Val de Loire - Troubles anxieux (Oscour®)


Figure 11 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **tous âges**



COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

Centre-Val de Loire - Troubles anxieux (Oscour®)

Figure 12 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **par classe d'âges**



TROUBLES PSYCHOTIQUES

Evolution en 2020 et 2021 : En Centre-Val de Loire, la moyenne mensuelle des passages aux urgences pour troubles psychotiques sur l'année 2020 était stable par rapport à 2019 (+0,2 %) et supérieure à 2018 (+25 %). Le pic des passages a été enregistré en janvier (97 passages ; +2 % par rapport au mois précédent) (figure 13).


La moyenne mensuelle des passages aux urgences pour cet indicateur sur la période de janvier à novembre 2021 était stable par rapport à 2020 (+1,3 %) et 2019 (+5,3 %) mais supérieure à 2018 (+25,4 %) sur la même période (figure 13). La répartition par classes d'âge indiquait une augmentation de la moyenne mensuelle des passages aux urgences entre 2018 et 2019 (+16,4 %) puis un plateau en 2020 (+7 %) suivi d'un retour à la stabilisation en 2021 au niveau enregistré en 2018 (+0 % par rapport à 2018) (figure 14).

Evolution récente : Le nombre mensuel de passages en octobre - novembre 2021 était stable par rapport à août - septembre 2021 (+0 %) (figure 13).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

Centre-Val de Loire - Troubles psychotiques (Oscour®)


Figure 13 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **tous âges**



COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

Centre-Val de Loire - Troubles psychotiques (Oscour®)

Figure 14 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **par classe d'âges**




TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Une interprétation des données tous âges et par classes d'âge n'est pas possible en raison d'effectifs insuffisants (figures 15 et 16).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

Centre-Val de Loire - Troubles du comportement alimentaire (Oscour®)


Figure 15 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **tous âges**



COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

Centre-Val de Loire - Troubles du comportement alimentaire (Oscour®)

Figure 16 : Nombre mensuel de passages aux urgences pour les années 2018 à 2021, **par classe d'âges**



ANGOISSE

Une grève de SOS Médecins a amené à l'arrêt de la transmission des données de l'ensemble des associations à Santé publique France depuis le 24 novembre 2021. L'interprétation de ces données tous âges et par classes d'âge doit être prudente.

Evolution en 2020 et 2021 : En Centre-Val de Loire, la moyenne mensuelle des consultations pour angoisse sur l'année 2020 était supérieure à 2019 (+22 %) et 2018 (+23 %). Une légère augmentation progressive des consultations était observée à partir de mars 2020, début de l'épidémie de COVID-19, qui s'est poursuivie pendant le premier confinement (17 mars - 11 mai 2020) pour atteindre le pic annuel en juillet 2020 avec 207 consultations (figure 17). La majorité des consultations était observée chez les 18 ans et plus (96 %) (figure 18).


La moyenne mensuelle des consultations pour cet indicateur sur la période de janvier à novembre 2021 était supérieure aux trois années précédentes sur la même période (respectivement, +15 %, +37 % et +39 % par rapport à 2020, 2019 et 2018) (figure 17). Une interprétation des données chez les 0-17 ans n'est pas possible en raison d'effectifs insuffisants. En revanche chez les adultes, on note une augmentation de la moyenne mensuelle des consultations pour cet indicateur en 2021 par rapport aux 3 années précédentes (respectivement ; +17 %, +39 % et +42 % par rapport à 2020, 2019 et 2018) (figure 18).

Evolution récente : Le nombre mensuel de consultations en octobre - novembre 2021 était en diminution par rapport à août - septembre 2021 (-48 %) (figure 17).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

Centre-Val de Loire -angoisse (SOS Médecins)


Figure 17 : Nombre mensuel d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018 à 2021, **tous âges**



COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

Centre-Val de Loire -angoisse (SOS Médecins)

Figure 18 : Nombre mensuel d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018 à 2021, **par classe d'âges**



ETAT DÉPRESSIF

Une grève de SOS Médecins a amené à l'arrêt de la transmission des données de l'ensemble des associations à Santé publique France depuis le 24 novembre 2021. L'interprétation de ces données tous âges et par classes d'âge doit être prudente.

Evolution en 2020 et 2021 : En Centre-Val de Loire, la moyenne mensuelle des consultations pour états dépressifs sur l'année 2020 était supérieure aux deux années précédentes (respectivement, +14 % et +50 % en 2019 et 2018). Une hausse des consultations était observée pendant les saisons estivales et automnales, un pic des consultations était observé en octobre avec 76 consultations (figure 19). La majorité des consultations était observée chez les 18 ans et plus (99 %) (figure 20).


La moyenne mensuelle des consultations pour cet indicateur sur la période de janvier à novembre 2021 était inférieure à celles observées en 2020 (-32 %) et 2019 (-21 %) mais stable par rapport à 2018 sur la même période (+2 %) (figure 19). Une interprétation des données chez les 0-17 ans n'est pas possible en raison d'effectifs insuffisants. On note cependant une diminution de la moyenne mensuelle des consultations pour cet indicateur en 2021 chez les 18 ans et plus par rapport à 2020 (-31 %) et 2019 (-19 %) mais une stabilisation par rapport à 2018 (+6 %) (figure 20).

Evolution récente : Le nombre mensuel de consultations en octobre - novembre 2021 était en diminution par rapport à août - septembre 2021 (-54 %) (figure 19).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

Centre-Val de Loire - Etat dépressif (SOS Médecins)


Figure 19 : Nombre mensuel d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018 à 2021, **tous âges**



COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

Centre-Val de Loire - Etat dépressif (SOS Médecins)

Figure 20 : Nombre mensuel d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018 à 2021, **par classe d'âges**



TROUBLE DU COMPORTEMENT

Une grève de SOS Médecins a amené à l'arrêt de la transmission des données de l'ensemble des associations à Santé publique France depuis le 24 novembre 2021. L'interprétation de ces données tous âges et par classes d'âge doit être prudente.


Evolution en 2020 et 2021 : En Centre-Val de Loire, la moyenne mensuelle des consultations pour troubles du comportement sur l'année 2020 était stable par rapport aux deux années précédentes. Une légère augmentation des consultations était observée entre avril et mai (période du 1er confinement), un pic des consultations était observé durant cette période (figure 21). La majorité des consultations était observée chez les 18 ans et plus (93 %) (figure 22).

L'interprétation des données tous âges et par classes d'âge doit être prudente compte tenu des faibles effectifs (figures 21 et 22).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

Centre-Val de Loire - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Figure 21 : Nombre mensuel d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018 à 2021, **tous âges**



COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

Centre-Val de Loire - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Figure 22 : Nombre mensuel d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018 à 2021, **par classe d'âges**

En raison de très petits effectifs, les graphiques par classes d'âge ne sont pas interprétables.


INDICATEURS DE SANTE MENTALE EN POPULATION ADULTE

En vague 30 (30/11 – 07/12/2021), une baisse de la proportion des troubles anxieux était observée par rapport à la vague précédente (20 % contre 30 % en vague 29). Cependant, cette proportion était supérieure à celle observée à la fin du 3^{ème} confinement (13 % en vague 23). La proportion des troubles dépressifs était en baisse par rapport à la vague précédente (16 % contre 20 % en vague 29), à un niveau comparable à la fin du 3^{ème} confinement (17 % en vague 23) (figure 23). La satisfaction de vie en Centre-Val de Loire était à un niveau stable (82 %) depuis le 3^{ème} confinement (85 % en vague 23) mais supérieure à la vague précédente (73 % en vague 29). La prévalence des problèmes de sommeil suit une tendance stable (65 % en vague 30 contre 66 % en vague 29) et ce, depuis la fin du 3^{ème} confinement (68 % en vague 23). La proportion des pensées suicidaires relevées au cours des 12 derniers mois est stable depuis la mise en place de leur suivi en vague 21 (15-17 février 2021).

ENQUÊTE COVIPREV

Suivi des indicateurs de santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19, mars 2020 à décembre 2021, Centre-Val de Loire

Figure 23 : Évolution de la fréquence régionale des troubles anxieux et dépressifs, des problèmes de sommeil et du score de satisfaction de vie




Données : Coviprev. Traitement : Santé publique France.

ENQUÊTE COVIPREV

Suivi des indicateurs de santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19, mars 2020 à novembre 2021, Centre-Val de Loire

Figure 24 : Analyse par vagues regroupées en fonction de la période de l'épidémie des troubles anxieux et dépressifs et des problèmes de sommeil déclarés et du score de satisfaction de vie



(Source : Enquête CoviPrev 2020-2021, vagues 1 à 29)

Note de lecture :

Évolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation.

Lorsqu'un astérisque est associé à un regroupement de vagues (V1-V6 ; V7-V11 ; V12-V14 ; V15-V16), les proportions entre ce regroupement de vagues et le dernier regroupement de vagues (V17-V18) sont significativement différentes, test de Wald ajusté, * : $p < 0,05$; ** : $p < 0,01$; *** : $p < 0,001$

Le taux de personnes souffrant de dépression certaine est significativement plus important sur la période de mai-juin 2020 en comparaison à la période mars-avril 2020.

Les résultats du dernier regroupement d'enquêtes (vagues 28 - 29) ne permettent pas de mettre en évidence d'évolutions statistiquement significatives des indicateurs par rapport au regroupement précédent (vagues 26 - 27).

I INDICATEURS OSCOUR ET SOS MEDECINS

En 2021, le réseau Oscour® compte 680 services d'urgences participants et couvre 94,5 % des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions métropolitaines et Outre-Mer (à l'exception de la Martinique) est couvert. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est estimé à 2 jours au niveau national (à J+2, 99 % des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 80 %). En Centre-Val de Loire, 25 services d'urgence sont couverts soit 93% du nombre total régional. En 2020, 71 % des diagnostics étaient codés.

Indicateurs de passages aux urgences : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

En 2021, les données SOS Médecins sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions Métropoles (seulement la Martinique en Outre-Mer) sont couvertes. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est de 2 jours (à J+2, 100% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 94%). En Centre-Val de Loire, 3 associations SOS Médecins sont présentes : Bourges, Tours et Orléans. En 2020, 93% des diagnostics étaient codés.

Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

En complément de ces indicateurs, les actes SOS Médecins pour trouble du sommeil, intoxication éthylique, violence/agressivité et geste suicidaire ainsi que les passages aux urgences pour troubles des conduites et stress, font également l'objet d'une surveillance. Ces indicateurs présentent toutefois des évolutions comparables aux années précédentes (pour certains dans des effectifs très faibles) et qui ne semblent pas impactées par la pandémie de COVID-19. Toute évolution inhabituelle de ces indicateurs sera présentée dans le document, le cas échéant.

PASSAGES AUX URGENCES

- **Gestes suicidaires** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxications et lésions auto-infligées) ou probables (intoxications médicamenteuses, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée)
- **Idées suicidaires** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour des symptômes et signes relatifs à l'humeur de type Idées suicidaires
- **Troubles de l'humeur** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisodes dépressifs, trouble dépressif récurrent, troubles de l'humeur persistants et troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (notamment dépression postpartum). Les épisodes dépressifs représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles anxieux** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour troubles anxieux phobiques, autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixte) et autres (trouble obsessionnel compulsif ou TOC, troubles dissociatifs de conversion, troubles somatoformes et tétanie). Les passages pour autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixtes) représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles psychotiques** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour schizophrénie, trouble schizotypique, troubles délirants persistants, troubles psychotiques aigus et transitoire, troubles délirants induits, troubles schizo-affectifs, psychoses non organiques, autres symptômes et signes relatifs aux perceptions générales (hallucinations).
- **Trouble de l'alimentation** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, vomissements et autres troubles de l'alimentation.

Les deux indicateurs ci-après ont pour objectif de mettre en évidence une évolution inhabituelle des recours aux urgences en lien avec la santé mentale chez l'enfant ou chez l'adulte, en regroupant les passages aux urgences avec au moins un des diagnostics susceptibles d'être impactés par la crise sanitaire.

- **Troubles psychologiques de l'adulte** : cet indicateur global regroupe tous les passages aux urgences avec au moins un diagnostic parmi ceux inclus dans les indicateurs listés ci-dessus ou un parmi les diagnostics relatifs au stress (réaction aiguë à un facteur de stress, état de stress post-traumatique et troubles de l'adaptation), aux consommations de substances psychotropes ou aux troubles des conduites (trouble des conduites limité au milieu familial, type socialisé et mal socialisé, trouble oppositionnel avec provocation et autres troubles des conduites).
- **Troubles psychologiques de l'enfant** : cet indicateur global regroupe tous les passages aux urgences pour au moins des diagnostics suivants : symptômes et signes relatifs à l'humeur (notamment agitation et idées suicidaires) ; troubles anxieux (troubles panique, anxiété généralisée, trouble anxieux et dépressif mixte, troubles

somatoformes, troubles émotionnels débutant spécifiquement dans l'enfance) ; troubles de l'humeur (épisodes dépressifs, troubles dépressifs récurrents, troubles de l'humeur persistants, autres troubles de l'humeur) ; troubles des conduites et troubles mixtes des conduites et des émotions ; réaction à un facteur de stress sévère et troubles de l'adaptation ; troubles de l'alimentation ; autres troubles du comportement et autres troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance ou à l'adolescence.

ACTES MÉDICAUX SOS MÉDECINS

- Contrairement aux indicateurs Santé mentale produits à partir des urgences qui sont composés pour la plupart un regroupement de plusieurs diagnostics, les indicateurs issus des données SOS Médecins reflètent chacun un diagnostic unique, spécifié dans leur libellé.

I INDICATEURS COVIPREV CONCERNANT LA SANTÉ MENTALE DE L'ADULTE

- Depuis le 23 mars 2020, Santé publique France a lancé, avec le groupe BVA, l'enquête CoviPrev en population générale pour suivre et comprendre l'évolution des comportements (gestes barrières, confinement, consommation d'alcool et de tabac, alimentation et activité physique) et de la santé mentale (bien-être, troubles). La méthodologie de l'étude s'appuie sur des enquêtes quantitatives répétées sur des échantillons indépendants de 2 000 personnes âgées de 18 ans et plus, résidant en France métropolitaine et recrutés par access panel (Access Panel BVA). Les personnes participant à l'enquête complètent, en ligne sur système Cawi (Computer Assisted Web Interview), un questionnaire auto-administré. L'échantillonnage par quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelles du répondant, région, catégorie d'agglomération) est redressé sur le recensement général de la population 2016. Trente vagues d'enquêtes ont été réalisées à ce jour. En Centre-Val de Loire, le nombre de répondants par vague varie de 77 à 96.
- Les indicateurs de santé mentale suivis sont : les troubles anxieux et dépressifs, les problèmes de sommeil et un score de satisfaction de vie.



Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par les réseaux Oscour® et SOS Médecins :

- Les services d'urgences membres du réseau Oscour®
- La Fédération et les Observatoires Régionaux des Urgences (FEDORU et ORU), les concentrateurs régionaux de résumés de passages aux urgences (RPU)
- La Fédération SOS Médecins France et les associations SOS Médecins
- La Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)



Pour plus d'informations

Sur la surveillance de l'épidémie de COVID-19 :

[Dossier thématique: Infection à coronavirus](#)

[Points épidémiologiques COVID-19](#)

Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :

[Bulletins SURSAUD® \(SOS médecins, OSCOUR, Mortalité\)](#)

Sur la surveillance de la Santé mentale :

[CoviPrev : une enquête pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19](#)

Rappelons qu'en présence de signes de dépression (tristesse, perte d'intérêt, d'énergie) ou d'anxiété (tension, irritabilité), il est important de s'informer et d'en parler afin d'être conseillé sur les aides et les solutions disponibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches et à prendre conseil auprès de son médecin ou à appeler le **0 800 130 000** pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

Pour plus d'information sur la santé mentale et les ressources disponibles :

<https://www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale>

POINT ÉPIDÉMIO
SANTÉ MENTALE
Bimestriel
ÉDITION Centre-Val de Loire

Directrice de la
publication :

Pr Geneviève CHENE
Santé publique France

Santé mentale. Point
épidémiologique Centre-Val de
Loire bimensuel N°2.
Saint-Maurice : Santé publique
France.

