

# Surveillance de la grippe

Bulletin bimestriel : période du 29 mai au 10 septembre 2017

| GUYANE |

Le point épidémiologique — N° 08 / 2017

**Définition de cas :** un cas cliniquement évocateur de grippe est une personne qui présente depuis moins de 7 jours :  
- une température  $\geq 39^{\circ}\text{C}$  débutant de manière brutale  
- et au moins un signe respiratoire  
- et des myalgies


## Surveillance des syndromes grippaux

Entre fin mai et début septembre (S2017-22 à 36), le nombre hebdomadaire de consultations pour syndrome grippal\* est resté à un niveau relativement faible et stable, fluctuant entre 65 et 200 consultations hebdomadaires (Figure 1).

Ces valeurs correspondent aux niveaux observés en période inter-épidémique.

### | Figure 1 |

Nombre hebdomadaire de patients ayant présenté un syndrome grippal et ayant consulté un médecin généraliste ou ayant consulté dans les CDPS\*\*, Guyane, janvier 2015 à septembre 2017 / *Estimated weekly number of flu like syndrome diagnosed in GP clinics or health centres, French Guiana, January 2015 to September 2017*



\* L'estimation du nombre de syndromes grippaux est la somme du nombre de consultations enregistrées pour ce motif par les Centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS) et de l'estimation du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour ce motif (l'estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles).

\*\* La surveillance dans les CDPS concerne les cas de syndrome grippal et de bronchiolite.

## Analyse de la situation épidémiologique

L'activité liée aux syndromes grippaux est restée faible et stable sur l'ensemble du territoire de fin mai à début septembre.

Sur cette période, les virus grippaux B et A/H3N2 ainsi que du VRS ont été identifiés parmi les prélèvements analysés par le CNR des virus *Influenzae* de l'Institut Pasteur de la Guyane et par laboratoire de virologie du CHAR.

Par ailleurs, un seul cas grave a été admis en service de réanimation : ce cas âgé de moins de 40 ans, contaminé par le virus grippal B, lignage Yamagata, est décédé.

Afin de prévenir la maladie, il est essentiel de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, de se couvrir la bouche dès que l'on tousse ou que l'on éternue (dans sa manche ou dans un mouchoir à usage unique) et de penser à aérer son logement chaque jour afin de renouveler l'air.

### Nos partenaires

Remerciements à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS (Dr Philippe Tabard, Rocco Carlisi, Claire-Marie Cazaux, Khoudjia Larbi), l'infirmière régionale de Veille Sanitaire Hospitalière (Christelle Prince), le réseau de médecins généralistes sentinelles, les services hospitaliers (urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), les Centres délocalisés de prévention et de soins, le CNR des Virus *Influenzae* de l'Institut Pasteur de la Guyane, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.



Directeur de la publication

Dr François Bourdillon, directeur général de SpFrance

Rédacteur en chef

Franck Golliot, responsable par intérim de la Cire Guyane