

| Situation épidémiologique |

Chaque année, une recrudescence de gastro-entérite est observée à Mayotte entre juin et septembre. Dans ce contexte, plusieurs indicateurs sont suivis en routine :

- le nombre de consultations pour diarrhées aiguës chez les moins de 5 ans rapportés par les médecins du réseau sentinelle ;
- le nombre de passages pour gastro-entérite enregistrés dans le service d'urgences du Centre hospitalier de Mayotte (CHM) ;
- le nombre de ventes d'anti-diarrhéiques rapportées par le réseau de pharmaciens sentinelles.

Depuis plusieurs semaines, une augmentation globale de ces indicateurs est observée sur l'île.


Surveillance hospitalière

Une augmentation des passages pour gastro-entérite est observée sur le service d'urgences du CHM depuis le début du mois de juin. Au total, entre le 30 mai et le 17 juillet 2016, 453 passages pour gastro-entérite ont été rapportés. Les enfants âgés de moins de 10 ans représentaient 87% des recours pour gastro-entérite et parmi eux 70% avaient moins de 2 ans. Lorsque la variable hospitalisation était renseignée, près de 15% des recours pour gastro-entérite ont conduit à une hospitalisation.

Au cours de la semaine du 11 au 17 juillet 2016, 71 passages pour cette pathologie ont été enregistrés. Ces passages représentaient près de 11% de l'activité totale du service.

| Figure 1 |

Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite, service d'urgences du Centre hospitalier de Mayotte, 2014-2016



Surveillance médecins sentinelles

La part des consultations pour diarrhées aiguës chez les moins de 5 ans rapportée par les médecins sentinelles a suivi la même tendance que celle observée au niveau des urgences avec une augmentation à partir de la semaine 22 (30 mai au 5 juin 2016).

En semaine 27, les consultations pour diarrhées représentaient plus 6% des consultations toutes causes. Une diminution est observée pour la semaine 28, mais cette tendance doit être confirmée dans les semaines à venir notamment à la rentrée scolaire qui s'accompagne généralement d'une augmentation des consultations pour gastro-entérite.

Recrudescence des gastro-entérites

Enfants âgés de moins de 5 ans particulièrement touchés

Remerciements

Nous remercions l'ensemble des médecins sentinelles, des pharmaciens sentinelles et des professionnels de santé du service d'urgences du Centre Hospitalier de Mayotte pour leur participation au recueil de données du système de surveillance.

Liste de diffusion

Si vous souhaitez faire partie de la liste de diffusion des points épidémiologiques, envoyez un mail à ars-oi-cire@ars.sante.fr

Directeur de la publication :
François Bourdillon
Santé publique France

Rédacteur en chef :
Laurent Filleul, Responsable de la Cire océan Indien


Comité de rédaction :
Cire océan Indien
Elsa Balleydiér
Elise Brottet
Sophie Larrieu
Christine Larsen
Frédéric Pagès
Jean-Louis Solet
Pascal Vilain

Diffusion :
Cire océan Indien
2 bis, av. G. Brassens
CS 61002
97743 Saint Denis Cedex 9
Tel : +262 (0)2 62 93 94 24
Fax : +262 (0)2 62 93 94 57

Retrouvez-nous sur :
www.santepubliquefrance.fr

| Figure 2 |

Pourcentage hebdomadaire des consultations pour diarrhées aiguës chez les moins de 5 ans rapporté par le réseau de médecins sentinelles de Mayotte en 2016 (comparé à la période 2010-2015)




Surveillance pharmaciens sentinelles

Une augmentation des ventes d'anti-diarrhéiques est observée depuis la mi-juin. En semaine 28 (11 au 17 juillet), Le pourcentage de vente d'anti-diarrhéiques par rapport au nombre de clients s'élevait à 3,9% soit au-dessus des moyennes saisonnières 2014-2015.

| Figure 3 |

Pourcentage hebdomadaire des ventes d'anti-diarrhéiques par rapport aux nombres total de clients rapporté par le réseau des pharmacies sentinelles de Mayotte en 2016



| Recommandations |

ADOPTER DES MESURES D'HYGIENE pour se protéger et protéger son entourage :

- Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (avant de manger, après être allé aux toilettes ou à la salle de bains...)
- Éviter de se toucher la bouche ou le nez sans s'être lavé les mains au préalable
- Nettoyer les toilettes avec un désinfectant, après chaque diarrhée
- Si l'entourage a la diarrhée, le nettoyage des surfaces qui sont fréquemment touchées telles que les poignées de porte, le téléphone, les toilettes, les lavabos doit être plus fréquent et plus méticuleux
- Les essuie-mains doivent être changés régulièrement

CONSULTER UN MEDECIN en présence de signes de gastro-entérite (diarrhées, vomissements etc.).