

Surveillance des gastro-entérites

| GUADELOUPE |

Le point épidémiologique — N° 02/2012

Surveillance des cas cliniquement évocateurs

Au cours de la dernière semaine de décembre et de la 1^{ère} semaine de janvier, le nombre de consultations des médecins généralistes pour gastro-entérite a dépassé les valeurs maximales attendues pour la saison.


Cette augmentation s'est poursuivie de façon rapide au cours des 2^{ème} et 3^{ème} semaines de janvier, atteignant respective-

ment 1600 et 2300 cas estimés* (Fig.1). Cette situation est assez comparable à celle observée dans l'hexagone et dans une moindre mesure en Martinique.

*Le nombre de cas cliniques est une estimation pour l'ensemble de la population guadeloupéenne du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de gastro-entérites. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.

| Figure 1 |

Nombre hebdomadaire des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérite, Guadeloupe, octobre 2009 à janvier 2012



Surveillance des passages aux urgences

Cette augmentation est également observée par les services d'urgence du CHU et du CH de Basse-Terre.

Le nombre hebdomadaire de passages aux urgences recensés pour gastro-entérite

est en effet passé de 12 à 31 au cours des 4 dernières semaines.

Néanmoins, ces passages n'ont que rarement conduit à une hospitalisation : entre 0 et 2 par semaine.

Analyse de la situation

L'épidémie de gastro-entérites détectée en Guadeloupe il y a deux semaines s'est confirmée. Ce phénomène n'est pas inhabituel en cette période de début d'année et est également observé sur l'hexagone et en Martinique.

Pour limiter la transmission des virus à l'origine de ces épidémies, il est primordial d'appliquer les règles d'hygiène de base, notamment le lavage régulier des mains avec du savon, en particulier lors des soins aux personnes fragiles et avant les repas.

De plus, il est rappelé aux parents que si leurs enfants (en particulier les plus jeunes) présentent des symptômes de gastro-entérite (diarrhées, vomissements), ils doivent consulter leur médecin traitant afin d'éviter tout phénomène de déshydratation qui peut être sévère chez les nourrissons.

Remerciement à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS, réseau de médecins généralistes sentinelles, services hospitaliers (Urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), LABM ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.