

Surveillance des cas cliniquement évocateurs

Depuis la 3^{ème} semaine de décembre 2011, le nombre de consultations des médecins généralistes pour gastro-entérite est en augmentation.

Au cours de la dernière semaine de décembre et de la 1^{ère} semaine de janvier, ce nombre a dépassé les valeurs maximales attendues pour la saison avec, respectivement, 824 et 1141 cas estimés*.

Rappel de la définition de cas évocateurs de gastro-entérite :


Episode brutal de diarrhée avec ou sans fièvre, présentant au moins trois selles liquides dans les dernières 24 heures, avec ou sans déshydratation, avec ou sans vomissement.

Cette situation est assez comparable à celle observée dans l'hexagone et en Martinique où le nombre de consultations des médecins généralistes pour gastro-entérite a également dépassé le seuil épidémique au cours de la 1^{ère} semaine de janvier.

*Le nombre de cas cliniques est une estimation pour l'ensemble de la population guadeloupéenne du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de gastro-entérites. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.

| Figure 1 |

Nombre hebdomadaire des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérite, Guadeloupe, octobre 2009 à janvier 2012



Analyse de la situation

On observe actuellement le début d'une épidémie de gastro-entérites en Guadeloupe. Ce phénomène n'est pas inhabituel en cette période de début d'année et est également observé sur l'hexagone et en Martinique.

On peut rappeler que pour limiter la transmission des virus à l'origine de ce début d'épidémie, il est primordial d'appliquer les règles d'hygiène de base, notamment le lavage régulier des mains avec du savon.

De plus, il est rappelé aux parents que si leurs enfants (en particulier les plus jeunes) présentent des symptômes de gastro-entérite (diarrhées, vomissements), ils doivent consulter leur médecin traitant afin d'éviter tout phénomène de déshydratation qui peut être sévère chez les nourrissons.

Remerciement à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS, réseau de médecins généralistes sentinelles, services hospitaliers (Urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), LABM ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.