

Surveillance des gastro-entérites

| GUADELOUPE |

Le point épidémiologique — N° 05 / Semaine 2010-05

Surveillance des cas cliniquement évocateurs

Le nombre de consultations pour gastro-entérite en médecine de ville dépasse le niveau maximal attendu depuis maintenant huit semaines consécutives avec une augmentation importante (134%) au cours de la première semaine de janvier (Figure 1).

Ce nombre a légèrement diminué au cours de la troisième semaine de janvier (16%) mais il reste très supérieur aux valeurs maximales attendues.

Ainsi, on estime qu'un peu plus de 2 000 personnes ont consulté un médecin généraliste au cours de la semaine dernière (S2010-05) pour une gastro-entérite. Ce nombre est estimé à près de 14 600 depuis la troisième semaine de décembre (S2010-51).

Sur le plan clinique, les syndromes étaient caractérisés durant le mois de décembre par la présence de céphalées, ou parfois de syndromes méningés tant au niveau des services

des urgences (pédiatrie CHU et CHBT) que chez les patients des médecins sentinelles. Durant le mois de janvier, la présence de céphalées était beaucoup moins fréquente parmi les patients des médecins sentinelles ou des services des urgences.


Sur le plan biologique, les explorations réalisées par le laboratoire du CHU en lien avec le Centre national de référence montrent, pour les mois de décembre et janvier :

- 28 syndromes méningés avec présence confirmée d'un entérovirus dans le liquide céphalo-rachidien pour 11 d'entre eux ;
- le CNR a identifié l'Echovirus 30 pour trois de ces 11 cas (survenus en décembre).

*Le nombre de cas cliniques est une estimation pour l'ensemble de la population guadeloupéenne du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de gastro-entérites. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.

| Figure 1 |

Nombre hebdomadaire des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérites, Guadeloupe, novembre 2006 à février 2010



Analyse de la situation

L'épidémie de gastro-entérite se poursuit en Guadeloupe, sans modification notable de la dynamique épidémiologique. Une part au moins de ces syndromes semble être liée à la circulation d'un entérovirus.

On peut rappeler que pour limiter la transmission des virus généralement en cause, il est essentiel de renforcer les règles d'hygiène habituelles, notamment le lavage des mains régulier avec du savon.

On peut rappeler également aux parents (principalement d'enfants en bas âge) qu'il leur est conseillé de consulter leur médecin traitant en présence de symptômes de gastro-entérite (diarrhées, vomissements) chez leur enfant, afin d'éviter notamment les phénomènes de déshydratations qui peuvent être sévères chez le nourrisson.

Prochaine diffusion du point épidémiologique prévue semaine 2010-08

Remerciement à la Cellule de Veille Sanitaire de la DSDS (Michèle Agnès, Frédérique de Saint-Alary, Laurent Ginhoux, Dr Jocelyne Meraut), réseau de médecins généralistes sentinelles, services hospitaliers (Urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), LABM ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.