CIRE
ANTILLES
GUYANE

Le point épidémio

# Surveillance des gastro-entérites

**| GUADELOUPE |** **Le point épidémiologique** — N° 02 / Semaine 2010-01

## Surveillance des cas cliniquement évocateurs

Le nombre de consultations pour gastro-entérite en médecine de ville a augmenté progressivement à partir de la première semaine de décembre (semaine 2009-49) et a dépassé le niveau maximal attendu au cours de la troisième semaine de décembre (Figure 1).

Après une stabilisation pendant la période des fêtes, on observe pour la semaine dernière une augmentation brutale du nombre de cas, de l'ordre de 130%.

Ainsi, on estime qu'un peu plus de 2 600 personnes ont consulté un médecin généraliste la semaine dernière pour cette pathologie.

Ce nombre est estimé à un peu plus de 6 000 depuis la troisième semaine de décembre.

*Le nombre de cas cliniques est une estimation pour l'ensemble de la population guadeloupéenne du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de gastro-entérites. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.

**| Figure 1 |**

Nombre hebdomadaire des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérites, Guadeloupe, novembre 2006 à janvier 2010




## Analyse de la situation

**On observe début janvier une intensification importante de l'épidémie de gastro-entérite qui, malgré un caractère habituel à cette période de l'année apparaît d'ampleur plus importante que les années passées. Le même phénomène est actuellement observé en Martinique.**

**En France hexagonale, le phénomène épidémique se poursuit également avec un dépassement des seuils pour la deuxième semaine consécutive (source : InVS).**

**On peut rappeler que pour limiter la transmission des virus généralement en cause, il est essentiel de renforcer les règles d'hygiène habituelles, notamment le lavage des mains régulier avec du savon.**

**On peut rappeler également aux parents (principalement d'enfants en bas âge) qu'il leur est conseillé de consulter leur médecin traitant en présence de symptômes de gastro-entérite (diarrhées, vomissements) chez leur enfant, afin d'éviter notamment les phénomènes de déshydratations qui peuvent être sévères chez le nourrisson.**

*Remerciement à la Cellule de Veille Sanitaire de la DSDS (**Michèle Agnès, Frédérique de Saint-Alary, Laurent Ginhoux, Dr Jocelyne Mérault**), réseau de médecins généralistes sentinelles, services hospitaliers (Urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), LABM ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.*



**Directeur de la publication :**
Dr Françoise Weber, directrice générale de l'InVS

**Rédacteur en chef :**
Dr Philippe Quénel, coordonnateur scientifique de la Cire AG