

Semaines S06-07/2023 (du 06/02/2023 au 19/02/2023)

Surveillance épidémiologique en région PAYS DE LA LOIRE

Faits marquants

Grippe et syndrome grippal

La région Pays de la Loire est en phase épidémique de grippe depuis S49. En S07, les taux de recours aux urgences et à SOS Médecins pour syndrome grippal étaient globalement stables. La détection majoritaire de virus de type B a de nouveau été rapportée par les laboratoires de virologie des CHU de Nantes et d'Angers. Au niveau national, la circulation majoritaire de virus de type B/Victoria se maintenait.

+ Retrouvez le [bulletin national en ligne](#)



Epidémie de bronchiolite chez les enfants âgés de moins de 2 ans

La région Pays de la Loire est en fin d'épidémie de bronchiolite depuis S05.

+ Retrouvez le [bulletin national en ligne](#)



Gastro-entérite aiguë (GEA)

Les passages aux urgences et les actes SOS Médecins pour GEA étaient à un niveau d'activité modéré en S07.

+ Retrouvez le [bulletin national en ligne](#)

Epidémie COVID-19

En Pays de la Loire, la circulation virale du SARS-CoV-2 et les indicateurs hospitaliers et de recours aux soins restaient à un niveau bas.

En S07, les indicateurs virologiques (taux de dépistage, d'incidence, de positivité) restaient globalement stables et à des niveaux très bas. Les actes SOS Médecins et les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de même que les nouvelles hospitalisations, les nouvelles admissions en soins critiques et les décès hospitaliers des patients porteurs du SARS-CoV-2 étaient globalement stables en S07 et à un niveau faible.

La vaccination des personnes à risque, accompagnée de l'adoption systématique par tous des gestes barrières, demeurent un moyen efficace pour se prémunir des infections respiratoires et de leurs complications et pour limiter le risque de transmettre ces virus à son entourage.

+ Retrouvez toutes les informations COVID-19 sur le site de [Santé publique France](#)

+ Pour suivre l'évolution de l'épidémie de COVID-19 en France, par région et par département : [GEODES](#)

+ Recommandations en situation de co-circulation des virus respiratoires : [Santé publique France](#)

Surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MDO)

Point d'information sur Hépatite A, Légionellose et Rougeole en page 9.

Infection invasive à streptocoque du groupe A (IISGA)

+ Retrouvez le [point de situation national](#) au 29 janvier 2023 en ligne

Chiffres clés

S06 S07 Evolution

page 3-4

Surveillance de la grippe et des syndromes grippaux

Région Pays de la Loire en phase épidémique de grippe depuis S49

Recours aux soins tous âges pour syndrome grippal

Actes SOS Médecins (part d'activité codée)	347 (8%)	262 (7%)
Passages aux urgences (part d'activité codée)	120 (1%)	109 (1%)
Hospitalisations après passage (taux)*	15 (0,5%)	17 (0,6%)
Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation	1	4**

Cas groupés d'IRA (autre que Covid-19) signalés par les EMS (dont Ehpad)

Nombre de cas groupés	0	0 **
-----------------------	---	-------------

Isolements positifs de grippe

CHU de Nantes	45	31
CHU d'Angers	/	13

Surveillance des gastro-entérites aiguës (GEA)

page 5

Recours aux soins tous âges pour GEA

Actes SOS Médecins tous âges (part d'activité codée)	408 (9%)	262 (7%)
Passages aux urgences tous âges (part d'activité codée)	111 (1%)	145 (1%)

Epidémie de Covid-19

pages 6-8

Surveillance virologique

Taux de dépistage régional (/100 000)	375	312	-16,9%
Taux d'incidence régional (/100 000)	23	21	-6,1%
Taux de positivité régional (%)	6	7	+0,8pts

Surveillance en ville et à l'hôpital

Actes SOS Médecins (part d'activité codée)	21 (0,5%)	21 (0,6%)
Passages aux urgences (part d'activité codée)	18 (0,2%)	25 (0,2%)
Nouvelles hospitalisations de patients Covid-19	41	57**
Nouvelles admissions en soins critiques	7	6**

Surveillance de la mortalité spécifique au Covid-19 et toutes causes

page 10

Nouveaux décès hospitaliers de patients Covid-19	4	3**
--	---	------------


* Taux d'hospitalisations après passage aux urgences parmi toutes les hospitalisations codées

** Données de la dernière semaine non consolidées

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL


Recours aux soins pour syndrome grippal tous âges

SOS Médecins




Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des actes médicaux, 2020-2023, Pays de la Loire (Source : SOS Médecins)

Passages aux urgences (RPU)




Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences, 2020-2023, Pays de la Loire (Source : Oscour®)

Nombre hebdomadaire de virus grippaux isolés par les laboratoires de virologie des CHU de Nantes et d'Angers depuis la semaine 36/2017



Source : Laboratoires de virologie des CHU de Nantes et Angers

Nombre de cas hebdomadaires de grippe signalés par les services de réanimation selon la date d'admission en réanimation et le lieu de résidence du patient, Pays de la Loire, saison 2022-2023



Prévention de la grippe et des syndromes grippaux

Les mesures barrières sont les gestes et comportements individuels et/ou collectifs à appliquer dès qu'on présente un signe clinique d'infection (respiratoire ou autre) pour protéger son entourage et, toute l'année, pour prévenir une infection. **Elles sont complémentaires de la vaccination et sont à renforcer au cours des épidémies de grippe.**

- Lavage des mains, friction hydro-alcoolique ;
- En cas de toux ou d'éternuements : se couvrir la bouche avec le coude/la manche ou un mouchoir ;
- Se moucher avec un mouchoir à usage unique, jeter le mouchoir à la poubelle, se laver les mains ensuite ;
- Aération des logements et locaux professionnels chaque jour pendant au moins 10 minutes ;
- Ne pas partager les objets utilisés par un malade (couverts, linge de toilette, etc.) ;
- Limiter les contacts d'une personne grippée pour diminuer les occasions de transmission du virus à une autre personne.


Plus d'informations sur le site de Santé publique France: [Virus de l'hiver \(santepubliquefrance.fr\)](https://www.santepubliquefrance.fr)

Surveillance des cas groupés d'infections respiratoires aiguës (IRA)* - autre que Covid-19 - en EMS

Depuis le 1^{er} octobre 2022 : 32 épisodes de cas groupés d'IRA signalés (dont 15 clos)

* Un épisode de cas groupés d'IRA est défini par la « survenue d'au moins 5 cas d'IRA dans un délai de 4 jours parmi les résidents ». Les signalements de ces épisodes sont effectués en ligne via [le portail des signalements du ministère de la santé](#).

Répartition des épisodes de cas groupés d'IRA signalés par les EMS de la région selon la semaine de survenue du premier cas depuis le 1^{er} octobre 2022, Pays de la Loire (Données au 23/02/2023)



Recherche Etiologique	
Recherche effectuée :	15 foyers
Grippe confirmée :	3 foyers
VRS confirmé :	0 foyer


Départements	Nb cas groupés
Loire-Atlantique	9
Maine-et-Loire	10
Mayenne	2
Sarthe	6
Vendée	5
Total	32

Caractéristiques principales des épisodes de cas groupés d'IRA clôturés survenus dans les EMS de la région depuis le 1^{er} octobre 2022, Pays de la Loire (Données au 23/02/2023)

IRA
Nombre de foyers signalés et clôturés
Nombre total de résidents malades
Taux d'attaque moyen chez les résidents
Taux d'attaque moyen chez le personnel
Nombre d'hospitalisations en unité de soins
Taux d'hospitalisation moyen
Nombre de décès
Létalité moyenne


GASTRO-ENTERITES AIGUES

SOS MÉDECINS



Source : SOS Médecins, Santé publique France, 2023


PASSAGES AUX URGENCES



Source : Réseau Oscour, Santé publique France, 2023


Tous âges

SOS Médecins



Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérite parmi le total des actes médicaux, 2020-2023, Pays de la Loire (Source : SOS Médecins)

Passages aux urgences (RPU)



Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérite parmi le total des passages, 2020-2023, Pays de la Loire (Source : Oscour®)

Les GEA hivernales sont surtout d'origine virale. La principale complication est la déshydratation aiguë, qui survient le plus souvent aux âges extrêmes de la vie.

La prévention des GEA repose sur les mesures d'hygiène :


- Hygiène des mains et des surfaces : le mode de transmission oro-fécal principal des virus conditionne en grande partie les mesures de prévention et de contrôle des gastro-entérites virales basées sur l'application de mesures d'hygiène. Les mains constituent le vecteur le plus important de la transmission et nécessitent de ce fait un nettoyage au savon soigneux et fréquent. De même, certains virus (rotavirus et norovirus) étant très résistants dans l'environnement et présents sur les surfaces, celles-ci doivent être nettoyées soigneusement et régulièrement dans les lieux à risque élevé de transmission (services de pédiatrie, institutions accueillant les personnes âgées) (Guide HCSP 2010).
- Lors de la préparation des repas : application de mesures d'hygiène strictes (lavage soigneux des mains) avant la préparation des aliments et à la sortie des toilettes, en particulier dans les collectivités (institutions accueillant des personnes âgées, services hospitaliers, crèches), ainsi que l'éviction des personnels malades (cuisines, soignants, etc.) permet d'éviter ou de limiter les épidémies d'origine alimentaire.

Depuis juin 2022, la vaccination contre les rotavirus est recommandée en France pour protéger les nourrissons et les enfants contre les gastro-entérites dues à ces virus. Les vaccins disponibles en France sont des vaccins « à boire » (oraux): [Gastro-entérite à rotavirus | Vaccination Info Service \(vaccination-info-service.fr\)](https://www.vaccination-info-service.fr/) / [Dépliant d'information sur la vaccination contre la gastroentérite à rotavirus des nourrissons](#)

Recommandations sur les mesures de prévention : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-hivernales/gastro-enterites-aigues/la-maladie/#tabs>

COVID-19 - Surveillance virologique

Evolution hebdomadaire du taux d'incidence (pour 100 000 personnes) et du taux de positivité (en %) en région Pays de la Loire depuis le 1^{er} novembre 2021 (Source : SI-DEP)



Nombre de personnes testées, nombre de personnes positives au SARS-COV-2, taux de dépistage, d'incidence et de positivité, par département et en région Pays de la Loire, ces deux dernières semaines (Source : SI-DEP)

Dépt./Région	Semaine	Pers. testées	Pers. positives	Taux de dépistage*	Taux de dépistage corr.*/%	Taux d'incidence*	Taux d'incidence corr.*/%	Taux de positivité**
44	2023-S06	3 906	347	264	264	23	23	8,9
	2023-S07	3 084	311	209	209	21	21	10,1
49	2023-S06	3 221	198	390	390	24	24	6,2
	2023-S07	2 713	189	329	329	23	23	7,0
53	2023-S06	1 510	63	494	494	21	21	4,2
	2023-S07	1 352	56	442	442	18	18	4,1
72	2023-S06	3 129	127	554	554	22	22	4,1
	2023-S07	2 605	121	461	461	21	21	4,6
85	2023-S06	2 776	142	397	397	20	20	5,1
	2023-S07	2 335	146	334	334	21	21	6,2
Pays de la Loire	2023-S06	14 542	877	375	375	23	23	6,0
	2023-S07	12 089	823	312	312	21	21	6,8

Tableau produit le 22 févr. 2023 (source : SI-DEP, tous tests). Indicateurs hebdomadaires, tous âges.

*Nombre de nouvelles personnes testées/positives pour 100 000 habitants

**Nombre de personnes positives pour 100 personnes testées

*Indicateurs après correction de l'impact des jours fériés


NB : Une correction est appliquée aux taux d'incidence et de dépistage des semaines incluant un jour férié afin de prendre en compte son effet sur l'activité de dépistage. Une note méthodologique est disponible sur le site internet de Santé publique France.

Des données et notes méthodologiques sur le système SI-DEP sont par ailleurs disponibles sur le site internet datagouv.fr.

COVID-19 - Surveillance en ville et à l'hôpital


SOS Médecins

Nombre hebdomadaire d'actes posés par les associations SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire et part d'activité (en %) pour suspicion de COVID-19 par classe d'âge depuis la semaine 44/2021 (source : SOS Médecins-SurSaUD®)



Urgences hospitalières

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences et part d'activité (en %) pour suspicion de COVID-19 par classe d'âge depuis la semaine 44/2021, région Pays de la Loire (source: Oscour®-SurSaUD®)




COVID-19 - Surveillance à l'hôpital


Hospitalisations et admissions en services de soins critiques

Afin d'avoir une meilleure lisibilité de la dynamique des indicateurs hospitaliers, les nouvelles hospitalisations et les nouvelles admissions en services de soins critiques sont présentées par date d'admission des patients à l'hôpital.
Les données de la dernière semaine ne sont pas encore consolidées et peuvent être sous-estimées.

Nombre hebdomadaire de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés, par semaine d'admission, depuis le 01/11/2021, Pays de la Loire (source : SI-VIC - données actualisées le 22/02/2023)



Nombre hebdomadaire de patients COVID-19 nouvellement admis en services de soins critiques, par semaine d'admission, depuis le 01/11/2021, Pays de la Loire (source : SI-VIC - données actualisées le 22/02/2023)




MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE

| Hépatite A |

Distribution du nombre de cas d'hépatite virale A domiciliés dans les Pays de la Loire selon le mois de prélèvement sérologique et le département

Janvier 2018-Janvier 2023

Données provisoires Santé publique France-ARS




| Legionellose |

Distribution du nombre de cas de légionellose domiciliés dans les Pays de la Loire selon le mois de prélèvement sérologique et le département

Janvier 2018-Janvier 2023

Données provisoires Santé publique France-ARS




| Rougeole |

Distribution du nombre de cas de rougeole domiciliés dans les Pays de la Loire selon le mois de prélèvement sérologique et le département

Janvier 2018-Janvier 2023


Données provisoires Santé publique France-ARS



SURVEILLANCE DE LA MORTALITE

Mortalité spécifique au COVID-19


Nombre hebdomadaire de décès de patients COVID-19 en cours d'hospitalisation, selon la semaine de survenue du décès, depuis le 01/11/2021, Pays de la Loire (source : SI-VIC, données actualisées le 22/02/2023)




Attention : données de la dernière semaine non consolidées

Mortalité toutes causes jusque la semaine S-2

Nombre hebdomadaire de décès toutes causes, tous âges, 2016-2023 (jusque la semaine S-2), Pays de la Loire (Source: Insee)



Nombre hebdomadaire de décès toutes causes chez les personnes âgées de 65 ans ou plus, 2016-2023 (jusque la semaine S-2), Pays de la Loire (Source: Insee)



SOURCES ET METHODES

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance sanitaire dit syndromique a vu le jour en 2003 et est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- les données des associations SOS Médecins de Nantes et de Saint-Nazaire : Le taux de codage des diagnostics médicaux pour ces deux associations SOS Médecins de la région est supérieur à 85 %. En cette période, les actes SOS Médecins pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, pour gastro-entérite aiguë (GEA) et syndrome grippal tous âges sont suivis, ainsi que les actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19.

- les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour® - Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi des données à Santé publique France sous forme de Résumé de Passages aux Urgences (RPU). Dans la région, tous les établissements hospitaliers avec services d'urgences participent au réseau Oscour®, avec un taux de codage des diagnostics d'environ 68 % en 2019, variant de 31 % en Mayenne à 77 % en Vendée. Une nette amélioration du codage des diagnostics a été observée en Mayenne depuis mai 2020 (taux de codage de 81 %). Les données de l'UF spécifique COVID-19 du CH Mans n'ont pas été prises en compte dans les analyses à partir du 23 mars 2020 car l'activité de cette UF a évolué vers une activité de dépistage. Les données de l'UF Covid-19 du CH Cholet ne sont plus transmises depuis le 3 juillet 2020, date à partir de laquelle l'unité n'est plus active. En cette période, les passages aux urgences pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, gastro-entérite aiguë (GEA) et syndrome grippal tous âges sont suivis, ainsi que les passages aux urgences pour suspicion de COVID-19.

- la mortalité « toutes causes » est suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'Etat-civil dans les communes informatisées de la région (soit 376 communes en Pays de la Loire qui représentent environ 85 % de la mortalité régionale) :

Un projet européen de surveillance de la mortalité, baptisé Euromomo (<http://www.euromomo.eu>), permet d'assurer un suivi de la mortalité en temps réel et de coordonner une analyse normalisée afin que les signaux entre les pays soient comparables. Les données proviennent des services d'état-civil et nécessitent un délai de consolidation de 2 à 3 semaines. Ce modèle permet notamment de décrire « l'excès » du nombre de décès observés pendant les saisons estivales et hivernales. Ces « excès » sont variables selon les saisons et sont à mettre en regard de ceux calculés les années précédentes.

Laboratoires hospitaliers des CHU de Nantes et d'Angers : données hebdomadaires d'isolements de virus respiratoire syncytial (VRS) et de virus grippaux

SI-DEP (Système d'information de dépistage) : plateforme sécurisée avec enregistrement systématique des résultats des laboratoires de ville et hospitaliers de tests pour SARS-CoV-2 depuis le 13 mai 2020.

SI-VIC (Système d'information pour le suivi des victimes) : nombre de patients hospitalisés infectés par le SARS-CoV-2, admis en services de soins critiques (services de réanimation, soins intensifs ou unités de surveillance continue), ainsi que les décès survenus pendant l'hospitalisation rapportés par les établissements hospitaliers (depuis le 13 mars 2020).

Vaccin Covid : système d'information géré par l'Assurance maladie et alimenté par les professionnels de santé permettant le suivi de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en France (depuis le 04 janvier 2021).

Services de réanimation sentinelles: données non exhaustives à visée de caractérisation en terme d'âge, sévérité, évolution clinique, des cas de COVID-19 admis en réanimation (depuis le 16 mars 2020). Depuis la semaine 40/2020, cette surveillance a été remplacée par une surveillance associée des cas graves de grippe et de COVID-19 entraînant un changement de recueil des informations de la fiche de signalement.

Pour en savoir plus, consulter le site de Santé publique France.

Le point épidémio

En collaboration avec :

- Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire
- Observatoire régional des urgences (ORU) des Pays de la Loire
- Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (Cpias)
- Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
- Laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville
- Associations SOS Médecins de Nantes et de Saint-Nazaire
- Médecins libéraux
- Etablissements sociaux et médico-sociaux
- SAMU Centre 15
- Services d'urgences (réseau Oscour®)
- Services de réanimation
- Inovalys

Diffusion

Santé publique France Pays de la Loire
17, boulevard Gaston Doumergue
CS 56 233
44262 NANTES CEDEX 2
Tél : 02.49.10.43.62
Fax : 02.49.10.43.92

Email : cire-pdi@santepubliquefrance.fr



Rédacteur en chef

Lisa King

Responsable de

Santé publique France Pays de la Loire

Equipe de rédaction

Noémie Fortin

Julie Prudhomme

Gwénola Picard

Jeanne Perrot

Sophie Hervé

Ronan Ollivier

Delphine Barataud

Pascaline Loury

Anne-Hélène Liebert

Florence Kermarec

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention

Date de publication : 24 février 2023