

# Epidémie de rougeole en France


## Actualisation\* des données de déclaration obligatoire au 19 avril 2011

\* Ce bilan actualise les données du point InVS du 22 mars 2011.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2008, plus de 14 500 cas de rougeole ont été déclarés en France. L'augmentation importante du nombre de cas déclarés depuis le mois d'octobre 2010 signe la 3<sup>e</sup> vague de l'épidémie qui se poursuit sur les premiers mois de l'année 2011. Cette vague est de très grande ampleur puisque plus de 9 000 fiches de déclaration obligatoire ont été réceptionnées à l'InVS à ce jour pour des cas survenus entre octobre 2010 et mars 2011 (plus de 3 000 en mars).

En 2010, 8 complications neurologiques (encéphalites/myélites) ont été rapportées et 2 cas sont décédés (1 encéphalite et 1 pneumopathie). A ce jour, pour 2011, ont été déjà notifiées 13 complications neurologiques (12 encéphalites/myélites et 1 syndrome de Guillain-Barré) et 2 décès (pneumopathies).

**Figure 1 - Cas de rougeole par mois - Déclaration obligatoire, France, Janvier 2008 – Mars 2011 / Number of measles cases per month – Mandatory notification, France, January 2008 – March 2011**



Six régions, essentiellement dans le quart Sud-Est de la France (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Franche-Comté, Auvergne, Midi-Pyrénées) ont déclaré, sur la période octobre 2010-mars 2011, plus de 80 % des cas et ont dépassé des incidences de 15/100 000 sur la même période.

**Figure 2 - Répartition géographique des cas survenus entre octobre 2010 et mars 2011 / Geographical distribution of measles cases from October 2010 to March 2011**

Nombre de cas survenus et taux d'incidence par département suivant les vagues épidémiologiques de rougeole (Octobre 2010 - Mars 2011)




Tableau 1 - Incidence des cas de rougeole survenus entre octobre 2010 et mars 2011 par régions de résidence en France Métropolitaine (pour 100 000) / *Incidence of measles cases (October 2010-March 2011) per region in Mainland France (per 100,000)*

Régions	Incidence /100 000	Régions	Incidence /100 000
Rhône Alpes	77,56	Bourgogne	3,29
PACA	40,11	Bretagne	2,62
Languedoc-Roussillon	31,28	Nord-Pas-de-Calais	2,55
Franche-Comté	26,18	Picardie	2,11
Auvergne	20,01	Champagne-Ardennes	1,93
Midi-Pyrénées	15,70	Centre	1,67
Alsace	7,83	Poitou-Charente	1,42
Ile-de-France	4,63	Corse	1,24
Limousin	4,50	Haute-Normandie	0,95
Aquitaine	4,28	Basse Normandie	0,64
Pays de la Loire	3,30	Lorraine	0,38

L'âge médian des cas déclarés était de 11 ans en 2008, 12 ans en 2009, 14 ans en 2010 et il est de 15 ans pour les trois premiers mois de 2011 (pour ces trois premiers mois de l'année : 18 ans dans la moitié nord de la France, 15 ans dans la moitié sud).

Figure 3 - Proportions des cas de rougeole déclarés par années et groupes d'âges / *Proportions of measles case by age group and year*

