

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 1 - Région: GUADELOUPE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	115	33	82	25	55	8	27	
	55-59 ans	102	37	65	24	18	13	47	
	60-64 ans	118	50	68	16	17	34	51	
	65-69 ans	85	33	52	15	14	18	38	
	70-74 ans	62	28	34	10	11	18	23	
	50-74 ans	482	181	301	90	115	91	186	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	120	34	86	26	57	8	29	
	55-59 ans	104	37	67	24	20	13	47	
	60-64 ans	123	53	70	18	19	35	51	
	65-69 ans	87	35	52	16	14	19	38	
	70-74 ans	64	30	34	10	11	20	23	
	50-74 ans	498	189	309	94	121	95	188	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	74	21	53	15	35	6	18	
	55-59 ans	66	22	44	12	14	10	30	
	60-64 ans	73	29	44	10	12	19	32	
	65-69 ans	43	13	30	6	5	7	25	
	70-74 ans	31	12	19	6	5	6	14	
	50-74 ans	287	97	190	49	71	48	119	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	2	6	2	4	0	2	
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1	
	60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3	
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	50-74 ans	22	10	12	5	4	5	8	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	5	10	4	7	1	3	
	55-59 ans	12	5	7	3	1	2	6	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 1 - Région: GUADELOUPE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	6	6	1	2	5	4
	65-69 ans	16	6	10	2	3	4	7
	70-74 ans	12	4	8	1	3	3	5
	50-74 ans	67	26	41	11	16	15	25
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	2	8	2	6	0	2
	55-59 ans	15	7	8	7	2	0	6
	60-64 ans	13	6	7	1	1	5	6
	65-69 ans	10	5	5	3	5	2	0
	70-74 ans	12	8	4	1	3	7	1
	50-74 ans	60	28	32	14	17	14	15
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	25	12	13	6	4	6	9
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	15	5	10	2	3	3	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 1 - Région: GUADELOUPE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	4	2	3	2	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	18	9	9	5	6	4	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	25	7	18	6	13	1	5
	55-59 ans	27	12	15	10	3	2	12
	60-64 ans	25	12	13	2	3	10	10
	65-69 ans	26	11	15	5	8	6	7
	70-74 ans	24	12	12	2	6	10	6
	50-74 ans	127	54	73	25	33	29	40
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	2	8	2	6	0	2
	55-59 ans	15	7	8	7	2	0	6
	60-64 ans	13	6	7	1	1	5	6
	65-69 ans	10	5	5	3	5	2	0
	70-74 ans	12	8	4	1	3	7	1
	50-74 ans	60	28	32	14	17	14	15
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	1	7	1	5	0	2
	55-59 ans	11	4	7	4	1	0	6
	60-64 ans	13	6	7	1	1	5	6
	65-69 ans	4	1	3	1	3	0	0
	70-74 ans	9	6	3	1	3	5	0
	50-74 ans	45	18	27	8	13	10	14
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	9	2	7	2	5	0	2
	55-59 ans	14	7	7	7	1	0	6
	60-64 ans	13	6	7	1	1	5	6
	65-69 ans	7	2	5	2	4	0	1
	70-74 ans	12	8	4	1	3	7	1
	50-74 ans	55	25	30	13	14	12	16
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 1 - Région: GUADELOUPE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial[§]		Dépistages Subséquents[†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	25	12	13	6	4	6	9

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 1 - Région : GUADELOUPE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,8	97,1	95,3	96,2	96,5	100,0	93,1
	55-59 ans	98,1	100,0	97,0	100,0	90,0	100,0	100,0
	60-64 ans	95,9	94,3	97,1	88,9	89,5	97,1	100,0
	65-69 ans	97,7	94,3	100,0	93,8	100,0	94,7	100,0
	70-74 ans	98,4	96,6	100,0	100,0	100,0	94,7	100,0
	50-74 ans	97,0	96,3	97,4	95,7	95,0	96,8	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,7	61,8	61,6	57,7	61,4	75,0	62,1
	55-59 ans	63,5	59,5	65,7	50,0	70,0	76,9	63,8
	60-64 ans	59,3	54,7	62,9	55,6	63,2	54,3	62,7
	65-69 ans	49,4	37,1	57,7	37,5	35,7	36,8	65,8
	70-74 ans	48,4	40,0	55,9	60,0	45,5	30,0	60,9
	50-74 ans	57,6	51,3	61,5	52,1	58,7	50,5	63,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,7	5,9	7,0	7,7	7,0	0,0	6,9
	55-59 ans	1,9	2,7	1,5	4,2	0,0	0,0	2,1
	60-64 ans	6,5	9,4	4,3	11,1	0,0	8,6	5,9
	65-69 ans	2,3	2,9	1,9	0,0	0,0	5,3	2,6
	70-74 ans	3,1	3,3	2,9	0,0	0,0	5,0	4,3
	50-74 ans	4,4	5,3	3,9	5,3	3,3	5,3	4,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	14,7	11,6	15,4	12,3	12,5	10,3
	55-59 ans	11,5	13,5	10,4	12,5	5,0	15,4	12,8
	60-64 ans	9,8	11,3	8,6	5,6	10,5	14,3	7,8
	65-69 ans	18,4	17,1	19,2	12,5	21,4	21,1	18,4
	70-74 ans	18,8	13,3	23,5	10,0	27,3	15,0	21,7
	50-74 ans	13,5	13,8	13,3	11,7	13,2	15,8	13,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 1 - Région : GUADELOUPE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	8,3	5,9	9,3	7,7	10,5	0,0	6,9
	55-59 ans	14,4	18,9	11,9	29,2	10,0	0,0	12,8
	60-64 ans	10,6	11,3	10,0	5,6	5,3	14,3	11,8
	65-69 ans	11,5	14,3	9,6	18,8	35,7	10,5	0,0
	70-74 ans	18,8	26,7	11,8	10,0	27,3	35,0	4,3
	50-74 ans	12,0	14,8	10,4	14,9	14,0	14,7	8,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	5,9	1,2	3,8	1,8	12,5	0,0
	55-59 ans	3,8	2,7	4,5	0,0	5,0	7,7	4,3
	60-64 ans	5,7	5,7	5,7	5,6	10,5	5,7	3,9
	65-69 ans	10,3	14,3	7,7	18,8	0,0	10,5	10,5
	70-74 ans	3,1	3,3	2,9	10,0	0,0	0,0	4,3
	50-74 ans	5,0	6,3	4,2	6,4	3,3	6,3	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,7	2,9	1,2	3,8	0,0	0,0	3,4
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,8	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	2,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,6	0,5	0,6	1,1	0,0	0,0	1,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,4
	55-59 ans	1,9	2,7	1,5	4,2	0,0	0,0	2,1
	60-64 ans	2,4	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	5,9
	65-69 ans	5,7	8,6	3,8	6,3	7,1	10,5	2,6
	70-74 ans	3,1	3,3	2,9	0,0	0,0	5,0	4,3
	50-74 ans	3,0	2,6	3,2	2,1	2,5	3,2	3,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,2	2,9	4,7	3,8	3,5	0,0	6,9
	55-59 ans	2,9	0,0	4,5	0,0	10,0	0,0	2,1
	60-64 ans	4,9	7,5	2,9	16,7	10,5	2,9	0,0
	65-69 ans	2,3	5,7	0,0	6,3	0,0	5,3	0,0

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3,1	6,7	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
	50-74 ans	3,6	4,8	2,9	5,3	5,0	4,2	1,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,0	2,3	3,4	2,8	3,8	1,2	2,7
	55-59 ans	3,7	4,7	3,1	10,5	2,4	1,2	3,3
	60-64 ans	3,3	4,5	2,7	1,9	2,5	6,2	2,7
	65-69 ans	4,4	5,3	4,0	6,6	10,3	4,5	2,4
	70-74 ans	5,4	7,5	4,2	3,7	9,9	9,6	2,7
	50-74 ans	3,8	4,5	3,4	4,6	4,5	4,5	2,8
	50-74 ans **	3,9	4,5	3,4
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	0,7	1,5	0,9	1,7	0,0	1,1
	55-59 ans	2,0	2,7	1,7	7,3	1,6	0,0	1,7
	60-64 ans	1,7	2,3	1,4	1,0	0,8	3,1	1,6
	65-69 ans	1,7	2,4	1,3	4,0	6,4	1,5	0,0
	70-74 ans	2,7	5,0	1,4	1,8	4,9	6,7	0,4
	50-74 ans	1,8	2,4	1,5	2,6	2,3	2,2	1,0
	50-74 ans **	1,9	2,4	1,5
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	0,3	1,3	0,5	1,4	0,0	1,1
	55-59 ans	1,5	1,6	1,4	4,2	0,8	0,0	1,7
	60-64 ans	1,7	2,3	1,4	1,0	0,8	3,1	1,6
	65-69 ans	0,7	0,5	0,8	1,3	3,9	0,0	0,0
	70-74 ans	2,0	3,8	1,0	1,8	4,9	4,8	0,0
	50-74 ans	1,3	1,5	1,2	1,5	1,8	1,5	1,0
	50-74 ans **	1,4	1,5	1,3
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	0,7	1,3	0,9	1,4	0,0	1,1
	55-59 ans	1,9	2,7	1,4	7,3	0,8	0,0	1,7
	60-64 ans	1,7	2,3	1,4	1,0	0,8	3,1	1,6
	65-69 ans	1,2	1,0	1,3	2,6	5,2	0,0	0,3
	70-74 ans	2,7	5,0	1,4	1,8	4,9	6,7	0,4
	50-74 ans	1,6	2,1	1,4	2,4	1,9	1,9	1,1
	50-74 ans **	1,8	2,2	1,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,7	0,2	0,5	0,3	1,2	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 1 - Région : GUADELOUPE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	0,8	0,6	0,6
	60-64 ans	0,9	1,1	0,8	1,0	1,7	1,2	0,5
	65-69 ans	1,5	2,4	1,1	4,0	0,0	1,5	1,3
	70-74 ans	0,4	0,6	0,3	1,8	0,0	0,0	0,4
	50-74 ans	0,7	1,0	0,6	1,1	0,5	0,9	0,6
	50-74 ans **	0,8	0,9	0,6

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)