

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 3675 | 1658 | 2017 | 946 | 1056 | 712 | 961 |
| | 55-59 ans | 3055 | 1357 | 1698 | 312 | 369 | 1045 | 1329 |
| | 60-64 ans | 4236 | 1847 | 2389 | 367 | 441 | 1480 | 1948 |
| | 65-69 ans | 2949 | 1363 | 1586 | 257 | 258 | 1106 | 1328 |
| | 70-74 ans | 2663 | 1185 | 1478 | 152 | 232 | 1033 | 1246 |
| | 50-74 ans | 16578 | 7410 | 9168 | 2034 | 2356 | 5376 | 6812 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 183 | 100 | 83 | 63 | 57 | 37 | 26 |
| | 55-59 ans | 139 | 52 | 87 | 14 | 33 | 38 | 54 |
| | 60-64 ans | 188 | 75 | 113 | 22 | 34 | 53 | 79 |
| | 65-69 ans | 156 | 68 | 88 | 17 | 21 | 51 | 67 |
| | 70-74 ans | 163 | 69 | 94 | 17 | 20 | 52 | 74 |
| | 50-74 ans | 829 | 364 | 465 | 133 | 165 | 231 | 300 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 126 | 65 | 61 | 35 | 39 | 30 | 22 |
| | 55-59 ans | 103 | 40 | 63 | 7 | 23 | 33 | 40 |
| | 60-64 ans | 138 | 54 | 84 | 15 | 23 | 39 | 61 |
| | 65-69 ans | 118 | 54 | 64 | 12 | 11 | 42 | 53 |
| | 70-74 ans | 116 | 52 | 64 | 10 | 11 | 42 | 53 |
| | 50-74 ans | 601 | 265 | 336 | 79 | 107 | 186 | 229 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 57 | 35 | 22 | 28 | 18 | 7 | 4 |
| | 55-59 ans | 36 | 12 | 24 | 7 | 10 | 5 | 14 |
| | 60-64 ans | 50 | 21 | 29 | 7 | 11 | 14 | 18 |
| | 65-69 ans | 38 | 14 | 24 | 5 | 10 | 9 | 14 |
| | 70-74 ans | 47 | 17 | 30 | 7 | 9 | 10 | 21 |
| | 50-74 ans | 228 | 99 | 129 | 54 | 58 | 45 | 71 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 3618 | 1623 | 1995 | 918 | 1038 | 705 | 957 |
| | 55-59 ans | 3019 | 1345 | 1674 | 305 | 359 | 1040 | 1315 |
| | 60-64 ans | 4186 | 1826 | 2360 | 360 | 430 | 1466 | 1930 |
| | 65-69 ans | 2911 | 1349 | 1562 | 252 | 248 | 1097 | 1314 |
| | 70-74 ans | 2616 | 1168 | 1448 | 145 | 223 | 1023 | 1225 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 16350 | 7311 | 9039 | 1980 | 2298 | 5331 | 6741 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 48 | 26 | 22 | 16 | 16 | 10 | 6 |
| | 55-59 ans | 36 | 18 | 18 | 8 | 5 | 10 | 13 |
| | 60-64 ans | 76 | 48 | 28 | 13 | 5 | 35 | 23 |
| | 65-69 ans | 61 | 26 | 35 | 8 | 9 | 18 | 26 |
| | 70-74 ans | 47 | 27 | 20 | 10 | 4 | 17 | 16 |
| | 50-74 ans | 268 | 145 | 123 | 55 | 39 | 90 | 84 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 48 | 26 | 22 | 16 | 16 | 10 | 6 |
| | 55-59 ans | 36 | 18 | 18 | 8 | 5 | 10 | 13 |
| | 60-64 ans | 75 | 47 | 28 | 13 | 5 | 34 | 23 |
| | 65-69 ans | 61 | 26 | 35 | 8 | 9 | 18 | 26 |
| | 70-74 ans | 47 | 27 | 20 | 10 | 4 | 17 | 16 |
| | 50-74 ans | 267 | 144 | 123 | 55 | 39 | 89 | 84 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 44 | 24 | 20 | 16 | 14 | 8 | 6 |
| | 55-59 ans | 33 | 16 | 17 | 8 | 4 | 8 | 13 |
| | 60-64 ans | 70 | 43 | 27 | 12 | 4 | 31 | 23 |
| | 65-69 ans | 58 | 25 | 33 | 8 | 8 | 17 | 25 |
| | 70-74 ans | 43 | 25 | 18 | 10 | 4 | 15 | 14 |
| | 50-74 ans | 248 | 133 | 115 | 54 | 34 | 79 | 81 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 41 | 22 | 19 | 15 | 14 | 7 | 5 |
| | 55-59 ans | 30 | 14 | 16 | 6 | 3 | 8 | 13 |
| | 60-64 ans | 64 | 38 | 26 | 10 | 4 | 28 | 22 |
| | 65-69 ans | 52 | 22 | 30 | 8 | 7 | 14 | 23 |
| | 70-74 ans | 35 | 21 | 14 | 9 | 4 | 12 | 10 |
| | 50-74 ans | 222 | 117 | 105 | 48 | 32 | 69 | 73 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 44 | 24 | 20 | 16 | 14 | 8 | 6 |
| | 55-59 ans | 33 | 16 | 17 | 8 | 4 | 8 | 13 |
| | 60-64 ans | 69 | 43 | 26 | 12 | 4 | 31 | 22 |
| | 65-69 ans | 56 | 23 | 33 | 8 | 8 | 15 | 25 |
| | 70-74 ans | 38 | 22 | 16 | 9 | 3 | 13 | 13 |
| | 50-74 ans | 240 | 128 | 112 | 53 | 33 | 75 | 79 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| | Effectifs sur la période 2012-2013 | | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 43 | 23 | 20 | 15 | 14 | 8 | 6 |
| | 55-59 ans | 33 | 16 | 17 | 8 | 4 | 8 | 13 |
| | 60-64 ans | 69 | 42 | 27 | 12 | 4 | 30 | 23 |
| | 65-69 ans | 58 | 25 | 33 | 8 | 8 | 17 | 25 |
| | 70-74 ans | 42 | 25 | 17 | 10 | 4 | 15 | 13 |
| | 50-74 ans | 245 | 131 | 114 | 53 | 34 | 78 | 80 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 44 | 24 | 20 | 16 | 14 | 8 | 6 |
| | 55-59 ans | 33 | 16 | 17 | 8 | 4 | 8 | 13 |
| | 60-64 ans | 71 | 44 | 27 | 12 | 4 | 32 | 23 |
| | 65-69 ans | 58 | 25 | 33 | 8 | 8 | 17 | 25 |
| | 70-74 ans | 43 | 25 | 18 | 10 | 4 | 15 | 14 |
| | 50-74 ans | 249 | 134 | 115 | 54 | 34 | 80 | 81 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 21 | 8 | 13 | 5 | 10 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 17 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| | 60-64 ans | 33 | 16 | 17 | 4 | 2 | 12 | 15 |
| | 65-69 ans | 22 | 8 | 14 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| | 70-74 ans | 22 | 12 | 10 | 5 | 3 | 7 | 7 |
| | 50-74 ans | 115 | 50 | 65 | 19 | 20 | 31 | 45 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 23 | 14 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 19 | 13 | 6 | 3 | 0 | 10 | 6 |
| | 65-69 ans | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 45 | 30 | 15 | 11 | 2 | 19 | 13 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 33 | 17 | 16 | 8 | 6 | 9 | 10 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 25 | 18 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 |
| | 65-69 ans | 19 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| | 70-74 ans | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| | 50-74 ans | 69 | 45 | 24 | 16 | 5 | 29 | 19 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 19 | 13 | 6 | 3 | 0 | 10 | 6 |
| | 65-69 ans | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 45 | 30 | 15 | 11 | 2 | 19 | 13 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| | 65-69 ans | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 36 | 24 | 12 | 9 | 1 | 15 | 11 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| | 65-69 ans | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 38 | 24 | 14 | 9 | 2 | 15 | 12 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 33 | 17 | 16 | 8 | 6 | 9 | 10 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 28 | 15 | 13 | 7 | 4 | 8 | 9 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 26 | 13 | 13 | 6 | 4 | 7 | 9 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 14 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 5 | 6 | 4,1 | 6,7 | 5,4 | 5,2 | 2,7 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 3,8 | 5,1 | 4,5 | 8,9 | 3,6 | 4,1 |
| | 60-64 ans | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 6 | 7,7 | 3,6 | 4,1 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 5 | 5,5 | 6,6 | 8,1 | 4,6 | 5 |
| | 70-74 ans | 6,1 | 5,8 | 6,4 | 11,2 | 8,6 | 5 | 5,9 |
| | 50-74 ans | 5 | 4,9 | 5,1 | 6,5 | 7 | 4,3 | 4,4 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,6 | 2,1 | 1,1 | 3 | 1,7 | 1 | 0,4 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 2,2 | 2,7 | 0,5 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 0,9 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 1,3 | 1 | 1,5 | 1,9 | 3,9 | 0,8 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 1,8 | 1,4 | 2 | 4,6 | 3,9 | 1 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 2,7 | 2,5 | 0,8 | 1 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 68,9 | 65 | 73,5 | 55,6 | 68,4 | 81,1 | 84,6 |
| | 55-59 ans | 74,1 | 76,9 | 72,4 | 50 | 69,7 | 86,8 | 74,1 |
| | 60-64 ans | 73,4 | 72 | 74,3 | 68,2 | 67,6 | 73,6 | 77,2 |
| | 65-69 ans | 75,6 | 79,4 | 72,7 | 70,6 | 52,4 | 82,4 | 79,1 |
| | 70-74 ans | 71,2 | 75,4 | 68,1 | 58,8 | 55 | 80,8 | 71,6 |
| | 50-74 ans | 72,5 | 72,8 | 72,3 | 59,4 | 64,8 | 80,5 | 76,3 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 0,6 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 2,6 | 1,4 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 2,6 | 1,2 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 3,6 | 1,6 | 2 |
| | 70-74 ans | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 6,9 | 1,8 | 1,7 | 1,3 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 2 | 1,4 | 2,8 | 1,7 | 1,7 | 1,2 |
| 50-74 ans** | 1,6 | 1,9 | 1,3 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 98,7 | 97,9 | 100 | 100 | 100 | 97,1 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,6 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 98,9 | 100 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 91,7 | 92,3 | 90,9 | 100 | 87,5 | 80 | 100 |
| | 55-59 ans | 91,7 | 88,9 | 94,4 | 100 | 80 | 80 | 100 |
| | 60-64 ans | 93,3 | 91,5 | 96,4 | 92,3 | 80 | 91,2 | 100 |
| | 65-69 ans | 95,1 | 96,2 | 94,3 | 100 | 88,9 | 94,4 | 96,2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 91,5 | 92,6 | 90 | 100 | 100 | 88,2 | 87,5 |
| | 50-74 ans | 92,9 | 92,4 | 93,5 | 98,2 | 87,2 | 88,8 | 96,4 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 93,2 | 91,7 | 95 | 93,8 | 100 | 87,5 | 83,3 |
| | 55-59 ans | 90,9 | 87,5 | 94,1 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 91,4 | 88,4 | 96,3 | 83,3 | 100 | 90,3 | 95,7 |
| | 65-69 ans | 89,7 | 88 | 90,9 | 100 | 87,5 | 82,4 | 92 |
| | 70-74 ans | 81,4 | 84 | 77,8 | 90 | 100 | 80 | 71,4 |
| | 50-74 ans | 89,5 | 88 | 91,3 | 88,9 | 94,1 | 87,3 | 90,1 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 80 | 85 | 74 | 87 | 82 | 80 | 55 |
| | 55-59 ans | 80 | 68 | 91 | 62 | 51 | 75 | 104 |
| | 60-64 ans | 75 | 86 | 58 | 139 | 69 | 65 | 56 |
| | 65-69 ans | 74 | 72 | 75 | 44 | 135 | 86 | 56 |
| | 70-74 ans | 87 | 78 | 100 | 78 | 109 | 78 | 98 |
| | 50-74 ans | 79 | 80 | 77 | 87 | 92 | 75 | 71 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 58 (47-81) | 63 (50-81) | 52.5 (41.5-79.5) | 63 (50-84) | 52.5 (46-78) | 59 (46-73.5) | 52.5 (37-81) |
| | 55-59 ans | 59 (40-73) | 57 (40.5-71.5) | 61 (40-85) | 56 (40-63) | 52.5 (31-71.5) | 60 (49-79.5) | 61 (43-170) |
| | 60-64 ans | 57 (37-84) | 63 (41-88) | 43 (31-75) | 81 (43.5-187) | 52 (36.5-102) | 59 (41-79) | 40 (31-75) |
| | 65-69 ans | 51.5 (42-76) | 49 (42-77) | 52 (45-67) | 44.5 (35-51) | 62.5 (43.5-120) | 75 (42-92) | 52 (45-65) |
| | 70-74 ans | 59 (38-93) | 52 (38-76) | 65 (56-97) | 59.5 (49-91) | 90 (43-174.5) | 44 (36-66) | 65 (56-93) |
| | 50-74 ans | 57 (40-83) | 58 (41-83) | 56 (37-83) | 58 (42-84) | 58.5 (42-88) | 58 (41-79) | 55 (37-81) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 6,3 | 3,8 | 9,1 | 0 | 12,5 | 10 | 0 |
| | 55-59 ans | 8,3 | 11,1 | 5,6 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| | 60-64 ans | 5,3 | 6,3 | 3,6 | 7,7 | 20 | 5,7 | 0 |
| | 65-69 ans | 3,3 | 3,8 | 2,9 | 0 | 11,1 | 5,6 | 0 |
| | 70-74 ans | 4,3 | 3,7 | 5 | 0 | 0 | 5,9 | 6,3 |
| | 50-74 ans | 5,2 | 5,5 | 4,9 | 1,8 | 12,8 | 7,8 | 1,2 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 97,7 | 95,8 | 100 | 93,8 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 98,6 | 97,7 | 100 | 100 | 100 | 96,8 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 97,7 | 100 | 94,4 | 100 | 100 | 100 | 92,9 |
| | 50-74 ans | 98,8 | 98,5 | 99,1 | 98,1 | 100 | 98,7 | 98,8 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 47,7 | 33,3 | 65 | 31,3 | 71,4 | 37,5 | 50 |
| | 55-59 ans | 51,5 | 37,5 | 64,7 | 25 | 50 | 50 | 69,2 |
| | 60-64 ans | 46,5 | 36,4 | 63 | 33,3 | 50 | 37,5 | 65,2 |
| | 65-69 ans | 37,9 | 32 | 42,4 | 37,5 | 37,5 | 29,4 | 44 |
| | 70-74 ans | 51,2 | 48 | 55,6 | 50 | 75 | 46,7 | 50 |
| | 50-74 ans | 46,2 | 37,3 | 56,5 | 35,2 | 58,8 | 38,8 | 55,6 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 6,8 | 8,3 | 5 | 6,3 | 7,1 | 12,5 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| | 60-64 ans | 2,8 | 2,3 | 3,7 | 0 | 25 | 3,1 | 0 |
| | 65-69 ans | 3,4 | 8 | 0 | 12,5 | 0 | 5,9 | 0 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0 |
| | 50-74 ans | 3,6 | 4,5 | 2,6 | 3,7 | 5,9 | 5 | 1,2 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 2,3 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 6,8 | 8,3 | 5 | 12,5 | 7,1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 8,5 | 11,4 | 3,7 | 8,3 | 0 | 12,5 | 4,3 |
| | 65-69 ans | 12,1 | 12 | 12,1 | 12,5 | 25 | 11,8 | 8 |
| | 70-74 ans | 16,3 | 16 | 16,7 | 10 | 0 | 20 | 21,4 |
| | 50-74 ans | 9,2 | 10,4 | 7,8 | 9,3 | 8,8 | 11,3 | 7,4 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 9,1 | 16,7 | 0 | 18,8 | 0 | 12,5 | 0 |
| | 55-59 ans | 21,2 | 25 | 17,6 | 25 | 25 | 25 | 15,4 |
| | 60-64 ans | 26,8 | 29,5 | 22,2 | 25 | 0 | 31,3 | 26,1 |
| | 65-69 ans | 20,7 | 28 | 15,2 | 25 | 0 | 29,4 | 20 |
| | 70-74 ans | 7 | 8 | 5,6 | 10 | 25 | 6,7 | 0 |
| | 50-74 ans | 18,1 | 22,4 | 13 | 20,4 | 5,9 | 23,8 | 16 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 11,4 | 8,3 | 15 | 12,5 | 14,3 | 0 | 16,7 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 18,2 | 25 | 11,8 | 37,5 | 25 | 12,5 | 7,7 |
| | 60-64 ans | 9,9 | 11,4 | 7,4 | 8,3 | 25 | 12,5 | 4,3 |
| | 65-69 ans | 15,5 | 12 | 18,2 | 0 | 25 | 17,6 | 16 |
| | 70-74 ans | 14 | 12 | 16,7 | 20 | 0 | 6,7 | 21,4 |
| | 50-74 ans | 13,3 | 12,7 | 13,9 | 14,8 | 17,6 | 11,3 | 12,3 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 9,1 | 12,5 | 5 | 6,3 | 0 | 25 | 16,7 |
| | 55-59 ans | 3 | 6,3 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2,8 | 4,5 | 0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3,4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5,9 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3,6 | 5,2 | 1,7 | 7,4 | 0 | 3,8 | 2,5 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 2,3 | 4,2 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,4 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,9 | 0 | 1,3 | 1,2 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,2 | 4,3 | 0,5 | 5,4 | 1 | 2,8 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 3 | 1,8 | 6,6 | 2,8 | 1,9 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 6 | 9,9 | 3 | 11,1 | 0 | 9,5 | 3,6 |
| | 65-69 ans | 6,5 | 7,4 | 5,8 | 11,9 | 8,1 | 6,4 | 5,3 |
| | 70-74 ans | 3,8 | 5,1 | 2,8 | 13,8 | 4,5 | 3,9 | 2,4 |
| | 50-74 ans | 4,2 | 6,2 | 2,7 | 8,1 | 2,2 | 5,4 | 2,8 |
| | 50-74 ans ** | 4 | 5,7 | 2,5 | . | . | . | . |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,1 | 2,5 | 0 | 3,3 | 0 | 1,4 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 3 | 1,8 | 6,6 | 2,8 | 1,9 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 4,5 | 7,1 | 2,5 | 8,3 | 0 | 6,8 | 3,1 |
| | 65-69 ans | 4,1 | 5,2 | 3,2 | 7,9 | 0 | 4,6 | 3,8 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 1,1 | 1,7 | 0,7 | 6,9 | 4,5 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 2,8 | 4,1 | 1,7 | 5,6 | 0,9 | 3,6 | 1,9 |
| | 50-74 ans ** | 2,7 | 3,9 | 1,6 | . | . | . | . |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,8 | 0 | 2,2 | 0 | 1,4 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 6,6 | 2,8 | 1 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 4,1 | 6,6 | 2,1 | 8,3 | 0 | 6,1 | 2,6 |
| | 65-69 ans | 3,8 | 4,4 | 3,2 | 7,9 | 0 | 3,6 | 3,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2,2 | 3,3 | 1,3 | 4,5 | 0,4 | 2,8 | 1,6 |
| | 50-74 ans ** | 2,1 | 3,1 | 1,2 | . | . | . | . |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,8 | 0 | 2,2 | 0 | 1,4 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 6,6 | 2,8 | 1 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 4,1 | 6,6 | 2,1 | 8,3 | 0 | 6,1 | 2,6 |
| | 65-69 ans | 3,8 | 4,4 | 3,2 | 7,9 | 0 | 3,6 | 3,8 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 0 | 1,4 | 0 | 4,5 | 0 | 0,8 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 3,3 | 1,5 | 4,5 | 0,9 | 2,8 | 1,8 |
| | 50-74 ans ** | 2,2 | 3,1 | 1,4 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 1,9 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 3 | 1,2 | 9,8 | 2,8 | 1 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 1,7 | 2,7 | 0,8 | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 0,5 |
| | 65-69 ans | 3,1 | 2,2 | 3,8 | 0 | 8,1 | 2,7 | 3 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 13,8 | 0 | 1 | 2,4 |
| | 50-74 ans | 2 | 2,3 | 1,8 | 4 | 2,6 | 1,7 | 1,5 |
| | 50-74 ans ** | 2,2 | 2,3 | 1,7 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009