

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 1333 | 558 | 775 | 547 | 748 | 11 | 27 |
| | 55-59 ans | 1021 | 491 | 530 | 389 | 305 | 102 | 225 |
| | 60-64 ans | 1186 | 544 | 642 | 330 | 220 | 214 | 422 |
| | 65-69 ans | 856 | 371 | 485 | 182 | 143 | 189 | 342 |
| | 70-74 ans | 722 | 289 | 433 | 138 | 138 | 151 | 295 |
| | 50-74 ans | 5118 | 2253 | 2865 | 1586 | 1554 | 667 | 1311 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 111 | 48 | 63 | 47 | 63 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 70 | 30 | 40 | 28 | 31 | 2 | 9 |
| | 60-64 ans | 78 | 42 | 36 | 32 | 18 | 10 | 18 |
| | 65-69 ans | 69 | 35 | 34 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| | 70-74 ans | 60 | 18 | 42 | 10 | 20 | 8 | 22 |
| | 50-74 ans | 388 | 173 | 215 | 139 | 141 | 34 | 74 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 67 | 22 | 45 | 21 | 45 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 43 | 18 | 25 | 16 | 18 | 2 | 7 |
| | 60-64 ans | 39 | 19 | 20 | 13 | 9 | 6 | 11 |
| | 65-69 ans | 44 | 22 | 22 | 12 | 6 | 10 | 16 |
| | 70-74 ans | 40 | 12 | 28 | 5 | 10 | 7 | 18 |
| | 50-74 ans | 233 | 93 | 140 | 67 | 88 | 26 | 52 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 44 | 26 | 18 | 26 | 18 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 27 | 12 | 15 | 12 | 13 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 39 | 23 | 16 | 19 | 9 | 4 | 7 |
| | 65-69 ans | 25 | 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 9 |
| | 70-74 ans | 20 | 6 | 14 | 5 | 10 | 1 | 4 |
| | 50-74 ans | 155 | 80 | 75 | 72 | 53 | 8 | 22 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 1289 | 532 | 757 | 521 | 730 | 11 | 27 |
| | 55-59 ans | 994 | 479 | 515 | 377 | 292 | 102 | 223 |
| | 60-64 ans | 1147 | 521 | 626 | 311 | 211 | 210 | 415 |
| | 65-69 ans | 831 | 358 | 473 | 172 | 140 | 186 | 333 |
| | 70-74 ans | 702 | 283 | 419 | 133 | 128 | 150 | 291 |
| | 50-74 ans | 4963 | 2173 | 2790 | 1514 | 1501 | 659 | 1289 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 46 | 27 | 19 | 24 | 19 | 3 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 20 | 8 | 12 | 7 | 7 | 1 | 5 |
| | 60-64 ans | 28 | 12 | 16 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| | 65-69 ans | 26 | 14 | 12 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| | 70-74 ans | 22 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| | 50-74 ans | 142 | 73 | 69 | 58 | 44 | 15 | 25 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 46 | 27 | 19 | 24 | 19 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 20 | 8 | 12 | 7 | 7 | 1 | 5 |
| | 60-64 ans | 27 | 12 | 15 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| | 65-69 ans | 26 | 14 | 12 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| | 70-74 ans | 22 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| | 50-74 ans | 141 | 73 | 68 | 58 | 44 | 15 | 24 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 27 | 15 | 12 | 13 | 12 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 18 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| | 65-69 ans | 19 | 11 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 |
| | 70-74 ans | 15 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 87 | 48 | 39 | 36 | 24 | 12 | 15 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 24 | 13 | 11 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 15 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| | 65-69 ans | 17 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| | 70-74 ans | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 75 | 40 | 35 | 29 | 20 | 11 | 15 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 26 | 14 | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 18 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| | 65-69 ans | 19 | 11 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 |
| | 70-74 ans | 15 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 86 | 47 | 39 | 35 | 24 | 12 | 15 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 25 | 13 | 12 | 11 | 12 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 18 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| | 65-69 ans | 19 | 11 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 |
| | 70-74 ans | 15 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 84 | 45 | 39 | 33 | 24 | 12 | 15 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 27 | 15 | 12 | 13 | 12 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 18 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| | 65-69 ans | 19 | 11 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 |
| | 70-74 ans | 15 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 87 | 48 | 39 | 36 | 24 | 12 | 15 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 16 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 57 | 31 | 26 | 22 | 16 | 9 | 10 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | | |
|--|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 27 | 15 | 12 | 15 | 10 | 0 | 2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 8,3 | 8,6 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 9,1 | 0 |
| | 55-59 ans | 6,9 | 6,1 | 7,5 | 7,2 | 10,2 | 2 | 4 |
| | 60-64 ans | 6,6 | 7,7 | 5,6 | 9,7 | 8,2 | 4,7 | 4,3 |
| | 65-69 ans | 8,1 | 9,4 | 7 | 12,1 | 6,3 | 6,9 | 7,3 |
| | 70-74 ans | 8,3 | 6,2 | 9,7 | 7,2 | 14,5 | 5,3 | 7,5 |
| | 50-74 ans | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 8,8 | 9,1 | 5,1 | 5,6 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 3,3 | 4,7 | 2,3 | 4,8 | 2,4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 4,3 | 0 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 3,3 | 4,2 | 2,5 | 5,8 | 4,1 | 1,9 | 1,7 |
| | 65-69 ans | 2,9 | 3,5 | 2,5 | 5,5 | 2,1 | 1,6 | 2,6 |
| | 70-74 ans | 2,8 | 2,1 | 3,2 | 3,6 | 7,2 | 0,7 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 3 | 3,6 | 2,6 | 4,5 | 3,4 | 1,2 | 1,7 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 60,4 | 45,8 | 71,4 | 44,7 | 71,4 | 100 | 0 |
| | 55-59 ans | 61,4 | 60 | 62,5 | 57,1 | 58,1 | 100 | 77,8 |
| | 60-64 ans | 50 | 45,2 | 55,6 | 40,6 | 50 | 60 | 61,1 |
| | 65-69 ans | 63,8 | 62,9 | 64,7 | 54,5 | 66,7 | 76,9 | 64 |
| | 70-74 ans | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 50 | 50 | 87,5 | 81,8 |
| | 50-74 ans | 60,1 | 53,8 | 65,1 | 48,2 | 62,4 | 76,5 | 70,3 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 3,6 | 5,1 | 2,5 | 4,6 | 2,6 | 27,3 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1,7 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 1 | 2,2 |
| | 60-64 ans | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 1 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 5,2 | 2,9 | 2,7 | 2,4 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 4,2 | 2,4 | 6 | 4,7 | 2,7 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 2,9 | 3,4 | 2,5 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 1,9 |
| 50-74 ans ** | 2,9 | 3,3 | 2,5 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 96,4 | 100 | 93,8 | 100 | 100 | 100 | 87,5 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,3 | 100 | 98,6 | 100 | 100 | 100 | 96 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 58,7 | 55,6 | 63,2 | 54,2 | 63,2 | 66,7 | 0 |
| | 55-59 ans | 40 | 37,5 | 41,7 | 42,9 | 28,6 | 0 | 60 |
| | 60-64 ans | 66,7 | 91,7 | 46,7 | 90 | 37,5 | 100 | 57,1 |
| | 65-69 ans | 73,1 | 78,6 | 66,7 | 66,7 | 50 | 100 | 75 |
| | 70-74 ans | 68,2 | 66,7 | 70 | 62,5 | 83,3 | 75 | 50 |
| | 50-74 ans | 61,7 | 65,8 | 57,4 | 62,1 | 54,5 | 80 | 62,5 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 88,9 | 86,7 | 91,7 | 84,6 | 91,7 | 100 | 0 |
| | 55-59 ans | 75 | 66,7 | 80 | 66,7 | 50 | 0 | 100 |
| | 60-64 ans | 83,3 | 90,9 | 71,4 | 88,9 | 33,3 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 89,5 | 81,8 | 100 | 83,3 | 100 | 80 | 100 |
| | 70-74 ans | 86,7 | 75 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 86,2 | 83,3 | 89,7 | 80,6 | 83,3 | 91,7 | 100 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 56 | 0 |
| | 55-59 ans | 73 | 45 | 89 | 45 | 155 | 0 | 46 |
| | 60-64 ans | 78 | 99 | 47 | 110 | 51 | 58 | 44 |
| | 65-69 ans | 60 | 72 | 43 | 72 | 26 | 72 | 49 |
| | 70-74 ans | 115 | 69 | 168 | 71 | 105 | 65 | 327 |
| | 50-74 ans | 75 | 72 | 78 | 75 | 75 | 65 | 84 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 26,1 | 25,9 | 26,3 | 29,2 | 26,3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 25 | 25 | 25 | 28,6 | 42,9 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 10,7 | 8,3 | 12,5 | 10 | 25 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 11,5 | 14,3 | 8,3 | 22,2 | 0 | 0 | 12,5 |
| | 70-74 ans | 18,2 | 25 | 10 | 37,5 | 0 | 0 | 25 |
| | 50-74 ans | 19 | 20,5 | 17,4 | 25,9 | 22,7 | 0 | 8 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 92,6 | 86,7 | 100 | 84,6 | 100 | 100 | 0 |
| | 55-59 ans | 87,5 | 66,7 | 100 | 66,7 | 100 | 0 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 96,6 | 93,8 | 100 | 91,7 | 100 | 100 | 100 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 59,3 | 60 | 58,3 | 61,5 | 58,3 | 50 | 0 |
| | 55-59 ans | 62,5 | 33,3 | 80 | 33,3 | 100 | 0 | 66,7 |
| | 60-64 ans | 66,7 | 72,7 | 57,1 | 66,7 | 66,7 | 100 | 50 |
| | 65-69 ans | 68,4 | 63,6 | 75 | 66,7 | 100 | 60 | 66,7 |
| | 70-74 ans | 73,3 | 75 | 71,4 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 65,5 | 64,6 | 66,7 | 61,1 | 66,7 | 75 | 66,7 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 7,4 | 0 | 16,7 | 0 | 16,7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 16,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3,4 | 0 | 7,7 | 0 | 8,3 | 0 | 6,7 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 12,5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,1 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 3,7 | 6,7 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | 70-74 ans | 6,7 | 0 | 14,3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3,4 | 4,2 | 2,6 | 2,8 | 4,2 | 8,3 | 0 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 14,8 | 6,7 | 25 | 7,7 | 25 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 11,1 | 0 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 65-69 ans | 15,8 | 27,3 | 0 | 33,3 | 0 | 20 | 0 |
| | 70-74 ans | 6,7 | 12,5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 11,5 | 10,4 | 12,8 | 11,1 | 12,5 | 8,3 | 13,3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 3,7 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | 55-59 ans | 12,5 | 33,3 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 11,1 | 18,2 | 0 | 22,2 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 6,7 | 0 | 14,3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5,7 | 8,3 | 2,6 | 8,3 | 4,2 | 8,3 | 0 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 3,7 | 6,7 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 11,1 | 9,1 | 14,3 | 11,1 | 33,3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 16,7 |
| | 70-74 ans | 6,7 | 12,5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5,7 | 6,3 | 5,1 | 8,3 | 4,2 | 0 | 6,7 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 3,7 | 6,7 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 12,5 | 33,3 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 4,2 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,9 | 3,8 | 4 | 3,8 | 4,1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,7 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 4,8 | 11,2 | 0 | 11,6 | 0 | 10,8 | 0 |
| | 70-74 ans | 2,8 | 3,5 | 2,4 | 7,5 | 7,8 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2,6 | 3,2 | 2,2 | 3,3 | 2,7 | 3 | 1,6 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-74 ans ** | 2,5 | 3,1 | 2 | . | . | . | . |
| | 50-54 ans | 3,1 | 1,9 | 4 | 1,9 | 4,1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,7 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 3,6 | 8,4 | 0 | 11,6 | 0 | 5,4 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,4 | 3,5 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 2 | 1,5 | 1,6 |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-74 ans ** | 1,9 | 2,2 | 1,6 | . | . | . | . |
| | 50-54 ans | 0,8 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 90,9 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 2,1 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,7 | 3,8 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,4 | 0 | 2,4 | 0 | 7,8 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1,8 | 0,4 | 2 | 0,7 | 1,5 | 0 |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-74 ans ** | 1,1 | 1,8 | 0,4 | . | . | . | . |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 75 | 66,7 | 100 | 66,7 | 100 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des