

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	22589	10413	12176	9938	11692	475	480
	55-59 ans	19374	8263	11111	7456	9873	807	1233
	60-64 ans	20672	8735	11937	7511	10076	1224	1857
	65-69 ans	14458	6172	8286	5190	7000	982	1286
	70-74 ans	12066	4908	7158	3931	5663	977	1489
	50-74 ans	89159	38491	50668	34026	44304	4465	6345
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1415	653	762	589	698	64	64
	55-59 ans	1206	514	692	435	581	79	111
	60-64 ans	1163	573	590	477	466	96	124
	65-69 ans	851	410	441	333	357	77	84
	70-74 ans	755	314	441	260	343	54	98
	50-74 ans	5390	2464	2926	2094	2445	370	481
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	765	359	406	305	356	54	50
	55-59 ans	711	296	415	232	321	64	94
	60-64 ans	735	343	392	260	293	83	99
	65-69 ans	519	244	275	183	207	61	68
	70-74 ans	469	180	289	135	210	45	79
	50-74 ans	3199	1422	1777	1115	1387	307	390
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	650	294	356	284	342	10	14
	55-59 ans	495	218	277	203	260	15	17
	60-64 ans	428	230	198	217	173	13	25
	65-69 ans	332	166	166	150	150	16	16
	70-74 ans	286	134	152	125	133	9	19
	50-74 ans	2191	1042	1149	979	1058	63	91
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21939	10119	11820	9654	11350	465	466
	55-59 ans	18879	8045	10834	7253	9613	792	1216
	60-64 ans	20244	8505	11739	7294	9903	1211	1832
	65-69 ans	14126	6006	8120	5040	6850	966	1270
	70-74 ans	11780	4774	7006	3806	5530	968	1470
	50-74 ans	86968	37449	49519	33047	43246	4402	6254
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	376	189	187	183	182	6	5
	55-59 ans	313	164	149	152	134	12	15
	60-64 ans	389	184	205	165	175	19	30
	65-69 ans	342	151	191	140	170	11	21
	70-74 ans	302	139	163	123	134	16	29
	50-74 ans	1722	827	895	763	795	64	100
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	375	188	187	182	182	6	5
	55-59 ans	311	163	148	151	133	12	15
	60-64 ans	388	183	205	164	175	19	30
	65-69 ans	336	148	188	137	167	11	21
	70-74 ans	300	139	161	123	132	16	29
	50-74 ans	1710	821	889	757	789	64	100
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	296	150	146	145	142	5	4
	55-59 ans	245	129	116	122	104	7	12
	60-64 ans	320	150	170	135	140	15	30
	65-69 ans	277	126	151	116	132	10	19
	70-74 ans	249	115	134	100	110	15	24
	50-74 ans	1387	670	717	618	628	52	89
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	253	127	126	124	122	3	4
	55-59 ans	215	113	102	106	90	7	12
	60-64 ans	273	122	151	109	126	13	25
	65-69 ans	231	109	122	100	108	9	14
	70-74 ans	185	83	102	76	80	7	22

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1157	554	603	515	526	39	77
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	290	146	144	141	140	5	4
	55-59 ans	242	127	115	120	103	7	12
	60-64 ans	313	146	167	132	139	14	28
	65-69 ans	271	125	146	115	128	10	18
	70-74 ans	243	112	131	99	107	13	24
	50-74 ans	1359	656	703	607	617	49	86
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	7	4	3	3	1	1	2
	65-69 ans	6	1	5	1	4	0	1
	70-74 ans	6	3	3	1	3	2	0
	50-74 ans	28	14	14	11	11	3	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	291	147	144	142	140	5	4
	55-59 ans	239	125	114	118	102	7	12
	60-64 ans	318	150	168	135	138	15	30
	65-69 ans	275	125	150	115	131	10	19
	70-74 ans	245	114	131	99	107	15	24
	50-74 ans	1368	661	707	609	618	52	89
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	296	150	146	145	142	5	4
	55-59 ans	246	129	117	122	105	7	12
	60-64 ans	320	150	170	135	140	15	30
	65-69 ans	277	126	151	116	132	10	19
	70-74 ans	249	115	134	100	110	15	24
	50-74 ans	1388	670	718	618	629	52	89
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	159	74	85	72	82	2	3
	55-59 ans	117	52	65	52	57	0	8
	60-64 ans	147	56	91	49	73	7	18
	65-69 ans	109	46	63	42	58	4	5
	70-74 ans	94	31	63	29	52	2	11
	50-74 ans	626	259	367	244	322	15	45
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	15	7	8	7	8	0	0
	55-59 ans	8	6	2	5	2	1	0
	60-64 ans	9	4	5	4	4	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	8	4	4	4	4	0	0
	70-74 ans	8	4	4	4	3	0	1
	50-74 ans	48	25	23	24	21	1	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	14	6	8	5	7	1	1
	55-59 ans	13	5	8	5	7	0	1
	60-64 ans	12	5	7	5	6	0	1
	65-69 ans	12	5	7	5	3	0	4
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	50-74 ans	55	23	32	22	25	1	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	35	18	17	17	17	1	0
	55-59 ans	30	18	12	15	11	3	1
	60-64 ans	44	24	20	20	17	4	3
	65-69 ans	35	17	18	15	18	2	0
	70-74 ans	31	19	12	14	8	5	4
	50-74 ans	175	96	79	81	71	15	8
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	44	27	17	26	17	1	0
	55-59 ans	41	26	15	24	13	2	2
	60-64 ans	61	36	25	33	21	3	4
	65-69 ans	65	32	33	28	30	4	3
	70-74 ans	56	30	26	27	22	3	4
	50-74 ans	267	151	116	138	103	13	13
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	3	6	3	6	0	0
	55-59 ans	10	6	4	5	4	1	0
	60-64 ans	27	14	13	14	11	0	2
	65-69 ans	27	13	14	13	11	0	3
	70-74 ans	35	21	14	17	11	4	3
	50-74 ans	108	57	51	52	43	5	8
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	13	11	2	11	2	0	0
	55-59 ans	21	13	8	13	8	0	0
	60-64 ans	18	11	7	10	6	1	1
	65-69 ans	16	8	8	8	6	0	2
	70-74 ans	14	7	7	6	6	1	1
	50-74 ans	82	50	32	48	28	2	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	5	1	4	1	2	0	2
	70-74 ans	7	1	6	1	6	0	0
	50-74 ans	27	9	18	9	16	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	79	45	34	43	34	2	0
	55-59 ans	71	44	27	39	24	5	3
	60-64 ans	105	60	45	53	38	7	7
	65-69 ans	100	49	51	43	48	6	3
	70-74 ans	87	49	38	41	30	8	8
	50-74 ans	442	247	195	219	174	28	21
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	44	27	17	26	17	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	41	26	15	24	13	2	2
	60-64 ans	61	36	25	33	21	3	4
	65-69 ans	65	32	33	28	30	4	3
	70-74 ans	56	30	26	27	22	3	4
	50-74 ans	267	151	116	138	103	13	13
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	3	6	3	6	0	0
	55-59 ans	10	6	4	5	4	1	0
	60-64 ans	27	14	13	14	11	0	2
	65-69 ans	27	13	14	13	11	0	3
	70-74 ans	35	21	14	17	11	4	3
	50-74 ans	108	57	51	52	43	5	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	3	6	3	6	0	0
	55-59 ans	10	6	4	5	4	1	0
	60-64 ans	26	13	13	13	11	0	2
	65-69 ans	27	13	14	13	11	0	3
	70-74 ans	35	21	14	17	11	4	3
	50-74 ans	107	56	51	51	43	5	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	10	6	4	5	4	1	0
	60-64 ans	26	13	13	13	11	0	2
	65-69 ans	27	13	14	13	11	0	3
	70-74 ans	34	20	14	17	11	3	3
	50-74 ans	105	55	50	51	42	4	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	2	1	1	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	73	36	37	35	36	1	1	1
	55-59 ans	63	34	29	29	26	5	3	3
	60-64 ans	61	29	32	27	32	2	0	0
	65-69 ans	52	20	32	19	30	1	2	2
	70-74 ans	40	22	18	21	17	1	1	1
	50-74 ans	289	141	148	131	141	10	7	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,3	6,3	5,9	6	13,5	13,3	
	55-59 ans	6,2	6,2	6,2	5,8	5,9	9,8	9	
	60-64 ans	5,6	6,6	4,9	6,4	4,6	7,8	6,7	
	65-69 ans	5,9	6,6	5,3	6,4	5,1	7,8	6,5	
	70-74 ans	6,3	6,4	6,2	6,6	6,1	5,5	6,6	
	50-74 ans	6	6,4	5,8	6,2	5,5	8,3	7,6	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,1	2,9	
	55-59 ans	2,6	2,6	2,5	2,7	2,6	1,9	1,4	
	60-64 ans	2,1	2,6	1,7	2,9	1,7	1,1	1,3	
	65-69 ans	2,3	2,7	2	2,9	2,1	1,6	1,2	
	70-74 ans	2,4	2,7	2,1	3,2	2,3	0,9	1,3	
	50-74 ans	2,5	2,7	2,3	2,9	2,4	1,4	1,4	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	54,1	55	53,3	51,8	51	84,4	78,1	
	55-59 ans	59	57,6	60	53,3	55,2	81	84,7	
	60-64 ans	63,2	59,9	66,4	54,5	62,9	86,5	79,8	
	65-69 ans	61	59,5	62,4	55	58	79,2	81	
	70-74 ans	62,1	57,3	65,5	51,9	61,2	83,3	80,6	
	50-74 ans	59,4	57,7	60,7	53,2	56,7	83	81,1	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,6	1,9	1,6	1,3	1,1	
	55-59 ans	1,7	2	1,4	2,1	1,4	1,5	1,2	
	60-64 ans	1,9	2,2	1,7	2,3	1,8	1,6	1,6	
	65-69 ans	2,4	2,5	2,4	2,8	2,5	1,1	1,7	
	70-74 ans	2,6	2,9	2,3	3,2	2,4	1,7	2	
	50-74 ans	2	2,2	1,8	2,3	1,8	1,5	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	99,5	100	99,5	100	100	100	
	55-59 ans	99,4	99,4	99,3	99,3	99,3	100	100	
	60-64 ans	99,7	99,5	100	99,4	100	100	100	
	65-69 ans	98,2	98	98,4	97,9	98,2	100	100	
	70-74 ans	99,3	100	98,8	100	98,5	100	100	
	50-74 ans	99,3	99,3	99,3	99,2	99,2	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	78,9	79,8	78,1	79,7	78	83,3	80	
	55-59 ans	78,8	79,1	78,4	80,8	78,2	58,3	80	
	60-64 ans	82,5	82	82,9	82,3	80	78,9	100	
	65-69 ans	82,4	85,1	80,3	84,7	79	90,9	90,5	
	70-74 ans	83	82,7	83,2	81,3	83,3	93,8	82,8	
	50-74 ans	81,1	81,6	80,7	81,6	79,6	81,3	89	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,5	84,7	86,3	85,5	85,9	60	100	
	55-59 ans	87,8	87,6	87,9	86,9	86,5	100	100	
	60-64 ans	85,3	81,3	88,8	80,7	90	86,7	83,3	
	65-69 ans	83,4	86,5	80,8	86,2	81,8	90	73,7	
	70-74 ans	74,3	72,2	76,1	76	72,7	46,7	91,7	
	50-74 ans	83,4	82,7	84,1	83,3	83,8	75	86,5	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	10	9	10	10	10	5	5	
	55-59 ans	10	10	10	11	11	5	4	
	60-64 ans	10	10	10	11	11	4	4	
	65-69 ans	10	10	10	11	11	4	4	
	70-74 ans	10	10	10	12	11	4	4	
	50-74 ans	10	10	10	11	11	4	4	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	78	85	78	86	92	66	
	55-59 ans	79	84	73	85	75	58	58	
	60-64 ans	77	82	73	84	76	65	60	
	65-69 ans	84	85	83	88	84	51	75	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	82	94	73	93	69	100	87
	50-74 ans	81	84	78	85	79	74	71
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	19,4	19	19,8	19,1	19,8	16,7	20
	55-59 ans	20,1	20,7	19,5	19,1	19,4	41,7	20
	60-64 ans	15,7	15,8	15,6	16,4	18,3	10,5	0
	65-69 ans	15,2	13,2	16,8	13,6	17,6	9,1	9,5
	70-74 ans	13,2	15,8	11	17,1	12,7	6,3	3,4
	50-74 ans	16,8	17	16,5	17,2	17,7	15,6	7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,3	98	98,6	97,9	98,6	100	100
	55-59 ans	97,6	96,9	98,3	96,7	98,1	100	100
	60-64 ans	99,4	100	98,8	100	98,6	100	100
	65-69 ans	99,3	99,2	99,3	99,1	99,2	100	100
	70-74 ans	98,4	99,1	97,8	99	97,3	100	100
	50-74 ans	98,6	98,7	98,6	98,5	98,4	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,7	49,3	58,2	49,7	57,7	40	75
	55-59 ans	47,6	40,3	55,6	42,6	54,3	0	66,7
	60-64 ans	45,9	37,3	53,5	36,3	52,1	46,7	60
	65-69 ans	39,4	36,5	41,7	36,2	43,9	40	26,3
	70-74 ans	37,8	27	47	29	47,3	13,3	45,8
	50-74 ans	45,1	38,7	51,1	39,5	51,2	28,8	50,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,1	4,7	5,5	4,8	5,6	0	0
	55-59 ans	3,3	4,7	1,7	4,1	1,9	14,3	0
	60-64 ans	2,8	2,7	2,9	3	2,9	0	3,3
	65-69 ans	2,9	3,2	2,6	3,4	3	0	0
	70-74 ans	3,2	3,5	3	4	2,7	0	4,2
	50-74 ans	3,5	3,7	3,2	3,9	3,3	1,9	2,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	4,7	4	5,5	3,4	4,9	20	25
	55-59 ans	5,3	3,9	6,8	4,1	6,7	0	8,3
	60-64 ans	3,8	3,3	4,1	3,7	4,3	0	3,3
	65-69 ans	4,3	4	4,6	4,3	2,3	0	21,1
	70-74 ans	1,6	1,7	1,5	2	1,8	0	0
	50-74 ans	4	3,4	4,5	3,6	4	1,9	7,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,8	12	11,6	11,7	12	20	0
	55-59 ans	12,2	14	10,3	12,3	10,5	42,9	8,3
	60-64 ans	13,8	16	11,8	14,8	12,1	26,7	10
	65-69 ans	12,6	13,5	11,9	12,9	13,6	20	0
	70-74 ans	12,4	16,5	9	14	7,3	33,3	16,7
	50-74 ans	12,6	14,3	11	13,1	11,3	28,8	9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,9	18	11,6	17,9	12	20	0
	55-59 ans	16,7	20,2	12,8	19,7	12,4	28,6	16,7
	60-64 ans	19,1	24	14,7	24,4	15	20	13,3
	65-69 ans	23,5	25,4	21,9	24,1	22,7	40	15,8
	70-74 ans	22,5	26,1	19,4	27	20	20	16,7
	50-74 ans	19,2	22,5	16,2	22,3	16,4	25	14,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3	2	4,1	2,1	4,2	0	0
	55-59 ans	4,1	4,7	3,4	4,1	3,8	14,3	0
	60-64 ans	8,4	9,3	7,6	10,4	7,9	0	6,7
	65-69 ans	9,7	10,3	9,3	11,2	8,3	0	15,8
	70-74 ans	14,1	18,3	10,4	17	10	26,7	12,5
	50-74 ans	7,8	8,5	7,1	8,4	6,8	9,6	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,4	7,3	1,4	7,6	1,4	0	0
	55-59 ans	8,5	10,1	6,8	10,7	7,6	0	0
	60-64 ans	5,6	7,3	4,1	7,4	4,3	6,7	3,3
	65-69 ans	5,8	6,3	5,3	6,9	4,5	0	10,5
	70-74 ans	5,6	6,1	5,2	6	5,5	6,7	4,2
	50-74 ans	5,9	7,5	4,5	7,8	4,5	3,8	4,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,4	2,7	2,1	2,8	2,1	0	0
	55-59 ans	2,4	2,3	2,6	2,5	2,9	0	0
	60-64 ans	0,6	0	1,2	0	1,4	0	0
	65-69 ans	1,8	0,8	2,6	0,9	1,5	0	10,5
	70-74 ans	2,8	0,9	4,5	1	5,5	0	0
	50-74 ans	1,9	1,3	2,5	1,5	2,5	0	2,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	4,4	2,9	4,5	3	4,3	0
	55-59 ans	3,8	5,5	2,5	5,4	2,5	6,3	2,5
	60-64 ans	5,2	7,1	3,8	7,3	3,8	5,8	3,8
	65-69 ans	7,1	8,2	6,3	8,5	7	6,2	2,4
	70-74 ans	7,4	10,3	5,4	10,8	5,4	8,3	5,4
	50-74 ans	5,1	6,6	3,9	6,6	4	6,4	3,4
	50-74 ans **	5,2	6,6	3,9
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,7	1,4	2,7	1,5	2,2	0
	55-59 ans	2,2	3,2	1,4	3,3	1,4	2,5	1,6
	60-64 ans	3	4,2	2,1	4,5	2,1	2,5	2,2
	65-69 ans	4,6	5,3	4,1	5,6	4,4	4,1	2,4
	70-74 ans	4,8	6,3	3,7	7,1	4	3,1	2,7
	50-74 ans	3,1	4	2,3	4,2	2,4	3	2,1
	50-74 ans **	3,1	4	2,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,3	0,5	0,3	0,5	0	0
	55-59 ans	0,5	0,7	0,4	0,7	0,4	1,3	0
	60-64 ans	1,3	1,6	1,1	1,9	1,1	0	1,1
	65-69 ans	1,9	2,2	1,7	2,6	1,6	0	2,4
	70-74 ans	3	4,4	2	4,5	2	4,1	2
	50-74 ans	1,2	1,5	1	1,6	1	1,1	1,3
	50-74 ans **	1,3	1,5	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	88,9	100	83,3	100	83,3	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	100
	70-74 ans	97,1	95,2	100	100	100	75	100
	50-74 ans	98,1	98,2	98	100	97,7	80	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des