

Consommations alimentaires – Groupes d'aliments – Adultes 18-74 ans

Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

Tableau 1.2.14 : Consommation (en millilitres par jour) de boissons sucrées non alcoolisées*, chez les adultes de 18 à 74 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5^e et 97,5^e percentiles (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)

	Age (années)			Tous
	18-29 ans	30-54 ans	55-74 ans	
Hommes				
Aucun (%)	26,5	55,6	78,0	55,2
< 50 ml/j	28,6	63,4	85,9	61,8
< 100 ml/j	37,2	75,4	93,5	71,7
< 150 ml/j	44,5	82,0	95,6	77,3
< 200 ml/j	46,9	85,8	97,2	80,2
< 250 ml/j	59,0	89,3	98,0	84,9
< 300 ml/j	64,6	92,4	99,3	88,0
< 400 ml/j	73,9	97,0	99,8	92,5
Moyenne	300,0	73,0	21,0	110,0
Médiane	214,0	0,0	0,0	0,0
2,5 ^e percentile	0,0	0,0	0,0	0,0
97,5 ^e percentile	1417,0	436,0	200,0	665,0
Femmes				
Aucun (%)	34,5	59,1	80,1	59,9
< 50 ml/j	43,7	70,8	90,5	70,7
< 100 ml/j	61,3	82,8	95,5	81,9
< 150 ml/j	68,5	88,1	97,5	86,6
< 200 ml/j	75,1	91,4	98,0	89,8
< 250 ml/j	82,0	92,8	99,0	92,3
< 300 ml/j	84,1	94,5	99,9	93,8
< 400 ml/j	88,7	96,8	100,0	96,0
Moyenne	150,0	60,0	5,0	66,0
Médiane	59,0	0,0	0,0	0,0
2,5 ^e percentile	0,0	0,0	0,0	0,0
97,5 ^e percentile	786,0	411,0	150,0	607,0

* Sont compris les apports hydriques par les boissons sucrées uniquement : sodas, sirops, nectars, eaux et laits aromatisés avec sucres ajoutés.

Questionnaire source : au moins deux rappels des 24 heures ; sujets considérés comme ne sous-déclarant pas leur consommation alimentaire.

Résultats pondérés et redressés.

Note : Le repère du PNNS « Limiter les boissons sucrées » est interprété comme moins de 250ml/j de boissons non alcoolisées, sucrées.