

# Consommations alimentaires – Apports en énergie et nutriments – Adultes 18-74 ans

## Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

Tableau 1.1.14 : Apports en calcium (en % ANC\* par jour) chez les adultes de 18 à 74 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5<sup>e</sup> et 97,5<sup>e</sup> percentiles (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)

	Age (années)			Tous
	18-29 ans	30-54 ans	55-74 ans	
<b>Hommes</b>				
< 33% ANC/j	1,6	0,2	0,9	0,7
< 50% ANC/j	8,9	1,8	8,4	5,2
< 66% ANC/j	19,0	8,6	22,0	14,6
< 77% ANC/j	30,5	17,6	39,2	26,5
< 100% ANC/j	51,6	41,6	65,9	50,5
< 133% ANC/j	77,8	76,8	89,9	80,6
< 150% ANC/j	85,7	88,1	95,5	89,6
Moyenne	105,5	111,1	90,8	104,3
Médiane	98,2	106,0	86,0	99,2
2,5 <sup>e</sup> percentile	39,9	51,6	41,5	43,9
97,5 <sup>e</sup> percentile	195,7	190,8	167,2	190,8
<b>Femmes</b>				
< 33% ANC/j	4,0	1,2	2,2	2,1
< 50% ANC/j	13,7	7,2	23,2	13,2
< 66% ANC/j	32,4	21,0	46,4	30,9
< 77% ANC/j	44,5	33,9	65,8	45,5
< 100% ANC/j	72,2	62,6	86,7	71,7
< 133% ANC/j	92,3	86,4	96,4	90,6
< 150% ANC/j	94,8	92,7	98,4	94,8
Moyenne	84,7	95,6	71,6	86,3
Médiane	79,2	90,6	68,3	80,9
2,5 <sup>e</sup> percentile	28,7	38,7	33,7	34,1
97,5 <sup>e</sup> percentile	170,7	175,0	145,1	168,7

\* ANC : apports nutritionnels conseillés. Les besoins nutritionnels Minimaux (BNM) sont estimés à partir des ANC ( $BNM = ANC \times 0,77$ ).

Questionnaire source : au moins deux rappels des 24 heures ; sujets considérés comme ne sous-déclarant pas leurs consommations alimentaires.

Résultats pondérés et redressés.