

Consommations alimentaires – Groupes d'aliments – Enfants 3-17 ans

Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

Tableau 2.2.14 : Consommation (en millilitres par jour) de boissons sucrées non alcoolisées* chez les enfants de 3 à 17 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5^e et 97,5^e percentiles (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)

	Age (années)				Tous
	3-6 ans	7-10 ans	11-14 ans	15-17 ans	
Garçons					
Aucun (%)	44,9	29,4	29,1	28,5	33,0
< 50 ml/j	64,6	39,9	32,5	32,6	42,8
< 100 ml/j	80,0	58,2	46,5	43,4	57,8
< 150 ml/j	87,8	66,1	57,8	52,5	66,9
< 200 ml/j	91,0	78,2	65,2	60,3	74,7
< 250 ml/j	93,0	83,3	73,9	67,9	80,4
< 300 ml/j	95,0	87,7	83,1	72,5	85,5
< 400 ml/j	97,6	94,1	91,6	82,9	92,3
Moyenne	63,3	130,1	154,5	216,8	135,6
Médiane	26,8	82,1	125,0	138,9	71,4
2,5 ^e percentile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97,5 ^e percentile	396,4	614,3	499,6	857,1	614,3
Filles					
Aucun (%)	35,4	30,8	30,2	35,3	32,8
< 50 ml/j	53,6	42,8	40,9	41,7	44,7
< 100 ml/j	69,6	62,6	61,1	54,7	62,1
< 150 ml/j	79,6	77,8	72,0	70,6	75,1
< 200 ml/j	88,2	83,0	76,7	76,7	81,2
< 250 ml/j	91,4	88,2	84,0	80,9	86,3
< 300 ml/j	95,7	90,5	87,6	85,5	89,9
< 400 ml/j	97,9	94,8	90,2	91,2	93,6
Moyenne	83,3	104,1	131,7	134,3	112,9
Médiane	42,9	65,7	71,4	85,7	64,3
2,5 ^e percentile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97,5 ^e percentile	385,7	453,6	696,4	602,5	540,7

* Sont compris les apports hydriques par les boissons sucrées uniquement : sodas, sirops, nectars, eaux et laits aromatisés avec sucres ajoutés.

Questionnaire source : au moins deux rappels des 24 heures.
Résultats pondérés et redressés.

Note : le repère du PNNS « Limiter les boissons sucrées » est interprété comme moins de 125ml/j de boissons non alcoolisées, sucrées.