

Consommations alimentaires – Apports en énergie et nutriments – Enfants 3-17 ans

Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

Tableau 2.1.2 : Apports énergétiques par les glucides totaux (en %AESA* par jour) chez les enfants de 3 à 17 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5^e et 97,5^e percentiles (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)

	Age (années)				Tous
	3-6 ans	7-10 ans	11-14 ans	15-17 ans	
Garçons					
< 35% AESA/j	2,0	0,2	1,2	0,2	0,9
< 40% AESA/j	6,6	6,0	5,7	6,0	6,1
< 45% AESA/j	21,6	22,4	25,6	19,5	22,5
< 50% AESA/j	50,5	54,7	61,5	57,0	55,9
< 55% AESA/j	79,9	85,9	88,6	83,1	84,6
< 60% AESA/j	92,5	96,7	98,3	93,1	95,4
Indicateur d'objectif du PNNS ⁵	49,5	45,3	38,5	43,0	44,1
Moyenne	49,8	49,1	48,2	49,4	49,1
Médiane	49,9	49,4	48,5	49,0	49,1
2,5 ^e percentile	36,6	38,5	36,3	37,3	37,1
97,5 ^e percentile	62,5	61,6	59,2	61,8	61,3
Filles					
< 35% AESA/j	0,5	0,0	1,8	0,7	0,7
< 40% AESA/j	4,8	7,9	7,2	8,4	7,1
< 45% AESA/j	22,7	30,5	30,5	29,6	28,4
< 50% AESA/j	56,7	60,9	62,7	50,6	57,9
< 55% AESA/j	87,9	89,4	87,8	85,0	87,6
< 60% AESA/j	96,9	97,8	99,5	93,6	97,0
Indicateur d'objectif du PNNS ⁵	43,3	39,1	37,3	49,4	42,1
Moyenne	48,9	48,4	48,0	48,9	48,5
Médiane	48,8	48,1	48,1	49,8	48,7
2,5 ^e percentile	38,0	38,7	37,3	37,6	38,0
97,5 ^e percentile	60,3	59,6	58,3	61,0	60,1

* AESA : Apports énergétiques sans alcool.

Questionnaire source : au moins deux rappels des 24 heures.
Résultats pondérés et redressés.

Note : L'indicateur d'objectif du PNNS correspond à un apport en glucides totaux supérieur à 50% des AESA.