

Consommations alimentaires – Apports en énergie et nutriments – Enfants 3-17 ans

Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

Tableau 2.1.11 : Apports en calcium (en %ANC* par jour) chez les enfants de 3 à 17 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5^e et 97,5^e percentiles (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)

	Age (années)				Tous
	3-6 ans	7-10 ans	11-14 ans	15-17 ans	
Garçons					
< 33% ANC/j	0,4	0,0	0,9	4,4	1,1
< 50% ANC/j	2,2	4,5	16,0	13,8	8,7
< 66% ANC/j	8,6	15,3	29,9	39,1	21,9
< 77% ANC/j	15,4	25,2	47,5	54,4	34,1
< 100% ANC/j	40,3	50,9	78,9	75,9	60,3
< 133% ANC/j	74,3	86,3	93,2	90,9	86,0
< 150% ANC/j	84,5	94,7	97,5	97,3	93,4
Moyenne	116,1	99,6	81,7	81,2	95,6
Médiane	107,9	98,8	78,6	73,8	90,1
2,5 ^e percentile	51,0	39,5	38,8	14,6	39,5
97,5 ^e percentile	233,4	164,0	150,0	159,0	188,4
Filles					
< 33% ANC/j	0,0	1,5	7,1	8,7	4,2
< 50% ANC/j	1,8	4,2	26,0	40,5	17,4
< 66% ANC/j	8,6	16,0	53,4	62,9	34,4
< 77% ANC/j	19,5	30,0	72,7	80,3	49,7
< 100% ANC/j	43,0	61,5	91,5	91,9	71,5
< 133% ANC/j	80,1	88,5	99,5	99,7	91,8
< 150% ANC/j	89,1	95,3	99,5	99,7	95,8
Moyenne	110,0	94,6	65,9	61,0	83,4
Médiane	104,9	91,1	63,6	58,5	77,4
2,5 ^e percentile	54,5	41,2	26,4	22,8	30,9
97,5 ^e percentile	210,3	155,6	114,8	113,8	163,0

* ANC : Apports nutritionnels conseillés. Les besoins nutritionnels Minimaux (BNM) sont estimés à partir des ANC (BNM = ANC × 0,77).

Questionnaire source : au moins deux rappels des 24 heures.
Résultats pondérés et redressés.

Note : Les apports nutritionnels conseillés (1) sont :

- < 4 ans : 500 mg/j,
- 4-9 ans : 800 mg/j,
- 10-17 ans : 1200 mg/j.

(1) Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) C-C. Apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3^{ème} ed. 2001.