

# Mesures anthropométriques – Adultes 18-74 ans

## Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

**Tableau 1.5.3. : Corpulence selon l'indice de masse corporelle (en kilogrammes par mètre carré) des adultes de 18 à 74 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5<sup>e</sup> et 97,5<sup>e</sup> percentiles, minimum et maximum (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)**

	Age (années)			Tous
	18-29 ans	30-54 ans	55-74 ans	
<b>Hommes</b>				
< 18,5 kg/m <sup>2</sup>	0,5	1,1	-	0,7
< 20,0 kg/m <sup>2</sup>	15,9	2,9	1,6	5,5
< 22,5 kg/m <sup>2</sup>	42,7	12,9	8,2	18,4
< 25,0 kg/m <sup>2</sup>	68,1	40,0	27,2	42,9
< 30,0 kg/m <sup>2</sup>	91,7	84,6	76,0	83,9
< 35,0 kg/m <sup>2</sup>	95,4	97,7	96,2	96,8
< 40,0 kg/m <sup>2</sup>	99,7	98,8	99,6	99,3
Moyenne	23,9	26,3	27,4	26,1
Médiane	23,2	25,9	27,0	25,7
2,5 <sup>e</sup> percentile	19,1	19,8	20,2	19,1
97,5 <sup>e</sup> percentile	37,6	34,8	36,1	36,1
Minimum	18,4	15,3	19,2	15,3
Maximum	42,1	47,4	46,3	47,4
<b>Femmes</b>				
< 18,5 kg/m <sup>2</sup>	11,2	4,1	2,1	5,0
< 20,0 kg/m <sup>2</sup>	25,4	11,5	4,9	12,4
< 22,5 kg/m <sup>2</sup>	55,0	36,0	22,1	35,8
< 25,0 kg/m <sup>2</sup>	77,2	60,5	42,3	58,5
< 30,0 kg/m <sup>2</sup>	89,9	83,2	75,9	82,3
< 35,0 kg/m <sup>2</sup>	96,0	94,5	93,7	94,4
< 40,0 kg/m <sup>2</sup>	100,0	98,3	98,8	98,6
Moyenne	23,1	25,0	26,7	25,1
Médiane	22,0	23,8	25,9	24,0
2,5 <sup>e</sup> percentile	17,5	17,8	18,9	17,8
97,5 <sup>e</sup> percentile	38,8	37,0	38,6	37,8
Minimum	17,1	15,5	14,1	14,1
Maximum	38,8	48,0	47,6	48,0

Conditions de mesure : rapport entre le poids (kg) et la taille (m) au carré, hors femmes enceintes.  
Résultats pondérés et redressés.

Note : Les seuils de référence retenus sont ceux de l'Organisation Mondiale de la Santé (1) :

Maigre	IMC < 18,5
Normal	18,5 ≤ IMC < 25,0
Surpoids	25,0 ≤ IMC < 30,0
Obèse	IMC ≥ 30,0

(1) World Health Organization (WHO). Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organ Tech Rep Ser 2000;1-253.