

Marqueurs biologiques de l'état nutritionnel – Adultes 18-74 ans

Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

Tableau 1.8.7. : Lycopène (en micromoles par litre) chez les adultes de 18 à 74 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5^e et 97,5^e percentiles, minimum et maximum (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)

	Age (années)			Tous
	18-29 ans	30-54 ans	55-74 ans	
Hommes				
< 0,125 µmol/l	2,7	3,0	13,1	5,7
< 0,250 µmol/l	11,6	9,1	28,1	14,8
< 0,375 µmol/l	13,0	22,5	44,1	26,2
< 0,500 µmol/l	29,8	38,9	60,1	42,6
< 0,625 µmol/l	36,5	54,9	76,6	56,6
< 0,750 µmol/l	51,5	67,3	87,7	69,2
< 0,875 µmol/l	62,2	75,8	89,7	76,4
< 1,000 µmol/l	77,3	81,3	91,8	83,1
< 1,250 µmol/l	85,4	91,0	96,3	91,0
Moyenne	0,701	0,689	0,463	0,630
Médiane	0,649	0,600	0,394	0,534
2,5 ^e percentile	0,106	0,088	0,053	0,059
97,5 ^e percentile	1,621	1,745	1,301	1,625
Minimum	0,106	0,001	0,013	0,001
Maximum	2,247	2,935	2,194	2,935
Femmes				
< 0,125 µmol/l	6,7	2,9	7,3	5,0
< 0,250 µmol/l	9,6	9,2	25,7	14,2
< 0,375 µmol/l	17,0	20,0	40,9	25,6
< 0,500 µmol/l	34,2	37,7	61,5	44,0
< 0,625 µmol/l	50,2	53,9	72,8	58,7
< 0,750 µmol/l	70,2	67,3	81,6	72,1
< 0,875 µmol/l	77,2	78,9	87,3	81,0
< 1,000 µmol/l	86,9	87,0	92,1	88,5
< 1,250 µmol/l	91,5	96,4	96,5	95,4
Moyenne	0,679	0,624	0,487	0,595
Médiane	0,625	0,570	0,412	0,537
2,5 ^e percentile	0,058	0,063	0,064	0,058
97,5 ^e percentile	1,952	1,411	1,365	1,483
Minimum	0,009	0,007	0,001	0,001
Maximum	2,174	2,621	2,191	2,621

Conditions de mesure : Chromatographie liquide haute pression (HPLC).
Résultats pondérés et redressés