

Marqueurs biologiques de l'état nutritionnel – Adultes 18-74 ans

Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

Tableau 1.8.14. : Albumine (en grammes par litre) chez les adultes de 18 à 74 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5^e et 97,5^e percentiles, minimum et maximum (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)

	Age (années)			Tous
	18-29 ans	30-54 ans	55-74 ans	
Hommes				
< 35,0 g/l	-	0,3	-	0,2
< 40,0 g/l	1,7	1,9	2,7	2,1
< 42,5 g/l	3,2	9,2	17,5	10,2
< 45,0 g/l	6,2	39,5	56,6	36,9
< 47,5 g/l	56,0	78,6	88,0	76,2
< 50,0 g/l	86,3	95,8	97,9	94,3
< 52,5 g/l	98,9	100,0	100,0	99,7
< 55,0 g/l	100,0	-	-	100,0
Moyenne	47,3	45,6	44,6	45,7
Médiane	47,1	45,6	44,5	45,8
2,5 ^e percentile	42,3	40,6	39,7	40,5
97,5 ^e percentile	52,4	50,6	49,4	50,6
Minimum	39,2	33,0	36,9	33,0
Maximum	52,8	52,4	50,1	52,8
Femmes				
< 35,0 g/l	1,1	1,0	-	0,7
< 40,0 g/l	6,7	4,5	5,3	5,2
< 42,5 g/l	21,4	23,3	24,6	23,3
< 45,0 g/l	60,3	64,9	67,5	64,7
< 47,5 g/l	88,6	91,3	92,5	91,1
< 50,0 g/l	98,7	98,7	99,5	99,0
< 52,5 g/l	100,0	100,0	100,0	100,0
< 55,0 g/l	-	-	-	-
Moyenne	44,2	44,0	43,9	44,0
Médiane	44,2	44,0	43,8	44,0
2,5 ^e percentile	38,0	39,3	39,3	39,2
97,5 ^e percentile	49,3	49,6	48,7	49,3
Minimum	34,0	33,1	36,1	33,1
Maximum	50,6	52,8	50,6	52,8

Conditions de mesure : Colorimétrie à deux longueurs d'onde par la technique au vert de bromocrésol.
Résultats pondérés et redressés.

Note : le seuil de référence retenu pour la dénutrition est fixé à 35 g/l (1).

Haute autorité de santé (HAS). Recommandations professionnelles (2007). Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée. Paris, 2007. Consultable sur : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_546549/strategie-de-prise-en-charge-en-cas-de-denuitration-proteino-energetique-chez-la-personne-agee