

Comparaison des taux d'incidence régionaux standardisés* des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien au taux d'incidence national, selon le sexe, chez les 20-64 ans,

France métropolitaine, 2014

Régions	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
Auvergne-Rhône-Alpes	1,03	[0,99-1,06]	0,99	[0,97-1,02]	1,00	[0,98-1,02]
Bourgogne-Franche-Comté	1,24	[1,18-1,31]	1,19	[1,15-1,23]	1,20	[1,17-1,24]
Bretagne	0,80	[0,75-0,85]	0,71	[0,68-0,74]	0,73	[0,71-0,76]
Centre-Val-de-Loire	1,24	[1,18-1,31]	1,28	[1,24-1,33]	1,27	[1,23-1,31]
Corse	0,69	[0,56-0,84]	0,68	[0,59-0,78]	0,68	[0,61-0,76]
Grand-Est	1,29	[1,24-1,33]	1,27	[1,24-1,30]	1,27	[1,24-1,30]
Hauts-de-France	1,12	[1,08-1,16]	1,17	[1,14-1,20]	1,15	[1,13-1,18]
Ile-de-France	0,58	[0,55-0,60]	0,73	[0,72-0,75]	0,68	[0,67-0,70]
Normandie	1,19	[1,14-1,25]	1,28	[1,24-1,32]	1,25	[1,22-1,28]
Nouvelle-Aquitaine	1,27	[1,23-1,32]	1,17	[1,14-1,20]	1,20	[1,18-1,23]
Occitanie	0,89	[0,85-0,93]	0,84	[0,81-0,86]	0,86	[0,83-0,88]
PACA	0,93	[0,89-0,98]	0,90	[0,88-0,93]	0,92	[0,90-0,94]
Pays de la Loire	1,20	[1,14-1,25]	1,07	[1,03-1,11]	1,11	[1,08-1,14]

CMF = Comparative Morbidity Figure

**Standardisation sur l'âge de la population française, restreinte aux hommes ou aux femmes en fonction du sexe considéré*

Sources :

Santé publique France – 28 Décembre 2016 –

Données issues de la base nationale du PMSI gérée par l'Atih. N° d'agrément 2015 – 111111 – 59 – 50.